



AGOS F1

Korai, kiválóan kötődő fajta. 1,5-2 kg-os termései oválisak, narancssárga húsuak. A fóliás és szabadföldi termesztés bevált fajtája. Lisztharmat- és fuzárium-ellenálló lombzata a CENTRO-nál erősebb növekedésű, az átalakulóban lévő hazai piaci igényeknek kitűnően megfelelő sárgadinnye. Termése kemény, mégis olvadékony, illatos. Kiválóan szállítható és tárolható.

CENTRO F1

Igen korai, nagy termőképességű sárgadinnye. 1,5-2 kg-os termései nyújtott gömb alakúak, tetszetősen gerezdesek, narancssárga húsuak, pultállóak. Vékony héjazata erősen cseres. Erős és dinamikus fejlődő lombzat jellemzi, kiválóan kötődik. Lisztharmat- és fuzárium-ellenálló, fóliás és szabadföldi termesztésre javasolt. Tárolhatósága és szállíthatósága kiváló.

PEPE F1

Galia típusú, 1,5 kg átlagsúlyú, középkorai, PMT és F012 ellenálló sárgadinnye. Húsa zöld, omlós, intenzív illatú. Héja éretten sárga, szépen cserezett.

MADONNA F1

Egyöntetű, sötétlila, kiváló minőségű termései nyújtott csepp alakúak. Nyitott lombzatú, erős növekedésű hajtásait több száron is nevelhetjük. Átlagos terméssúlya 300 g. Kifejezetten erős növekedésű padlizsánfajta. Nyitott lombzatot fejleszt. Főszárnövekedése erőteljes, kötődése kiváló. Támrendszerrel, megfelelő metszéssel kimagasló terméseredmény érhető el. Fóliás és szabadföldi termesztésre ajánljuk.

DOBRIX F1

Nagytestű, kerekded formájú termés, rövid ízközű, zömök, de nyitott növényállomány jellemzi. Korai termésképzése miatt elsősorban fűtött vagy fűtetlen hajtásra javasoljuk. Ragyogó, sötétlila színét még kedvezőtlen körülmények között is megtartja.

TANGO F1

Fehér színű, édeskes ízű, omlós húsu, különleges padlizsánújdonság!

CERES F1

Fényszegény téli időszakban is hajtatható, lisztharmat-ellenálló uborkaújdonság. Gyors fejlődésű, jól újul.

DOMIRA F1

Késő tavaszi, nyári termesztésre javasolt, lisztharmat rezisztens uborka. Erős, jól terhelhető, hőmérsékletingásra nem érzékeny. A nyári termesztés legbiztonságosabb fajtája.

TORNAC F1


Nagy termőképességű, erős növekedésű, 16-20 cm hosszú, mini kígyóuborka. Visszafogott oldalhajtás képzése miatt kevés zöldmunkát igényel. Nóduszonként 2-3 db uborkát is felnevel. Főszáron nagyon jól megújul.



PEPE F1



CENTRO F1



MADONNA F1



CERES F1

DE RUITER SEEDS
HIBRID VETŐMAG

6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 5.
Tel.: +36 76 505 790, fax: +36 76 505 792
E-mail: ruiter@axelero.hu; www.deruiterseeds.com

HÍRLEVÉL 2002:1

Kecskemét, 2002. tavasz


DE RUITER SEEDS
HIBRID VETŐMAG

Hideghajtásra és szabadföldi termesztésre javasolt fajtáink:

Az utóbbi évek tapasztalata azt mutatja, hogy a hideghajtásra és a szabadföldi támrendszeres termesztés jó minőségű árúja megtalálja a helyét a piacon, ezért egyre többen választják e két termesztési módot. Gazdag fajtakínálatunkból az alábbi fajtákat javasoljuk mindkét termesztésre.

ZFW 738 F1 (Tm Sw V F2)

Erős növekedésű, mégis generatív habitusú, nyitott lombzatú növény, merev, vastag levelei megóvják a termést a túlzott felmelegedéstől (napégés) és a szélveréstől. 120-130 grammos kemény bogói szépen színeződnek, repedésre nem hajlamosak. Korai termésérése miatt már április közepén-végén ültessük, így már június végén értékesíthető termésünk lesz. A ZFW 738 F1 paradicsomfajta bronzfoltossággal szembeni rezisztenciája (TSWV) szavatolja a biztonságos termesztést.



FALCATO F1 (Tm V F2 N rin)

130 gramm átlagsúlyú bogója kissé lapított gömb alakú, LSL paradicsom. A növényt erőteljes növekedés, robosztus lombzat és agresszív gyökérrendszer jellemzi. Tavasztól őszig hajtva és szabadföldi támrendszeres termesztésre kiválóan alkalmas.




APRILIA F1 (Tm C5 V F2 N)

Ideális felépítésű, kitűnő fűtparadicsom! Bogói extra keménységűek. Egy színből érő, 120-130 gramm átlagsúlyú termései erősen ízesülnek, a fűtről nem hullanak le. Fűtrnye, csészelevelei üde zöld színét hosszú ideig megtartja. Tavaszi és őszi ültetésre kiváló.



DE RUITER SEEDS
HIBRID VETŐMAG



MEGHÍVÓ

Kedves Kertész Kollégák!

A De Ruiter Seeds Vetőmagtermelő Kft.

és a

Kalendula Kft.

tisztelettel meghívja az érdeklődő
kertészeket

a 2002. február 19-én (kedden) 17.00 órakor
SZEGED-KISKUNDOROZSMÁN
megrendezésre kerülő

ÚJDONSÁGOK A SPECIALISTA KÍNÁLATÁBAN

KORSZERŰ TÁPANYAG-UTÁNPÓTLÁS
KEMIRA TECHNOLÓGIÁVAL

című gazdaestjére.

Helyszín:

Szeged-Kiskundorozsma - Petőfi S. Művelődési Ház, Negyvennyolcas utca

ORIGINAL PACKING 135 x 175 MM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ORIGINAL SIZE 135 MM

DE RUITER SEEDS
VETŐMAGTERMELŐ KFT.

HUNGARY
KECSKEMÉT-6000
Deák Ferenc tér 5.
Telefon : 76 / 328-480
Tel./ Fax: 76 / 486-650

Szívélyes üdvözléssel
With the compliments of



OLTÁS

TÖBB TERMÉS, NAGYOBB BIZTONSÁG



A piacot figyelve azt tapasztaltuk, hogy az utóbbi években egyre többen érdeklődnek és egyre többen választják az oltott növényeket, a jobb minőség és nagyobb termésbiztonság reményében.

Cégünk természetesen rendelkezik az oltáshoz szükséges kiváló minőségű alany és nemes fajtákkal, valamint bevált oltási technológiával.

Japán oltás

Ez a felső oltás manapság leginkább elterjedt változata. A nemes és az alany összenövésztésére szilikon hüvelyt/klipszet használnak szalagos vagy zsinóros kötözés helyett. A szilikon klipsz használata kevésbé munkaigényes és helyes alkalmazásával az eredés közel 100%-os lehet.

Az oltás a következő lépésekből áll:

1. az alany vetése
2. a nemes vetése
3. előkészületek
4. oltás
5. hegedés, összeolvadás
6. cserépbe ültetés és szétrakás

1. Az alany vetése

-Vesse el a nemes fajta vetése előtt 5-10 nappal.

-Az egyenetlen csírázás miatt a palántákat válogatni kell. Ezt általában a 3. igazi levél megjelenésekor végezzük el, majd 4-5 naponként ismételjük.

-A kiválogatott alany palántákat tartsuk 18-20 °C hőmérsékleten, hogy vastagabbak és erőteljesebbek legyenek.

2. A nemes vetése

Ajánlott csírázási feltételek: hőmérséklet: 25 °C éjjel-nappal EC: 1.8-2.0 mS/cm
páratartalom: 78% pH: 6.0 - 6.5

3. Előkészületek

-A nemes vetése után 17-18 nappal történjen az oltás. Az oltást árnyékolt területen kell végezni.

-Készítsen egy oltósátrat, ami kb. 30 cm magas. Erős napsugárzás esetén további árnyékolásra lehet szükség. Ajánlatos mindig új pengét használni és gyakran cserélni azokat.

-Klíma: 21-22 °C; a páratartalom kb. 95%-os, a nevelőkocka pedig nedves legyen. EC 2-3 mS.

-Az oltás alatt tilos a dohányzás (vírus).

4. Oltási eljárás

-Borotvapengével 45°-os szögben vágja le az alanyt. Világos, meleg idő esetén vágja a palánta levelei alatt, hogy elkerülje az alanyból a bujtvány kifejlődését. Ha sötét van, a sziklevelek felett vágja annak érdekében, hogy a sziklevelek fotoszintézise segítse az eredést.

-Tegye helyére az oltási csipeszt.

-Vágja le a nemest az adott szögben, és ha szükséges tartsa sterilizált vizes tálcában.

-Helyezze a nemest a csipeszbe, győződjön meg arról, hogy az alannyal jól kapcsolódik-e, a két rész közötti levegő sikertelenséget fog eredményezni.

-Az egyenes helyett inkább 45°-os szögben történő vágást ajánlunk, mert az oltási felület nagyobb és a siker így biztosabb.

-Ideális helyzetben az alanyt is és a nemest is a sziklevelek felett vágjuk.

-Az alanyt maximum 2 cm-rel a vetőkocka felett vágja. Ha ennél magasabb, akkor leeshet az oltás, ha alacsonyabb, akkor a nemes belegyökerezhet a közegbe.

-Ha a nemes túl gyorsan nőne, tanácsos magasabban vágni, akár a 2. vagy 3. igazi levél magasságában.

-Azonnal helyezze a beoltott növényeket a műanyag alagútba. Az optimális hőmérséklet az oltáshoz 21-22 °C. Napos körülmények között a maximális hőmérséklet 28 - 29 °C.

-Amennyiben egy kicsit nagyobb palántákat oltunk, akkor először kipalántázzuk az alanyt és legalább 2-3 nap elmúltával oltunk. Az előnye az, hogy a növények nem fognak olyan gyorsan lankadni.



5. Oltás

A növényt ne érje közvetlen napfény, és fontos az egyenletes hőmérséklet fenntartása. Amíg a növények nem erősödnek meg, napsütés esetén szükséges lesz az árnyékolás.

A leggyakoribb eljárás az, hogy a sátrat három napig csukva tartjuk, és kipróbáljuk, hogy az oltás kitart-e a negyedik napon. A növényeknek nem szabad fonnynadni. Ha ez megtörténne, akkor enyhén öntözze meg a növényeket, ne használjon meleg vizet.

Az ötödik napon egy kicsit szellőztessen. Ajánlatos egy kis nyílást hagyni és a növények helyzetét minden órában ellenőrizni. Amennyiben fonnynak, enyhén öntözze meg a növényeket tiszta vízzel és újból csukja be a sátrat. Este, vagy másnap reggel megint lehet résnyire nyitni. A 6. napon nyissa a nyílást nagyobbra, és nézze meg, hogy a növények bírják-e. A hetedik napon távolítsa el a fóliát, lehetőleg reggel vagy este.

6. Cserépbe ültetés és ritkítás

A 7. nap után következhet a szokásos növénytermesztési eljárás. Az átültetés az oltás utáni 9. - 10. napon ajánlatos, amikor az alany és a nemes már masszívan összeforrtak. Ha az oltási csipeszek szilikonból készültek, az eltávolításuk nem szükséges.

Dr. Helyes Lajos, a Szent István Egyetem Kertészeti tanszékén Gödöllőn, Beaufort alanyra oltott fajtáknál a következőket tapasztalta:

- Erőteljesebb növekedés, nagyobb lombfelület
- A virágzás és érés egy héttel később kezdődik
- Eltérő tápanyag- és vízigény
- Nagyobb bogytömeg, kiegyenlítettebb termés, magasabb terméseredmények

Amennyiben a közölt technológiával kapcsolatban kérdései merülnének fel, vagy fajtáinkról szeretne többet megtudni, keresse bizalommal területi képviselőinket!

A GAZDAEST PROGRAMJA:

1. A De Ruiter Seeds Vetőmagtársaság újdonságai a 2002-es termesztési szezonra

ÚJDONSÁGOK:

paradicsom	Lemance F1, Jeremy F1
uborka	Nova F1, Domira F1, Ceres F1
sárgadinnye	Centro F1, Agos F1, Pepe F1
csípős paprika	Balkán F1, DRH 1026, DRH 7134, Daras F1
édes paprika	ZFP 974 F1, Amadeus F1, Regiment F1
tojásgyümölcs	Madonna F1, Tango F1

Előadó: **Czinege Csaba** - területi képviselő

2. Korszerű tápanyag-utánpótlás Kemira technológiával

Hajtatott zöldségfélék tápanyag-utánpótlásának módszerei, valamint a leggyakrabban elkövetett tápanyag-utánpótlási hibák elkerülésének lehetőségei.

Előadó: **Horinka Tamás** - szakmai vezető

3. Kertészeti termesztés során alkalmazott segédeszközök

Növényházak, tápanyag-utánpótlás eszközei, EC és pH mérők...stb.

Előadó: **Hraskó István**

DE RUITER SEEDS

HIBRID VETŐMAG

6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 5.

Tel.: (76) 505-790; Fax: (76) 505-792

E-mail: ruiter@axelero.hu; www.deruiterseeds.com

Szívélyes üdvözléssel
With the compliments of

HUNGARY
KECSKEMÉT-6000

Deák Ferenc tér 5.
Telefon : 76/ 328-480
Tel./ Fax.: 76/ 486-650



DERUITER SEEDS
VETŐMAGTERMELO KFT.