



# Bodleian Libraries

UNIVERSITY OF OXFORD

This book is part of the collection held by the Bodleian Libraries and scanned by Google, Inc. for the Google Books Library Project.

For more information see:

<http://www.bodleian.ox.ac.uk/dbooks>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 UK: England & Wales (CC BY-NC-SA 2.0) licence.





6.160.9.8.

~~78.6.18~~

\* 15073 . f . 8 C

C R . N 9





6.160.9.8.

~~78018~~


\* 15073 . f . 8 C

C R . N 9












A. CORN. CELSUS.  
EX ICONIBUS A SAMBUCCO EDITIS



AMSTELÆDAMI  
Apud JOANNEM WOLTERS. 1713.





C.

Cotus

AUR. CORN.

# CELSI

DE

# MEDICINA

LIBRI OCTO


Brevioribus **ROB. CONSTANTINI,**  
**IS. CASAUBONI ALIORUM**que  
Scholiis ac locis parallelis illustrati.

*Cura & Studio*

**TH. J. AB ALMELOVEEN,**

M. D. ET PROFESSORIS.

*Editio ultima, auctior & correctior.*



AMSTELÆDAMI,

Apud **JOANNEM WOLTERS.** 1713.

6

c



VIRIS CELEBERRIMIS,  
**PETRO PETITO**

E T

**MATTH. SLADO**

ILLI GALLORUM, HUIC  
BATAVORUM MEDICORUM  
PRINCIPIBUS,

THEOD. JANS. AB ALMELOVEEN

S. D.



Ntiquioris Medicinæ  
parentes nobilissimos  
licet, atque ob elegan-

\* 3

ter

## DEDICATIO.

ter fidelissimeque tradita præcepta summopere necessarios, à plurimis nostri seculi hominibus non modo negligi & contemni, verum etiam acerrimis proscindi dicteriis, usque adeo percrebruit, Viri Præstantissimi, ut hospes in literis, in Arte quoque nostra plane peregrinus sit oporteat, qui tam nota atque vulgaria se nescire fateatur. Nec tantum illi, verum etiam (en quo tandem pigrities desidiaque homines perduxit?) illorum cultores vel maximo odio, imo ludibrio habentur. Quod cum animadvertissem, quorum nominibus scriptorem hunc, quem

## DEDICATIO.

quem ob innumera translata loca, non immerito quidam Latinum appellare solent Hippocratem, de novo nostra cura prodeuntem, inscribi gratum esset, non ita diu quærere debui, siquidem non alios nisi Vos, Viri eruditionis fama, multisque ac magnis in universam literarum rempublicam meritis celeberrimi, operis hujus patronos certissimos antiquissimosque potui eligere, quos ne Celsus ipse quidem, si in vitam ei daretur reditus, scriptorum suorum censores recusaret. Nunc itaque nihil mihi restat, quam ut obnixè Vos rogem, ut me



## DEDICATIO.

in amicitiam Vestram recipere, hancque inscriptionem, tamquam benevolentiae observantiaeque erga Vos meae, qualecunque documentum admittere dignemini. Valete. Dabam Trajecti ad Rhenum a. d. xv. Kal. Febr. cIo Io cxxcvii.

THOED.

THEOD. J. AB ALMELOVEEN  
LECTORI  
BENEVOLO

S. D.

**M**ultos non modo proximi, verum etiam hujus seculi eruditione atque fama praestantissimos viros operam in emendandis atque illustrandis A. C. CELSI de Medicina libris, non vulgarem posuisse, qui ignorat, ne scriptorem illum ignoret necesse est. Quis enim est, qui vel primis labris Medicinam gustasse pra se ferat, quem Caesarii, Pantini, Constantini nomen fugiat? quis Jeremiam Threverium, quis Balduinum Ronssseum de fama non noverit? quis de Fodoco Lommio, Petro Pavio nil audivisse se ausit profiteri? quis denique, quid Joannes Antonid. van der Linden praestiterit non observavit? quorum Virorum exemplis, quibus duci solemus, incitatus incredibile quanto legendi, relegendique flagrauerim desiderio? quod repetita aliquoties lectione non leviter accrevit, adeo ut notare que-

\* 5 dant



# P R Æ F A T I O

*dam ab aliis prætermiffa, & hunc Autorem cum aliis conferre fcriptoribus fubinde cœperim, quod cum vidiffent Celfi noftri cultores diligentiffimi, opera pretium me facturum exiftimarunt, fi cum orbe literato hunc noftrum communicarem laborem, promiffisque abhinc fere anno datis fatisfacerem. Quod cum altius in animum descendiffet meum, protinus iftis expoliendis memet applicui. Veruntamen quum variarum lectionum numerum in majorem molem excurrere viderem, editionem vero forme commodioris, & fi ita loqui liceat, portatilis defiderari, confilium mutavi, fatis habens loca duntaxat five noftri auctoris, five alterius medici, parallela indicare, fcriptoris noftri fententiam que aut illuftrarent aut confirmarent. Editioni autem huic rerum atque verborum indicem, quem in omnibus aliis defiderari fciebam editionibus adjicimus, de industria, ne nimiam in molem affurgeret nunquam è manibus deponendum hoc *Medicine ἐγχειρίδιον*, aliquanto contractiorem; quod præ manibus nobis fit, ejufmodi lexicon, quale una cum notis eruditiffimis in *Celfum* à viro fama fuper æthera*

## ad LECTOREM.

thera noto, Joanne Rhodio confectum, incendio tristissimo absumptum summopere dolemus, alii editioni subnectendum. Subjuximus, quae loca difficiliora explicant R. Constantini annotationes selectas ex exemplari, alias rarissimo, è Cl. Grævii Bibliotheca deprompto. Scholia eruditorum facile principis Isaaci Casauboni, margini codicis quo fuerat usus, festinantissime illita, quae ex τὸ πᾶν Isaaci Vossii Gazophylacio secum attulit Gothofredus Thomasius, ὁ χρηρίεστος, pro amicitia atque necessitudine, quae inter nos intercedit non vulgaris, quam benignissime mecum communicavit; quae licet breviora, numero pauciora, minimeque publice luci ab Autore adaptata, ob religionem tamen, qua summa eum colo, suppressere non potui aut minus grata fore putavi. Quid vero ipsi praestiterimus lectione ipsa consequetur H. Lector, quem duo monitum velimus, numerum margini impressum loci paralleli paginam versumque indicare, alterum in notulis, ubi citari libri saepenumero auctoris reticetur nomen, Hippocratis debere intelligi.

CL.A.

CLARISSIMO VIRO,  
DOMINO  
GUIDONI PATINO  
BELLOVACO,  
DOCTORI MEDICO PARISIENSI,  
ET PROFESSORI REGIO,  
AMICO SUO MAGNO  
SALUTEM.

CLARISSIME VIR,



ICERONIS ista gloriatio est: *Latinos omnia invenisse melius, quam Græcos; aut ab illis accepta fecisse meliora.* Augusta profecto, & magno viro magnarumque rerum fiduciam habente digna! Quam & veram minimeque vanam deprehendit, quisquis à Romanis posteritati tradita comparat cum Græcis. Ne longum abeam, Oratorum quidem laus ita ducta fuit ab humili ad summum: fuere & Philosophiæ studia sic ad Latinos traducta, ut ne bibliothecis quidem Græcis egerint. Neque vulgare est, quod de nostra arte Celsus promeruit. Quam enim ab Hippocrate, ab Asclepiade, ab aliis Græcorum plurimis accepit scribendi de Medicina materiam, hoc ipso fecit meliorem, quod primus eam sic conceperit, ut esset ad discendum aptior, ad faciendum promptior. Græcorum antea nemini, quod sciam, id laudis datum, quod artem redegerit in systema, & corpus methodo consti-  
tu-

tutum. Celsus præstitit, & res faciendæ medicinæ utiles ac solum necessarias ita ingeniose ac diligenter ex antiquis elegit, ita per partes digessit, hæcque ipsas innexuit inter se, ut vel Recentiores inter non noverim, quem ipsi jure possis anteponere. Neque ad eam laudem refert, sermone tantum, an etiam opere fuerit medicus. Si enim coire ista semper necesse est, quotusquisque hodie medicus est? Cathedrarios quippe videas medicinæ scientiam plerumque subtilius, quam ex usu, excolere, atque hoc per ambitionem, quam vocant veri scrutationem, agere, ut ingenio & facundia vincant. Contra, qui quæstui serviunt, bene gnari, morbos non eloquentia, sed remediis curari, ut populo placeant, ex quo ille major est, sufficere credunt secreta jactare & his curatorum longas ostentare tabellas. Hippocrates certe pro Medicis habet, qui veram artis sibi cognitionem compararunt: sed transferre ad usum suadet, & fructum eorum, quorum gratia est inventa. Saperene putandus est, qui lucernam accendit, & subter modium ponit? Sapit, & bene de se ac proximo meretur, qui accensam imponit candelabro, ut alluceat omnibus qui sunt in domo. Cæterum hoc dubitare de Celso docti solent, fueritne in operibus Artis exercitatus. Quo de quia meam aliquando sententiam rogasti, dicam paucis. Magnum quid medendi scientia est: majus, prudentia atque sapientia. illa quippe scientiæ oculus; hæc manus est. Absque prudentia si est, neque tempora lustrare Medicus rei bene gerendæ, neque præcipites captare occasiones potest. Absque sapientia si est, tractare homines ignorat, & suo quemque calopodio calcare. Uti vero scientia nisi discendo, hoc est.

est, legendo, audiendo, cogitando; ita prudentia & sapientia, nisi faciendo & rebus se gerendis accommodando, non comparantur. Ex artis scientia Celsus si venit æstimandus, vix persuaderi potest, ut is non habeatur pro Medico, & quidem usu longo atque exercitatione perfecto, qui suis scriptis Medicinæ intima penetralia subisset, abdita quæque enucleasse, penitus abstrusâ rimatum esse, suam ubique de iis sententiam interponendo se prodit. Quod esse iudicium novisti ejus, qui præfatus olim ad Rubicum fuit. Probum mihi, & ex toto probatum. Si, quæ in nullius non morbi curatione elucet, prudentiam atque sapientiam spectemus, ubi, te quæso, unum Hippocratem si excipias, utriusque aut salubriora præcepta, aut fideliora monita reperisti? Quæ si numquam noster venit in rem, quemadmodum fuit assecutus? Putasne secreta atque arcana artis, hoc est intimas & occultas ad salutem cujusque pertinentes rationes scire posse eum, qui in conclave numquam penetravit? Quæ sola felicitis ingenii magnitudine complexum, & ob id alieni operis interpretem atque Hippocratis ejusque sectatorum discipulum, & exscriptorem habendum esse potius, quam medicinæ aliquem auctorem, iudicium est viri egregie eruditi. Cui per me subscribere, quibus libet, licet. nam à me non impetro. Si rectum tamen, heu! quantos auctores amissimus! Ex toto quippe Galeni oceano, si dicere per invidiam fas est, non tot interiora medendi consilia quis hauserit, quam ex ubere hoc Cornelii rivo. Fateor, plus est in Galeno florum, ut & foliorum: sed fructuum plus in Celso est. Taceo multis locis sic illum loqui, ut, se tecisse medicinam, liquido fatis demonstrat: nullo sic, ut

con-



contrarium inde queat liquere. Solum obstare videtur; quod Plinius sua ætate, hoc est centum & viginti præter propter annis post, solam hanc artium Græcarum nondum exercuisse scribit Romanam gravitatem, & in tanto fructu paucissimos Quiritium attigisse, eosque ipsos statim ad Græcos transfugisse; imo vero auctoritatem aliter quam Græce eam tractantibus, etiam apud imperitos expertesque linguæ, non fuisse. Si ex vero ista, sicuti causam non credendi non habemus oculato testi; qui credimus Celsum, ex gente Cornelia, omnium Romæ nobilissima, oriundum, factitasse artem, populus quam expertus damnavit? Non hoc ulli volo persuasum, fuisse ἐκ τῶν περιόδουτῶν, quos vocat Modestinus l. 6. §. 1. ff. de Excusationibus; atque adeo solitum ἀνα πλὴν πέλιον φοιτᾶν, & ægros visitatum circumire mercedis causa. M. Catonem meminit idem Secundus professum, esse commentarium sibi, quo mederetur filio, servis, familiaribus. Nec alia ratione medicinam exercuisse Cornelium puto; nec apud alios, nisi forte quod non-nemini video placere, in gravioribus casibus sit passus se adiri, & eam rogari operam, quæ virum nobilem non dedeceret. Verbo: talem opinor fuisse Medicum, qualis Cato fuit, aut quales sunt hodieque Regum archiatri. Qui, etsi non omnibus vigilant, miserabilibus tamen personis & ad se, ceu Æsculapium aliquem, confugientibus suam negare opem non sustinent; scientes, nulla re hominem magis accedere ad Deum, quam salutem hominibus dando. Præter hæc quæ aut dici in eandem sententiam, aut objici possunt, jam sunt ab aliis vel occupata vel refutata: ut necesse non sit illis repetendis vel tempus prodigere, vel doctas tuas aures & gravioribus intentas  
\* \* \*  
curis

curis obtundere. Hoc unum dicam, qualis qualis  
noster fuerit, dignissimus est, vel doctrinæ cultu,  
vel elegantix nitore, non solum qui legatur, sed  
qui numquam de manibus deponatur. Me, fateor,  
nullius post Hippocratem lectione vel affici magis,  
vel erudiri. Quo factum, ut & sæpius relegerim,  
& numquam sine voto, existeret aliquis, qui aut  
daret eum nobis quam emendatissimum, aut  
emendandi materiam suppeditaret. Quam tuo  
tandem beneficio consecutus nobilem & locuple-  
tem, statim operi admovi manum; quo & meæ  
satisfacerem cupiditati, & expectationi eorum,  
apud quos nulla non occasione & laudare Corne-  
lium nostrum, & serio commendare sum solitus.  
Quam autem feliciter mihi res sub manu succes-  
serit, te velim vel in primis judicare. Nam hæc  
inter plurimas mihi causa est, quod Celsum  
istum, quem meum imagine quadam adoptionis  
feci, celeberrimo tuo nomini, & multis mihi no-  
minibus suspiciendo colendoque consecrarim. In  
seculi quippe hujus & tam antiquitatis fastidiosi,  
quam novitatis omnis cupidi, conspectum pro-  
diturientem, nec sine patrono ausum, cujus in  
clientelam potius, quam tuam debui dare? Ab-  
sque illis certe subsidiis, quæ mihi numquam sine  
summa laude loquendum studium tuum juvandi  
publicum tulit, si fuisset, vel animum non appli-  
cuissem ad recognitionem Authoris ut eruditissi-  
mi, ita & corruptissimi. Quis credat, post Egna-  
tii, Cæsarii, Constantini, Stephani, Pantini,  
Ronssæi, Rubei, tot illustrium virorum diligentis-  
simas curas, fuisse mihi plusquam bis mille locis  
corrigen- dum? Quo ipso quia fecisse me opus pu-  
tabam non pœnitendum, aut tuo nomine & se-  
culo indignum, etiam hoc ausus sum illi inscri-  
bere. quamvis non ignorem multo plura majora-  
que

que me debere amori & beneficiis in me tuis. Itaque te rogo, Vir Clarissime, hanc cautionem accipere crediti, & animi ad omnem se gratitudinis memoriam obligantis. Certe hunc, quem eo vultu, quo omnes literatos soles amplecti, suscipiendum tibi offero, si non industriæ, saltem laboris mei foetum, testem esse volo, quanti & sim & in perpetuum tibi sim futurus debitor. Deus autem immortalis diu te sospitem atque incolumem Rei medicæ, literariæ, publicæ, imo mihi & omnibus bonis conservet. Dabam Lugduni-Batav, Mense Augusto, anni c1o1oCLVII.

*Tui nominis atque dignitatis  
cultor propensissimus*

JOH. ANTONIDES  
VAN DER LINDEN.

★★,

L E-



# LECTORI S.



ISTO tibi, amice Lector, A.  
CORN. CELSUM, authorem  
latinissimum, medicum sapientissi-  
mum, prudentissimumque. Cujus  
ego amorem tibi si velim commen-  
dare, idem fecero, quod hederam qui suspendit  
vino veteri & bono. Quemadmodum namque vir-  
tutem non potest non amare ac sequi quisquis ejus  
pulchritudinem atque pretium novit: ita Celsum  
nemo non aestimat, nemo non diurna versare ma-  
nu, versare nocturna studet, quin in succum &  
sanguinem, quod aiunt, convertere, nisi qui igno-  
rat, quanto nitore atque cultu, quanta industria  
atque solertia istos de Re medica libros octo (solos  
nobis ex pluribus eisque eruditissimis ingenii ac  
vigiliarum egregie elaboratarum monumentis  
reliquis) scripserit, atque ex Hippocrate cum pri-  
mis, medicinae parente, contraxerit, adhibitis  
in omni graviore negotio etiam in consilium  
aliis, & semper quidem optimis authoribus.  
Quales omnino necesse est fuisse, si sola confusus  
ingenii magnitudine, nulla artis exercitatione  
comparata notitia, tam admirandum nobis  
opus concinnare est aggressus. Quod me non cre-  
dere, jam supra dixi. Scepticos in scribendo se-  
qu-

quum, author est Quintilianus. Quod si de sermonis ornatu intellexit, concedi potest: non facile, si de modo doctrinae. Ita enim scripsit, ut qui nequam dubitavit, non suam modo sententiam aperte profiteri, sed & summorum quoque virorum ad incudem cum rationis tum experientiae revocare; quia & necessaria ac laudanda in artibus libertate mutare praecepta eorum, qui medendo scribendoque se ostendebant aberrare, non tam à placitis & à doctrina majorum, quam ab officio medici. quod Asclepiades esse dicebat, referente nostro, ut tuto, ut celeriter, ut jucunde curet. Ubique autem ea usus est modestia Celsus, ut, etsi nunquam tanti putaret authorem, quanti hominum salutem, neminem sua tamen laude fraudaret. Quamquam vero jam ipsius aetate medicina esset in tres sectas, easque plurimum inter se dissentientes, diducta; ita tamen Dogmatica (quae minime omnium deflectebat ab Hippocratica) se applicuit adhæsitque, ut nihilominus etiam ab Empirica atque Methodica principibus accepit, quae rationalis conjectura atque fidelis usus comprobassent: dignus vel ipso proposito, ut eum penetrasse cujusvis sectae omnia, atque delectu habito, in hanc velut multorum operum epitomen congeississe meliora quaeque, credamus. For-

ma operis, supra quam nostrum putat vulgus, ornata est, & ordinata. Sermo toto in opere plenus, purus, venustus, castus, &, quod precipuum est, accommodus rei tradenda; adeo ut in medicina quidem nemo uti meliore scribendi magistro queat. Ordo, quam in toto dilucidus, in partibus articulatus, tam est in utrisque appositus ad usum. Quem ut solum Celsus spectavit, ita nihil eo non pertinens, non necessarium attulit: quin, resectis omnibus, non dicam superfluis, sed quæ aliunde & possunt & revera debent accipi, eam solummodo Medicinæ partem persecutus est, in qua proprie & principaliter ars consistit. Quo de dicerem plura, nisi te discere hoc ex ipso auctore malletm. Ego certe, propter quæ dixi, illum mihi semper habui familiarem, & dignum, in quo non solum versando studii, sed & emendando operæ plurimum, atque laboris ponerem. Itaque conquisitis in eam rem necessariis, quæ quidem potui, hoc in presenti egi, ut textum exhiberem quam maxime emendatum. Feci id adjutus iis subsidiis, quorum mox catalogum exhibebo. Quantum fecerim, non aliunde rectius cognosces, quam si conferre editionem hanc cum omnibus velis, quæ prodierunt hæctenus. Præter quæ dixi,

dixi, saepe mihi fuit Hippocrates adeundus. Quem quanti noster fecerit, non tam ex ore ipsius, quam opere disces. quod, quia omnibus paginis quamplura exinde transsumta continet, auctori meruit nomen Hippocratis Latini. Quae causa mihi curatius utrumque conferendi, & colligendi quoque, quae Foësius in doctissimis suis ad Hippocratem notationibus pridem observavit. Quaedam, sed admodum pauca, ex ingenio tentavi, & nisi cum res aperte postularet. In cæteris, ubi mei mihi libri & ingeniose summorum virorum conjectura non prælucebant, malui errorem retinere, aut locum in suspitione saltem relinquere. Quod & eo securius mihi licere putavi, quia Cl. D. Johannem Rhodium, virum inter seculi & nostrae artis primos, à multis annis ex multo plurimis cum membranarum libris emaculatissimum & quem ab Authore habuit, nitore hanc dubie restitutum ac luculentissimis commentariis illustratum, penes se servare scio. Quem & rogo (si quid veteris se amicitiae memoria patitur rogari) ut ne diutius protollat expectationem atque desiderium eorum, qui & Celsum & Rhodium in pretio & amore magno suo merito habent.

Glossemata offendi plura: nullum tamen,  
\* \* 4 præter

præter forte unum, quod nimio erat ἀπροσδιόνυστον ausus sum de medio tollere, quia nullum huc præeuntem habebam librum. Librorum in capita distinctiones uti ab ipso autore esse certum est ex VI. 12. & VIII. 9. in fine: ita lemmata illis adscripta esse à librariis, & è margine in titulos transsumta, ne locus quidem dubitandi est. unde & aliquid licere mihi in istis putavi. quin, si forma operis fuisset, redire eo, unde venerant authoris injussu, jussissem. Præter hæc animus erat, notas addere, & quasdam nostras in authorem observationes: sed, præter quam modo retuli, causa alia fuit libri forma. Quam & ego & typographus εὐμετακόμισον in præsens malebamus: ille, lucri gratia; ego, authoris. Quem mihi spes est reperturum tanto plures emtores lectoresque, quanto est editio ista cæteris emendatior, & elegantior atque aptior ad circumferendum. Vale, & tuus mihi favor sit stimulo ad tuum in commodum majora melioraque conandum.

AUR.



AURELII CORNELII CELSI,

V I T A

à

*Clarissimo Viro*

JOANNE RHODIO

Conscripta.

CORNELII CELSI laudabilem  
in Re Medica operam annis jam  
mille sexcentis, & quod superat, Ex-  
perientia, veritatis prima parens, feli-  
citer probavit. Nec melioris animi  
quisquam ita ab omni humanitate re-  
motus fuit, cui non venerandum tam  
illustre nomen. At ingenio magis, quam  
origine notum, quam, relictâ soli ani-  
mo gloriâ, temporis diuturnitas poste-  
ritatis memoriæ exemit. Quamvis e-  
nim Romæ vixisse Celsum, ipsius, si-  
ve ut aliis visum, Scribonii Largi ad J.  
Callistum Epistola indicio sit: non de-  
sunt tamen causæ, cur addubitem, pa-  
triâ, an jure civitatis ipsum Romanis

\* \* 5

ac-

## AUR. CORN. CELSI VITA.

accenseam. Maximeque, quum præter hunc, quidam Julius Celsus Hadriano Imperatori à Consiliis, vel ex aliorum sententia, Alexandri Severi temporibus, Juris scientiâ perhibeatur claruisse. Vid. Spartianum in Hadr. 30. & Pompon. Jc. lib. 2. in fin. de Orig. Jur. & Politianum lib. 5. Epist. ad Jac. Modestum. Equidem Celsum Patrem ac Filium Jureconsultis annumerat Hotomannus in Descriptione Jurisconsultorum, & Juventium Celsum Patrem ad Vespasiani Imperatoris tempora refert Jacob. Gothofred. Histor. Jur. Civil. cap. 7. de Jurisconsultorum successione. Idem Celsum Patrem & Filium sub Trajano, Hadriano, Antonino Pio vixisse censet. Verùm & Apulejus Celsus Valentis ac Scribonii Largi in Medicis Magister occurrit apud Scribonium Largum de Compos. Med. cap. 94. & 171. Cujus præter Agricola Woverius in Apulei Vita mentionem injecit. Nisi fortè cum Cornario in Marc. Empirici Præfat. interposito inciso, Apulejo, Celso, distinctè legendum fuerit. Ita in præfat. Marcell. & Apulejus  
& Cel-

## AUR. CORN. CELSI VITA.

& Celsus occurrunt. Volaterranus etiam meminit in Anthropologia lib. 14. Celsi cujusdam, qui Philosophiæ Stoicæ sectator, Origenis erat adversarius, magiæ scientiâ notus, cui Lucianus Pseudo-Mantem inscripsit. Eiusdem quoque nominis ibidem, imperante Nerone è Galliis puer novennis martyrio nobilitatus. Numo etiam innotuit apud Augustin. Dialogo 5. de Num. Celsus quidam III. Vir. Noster autem Augusti ævo floruit, ex quorundam sententia, inter quos Jo. Britannic. in Juvenal. Sat. 6. & 7. Ovidii autoritate, vel ut Jo. Cajo placuit, Cl. Tiberii, A. C. 29; aut certè Caji Imp. conjecturâ Sambuci, Viri Antiquitatis notitiâ clarissimi. Major tamen eruditorum pars sub Tiberio vixisse, vel fortè ipso imperante natum usque ad Trajani tempora vitam produxisse censet; quamvis & sub Nerone vixisse putet Thom. Fienus. Ut uno seculo vetustior Galeno videatur. Cæterum, non levem hic de Patria ejus dubitandi occasionem præbet Cæl. Rhodiginus, qui Antiq. Lect. Lib. 14, cap. 5. Veronen-



## AUR. CORN. CELSI VITA.

nenses, ait, cum Macrobio, Vitruvio, & Plinio, Celsum quoque suum ortu civem agnoscere. Librorum inscriptionibus hujusmodi divinationes stabiliri assolent. Sed exigui momenti munimento. Notius enim est, quam ut pluribus confirmetur, Librorum titulos Literatoribus & Librariis arbitrarios fuisse, vixque veterum quempiam ulli suorum Commentariorum quidquam prænotasse, referente de semet ipsum Galeno lib. 7. Meth. Med. cap. 1. qui id officii ab Amicis habuit: haud dubiè istius ævi modestiâ, quod ingenia admiratione superiora protulit. Sed enim, ut mala exempla ex bonis initiis orta: Ita ex æmula, in conqui- rendis magnorum ingeniorum monu- mentis, Principum munificentia, ac- crescente paulatim Librariorum avari- tiâ, omnes propè optimorum etiam Au- torum præscriptiones impunè, ad lucro- sam cujusque libidinem, immutatæ, ne dicam adulteratæ.

Atque ut ad Celsum redeam; quot ejus hodie Editiones, tot fermè In- scriptiones diversæ. Cæsarii habet,

*An-*

## AUR. CORN. CELSI VITA.

*Aurelii Cornelii Celsi de Re Medica VIII. Libri* eruditissimi. Vulgatæ Lugdunenses omnes, & Leydensis modestius sine phalerato encomio A. C. C. D. M. L. VIII. Horum priorem Cajus sic mutavit: *Aurelii Cornelii Celsi Romani de Re Medica Libb. VIII.* pereruditi. H. Stephanus in suo exemplari cæteris Medicinæ Principibus adjecto receptæ lectioni subdidit; Operis ab eo scripti Pars Sexta. Vett. Codicum MS. auctoritatem secutus, quibus communis hæc inscriptio: *A. Cornelii Celsi Artium Liber VI.* Nihil tamen hic præter consilium & rem ab illo temerè factum. Patriam enim sive Autor ipse sive alius quispiam addiderit, id certè non caret vetustatis exemplo, potissimum apud Græcos, quos inter Celsus sibi *Hippocratem Coum* inprimis imitandum proposuit, cujus etiam pleraque non infeliciter Latino sermone reddidit, suam ipse testatus in Epist. ad Pullum Natalem, in hoc studiorum genere diligentiam, longè accuratiorum, quam Largii designationi, qui Epistolâ ad filios se fuisse liberio-rem fatetur, quemadmodum notante Cornario

## AUR. CORN. CELSI VITA.

rio in Dedic. Marcelli, in plerisque Hippocratem expressit, ut integras sententiarum periodos ex ipso descriptas subinde in eo videas; imò tota capita nihil aliud quam Hippocratis sententias ad verbum reddunt. Hinc non immeritò Hippocratis Simiam dixit Nic. Monardus, de V. S. in Pleurit. f. 8. Etsi verò Latini Scriptores Patriam haut usque jactabant: neutiquam tamen diffitendum, antiquitus Romanæ civitatis jus gloriosum fuisse. Quo fortè venditores Autorem nostrum commendare satagebant; sive is meritis & gratiâ civium numero adscriptus esset; sive Româ oriundus. Posterius tamen ut credam, suadet præter apertum Auctoris lib. 5. cap. 21. textum, Epistola ejusden ad Callistum, & persuadet ad Pullum Natalem altera; in quibus inprimis Viri boni genius conspicitur. Imo Marcellus in Præf. Operis Cornelium Celsum inter viros illustres & cives enumerat, quicquid ei imposuerit Verderius. Cens. p. 144. Ejus Columella, Claudii tempore clarus, ut æqualis aut certè paulo superioris, Rei Rust. lib. 1. cap.

## AUR. CORN. CELSI VITA.

cap. 1. sic meminit: *Nostrorum temporum Cornelius Celsus totum corpus Disciplina, quinque libris complexus est.* Quem Rusticam intellexisse, vero proximum est. Quintiliani sententia Inst. Orat. lib. 10. cap. 1. is Vir Eruditus, inter eos Philosophos Latinos, quos eloquentes literæ Romanæ tulerunt, qui scripsit non parum multa, scepticos sequutus, non sine cultu & nitore. Ideoque ob nimiam novitatis cupiditatem, ejusdem censurâ notatur. Scripta ejus figillatim prodidit Volaterranus Anthropol. l. d. Cornelius Celsus mediocri Vir ingenio, non solum artem Rhetoricam, sed de re Militari, & de Rusticana, deque Medicina libros composuit. Quæ omnia J. Doussa æternum gentis & generis sui decus in Sylva Extemporal. hoc Epigrammate venustissimè complexus:

*Facta urbana tuo res Rustica munere,  
scriptis*

*Nec minus illustris est Medicina tuis.*

*Hinc quoque Militiæ tractasti commoda  
Rhetor,*

*Hoc Martem Musis jungere, Celse, fuit.  
Sub-*

## AUR. CORN. CELSI VITA.

Subjungit Polyhiflor Italus : *Ad nos tantum ejus Medicina pervenit Oratorio more conscripta.* Sed & quædam Rhetorica ejus nostrâ ætate Sixti Popmæ studio feruntur emissa. Veterinariam quoque conscripsisse autor est Mercurialis lib. 4. cap. 2. & Phil. Ingrass. Quæst. de Veterinar. cap. 9. Herbarium verò ei adscriptum, Apuleji potius credit in vita Apuleji Elmenhorstius. Julium quidem Celsum inter rei militaris Scriptores enumerat Rob. Valtur. quemadmodum huic à nonnullis adscripta sunt Julii Cæsaris Commentaria. De quibus tamen nihil verè constat. Varia fanè ejus eruditio aliud prodere non potest quam Virum ingenuè natum, magna seculi felicitate, quod bonarum literarum erat feracissimum. Excepit nempe coluitque ea ætas Viros scientiâ, prudentiâ, ac eloquentiâ summos, Tullium, Salustium, Catullum, Virgilium, Propertium, Horatium, Tibullum, Manilium, Vitruvium, Antonium Musam, Ovidium, Livium, Scribonium Largum, Valerium Maximum,



## AUR. CORN. CELSI VITA.

mum, Velleium Paterculum : atque si se in Claudii imperium ipsius extenderit vita, Quintum Curtium, Persium, Senecam, Silium Italicum, Plinium, Viros omnes consummatissimos, in quibus tamen postremum nonnulli Celso Juniorem censent. Opinionem meam firmat laudabilis veterum consuetudo, qua tria nomina Nobiliorum, Celso etiam Plinii auctoritate rata, Libertis rarò, nec fermè sine gravi causa unquam concessa scimus, quibus tamen semper servile nomen remansit. Nec moror, quod Celsi Epistolæ apud Marcellum in limine Operis Prænomen desit, quo soli Romani insigniebantur. Nomen enim apud bonos Auctores sæpe Prænomen & Cognomen includit. Hinc Martialis :

*Ut jugulem curas, nomen utrumque  
bibam.*

Salutaribus itaque disciplinis Græcisque literis, non levi nobilitatis indicio, rectè institutus, facilè potuit seculo tam augusto ac beato, nihil non (ut ipse in Epistola ad Natalem refert)

\*\*\*

di-

## AUR. CORN. CELSI VITA.

dignum sublimi Romanorum majestate de bono Medicinæ Artis splendidissimè scribere, idque perennitati & literis mandare, utilitatis magis quam delectationis causâ.

Scio equidem, non deesse multæ auctoritatis Viros, qui ex modo adducta Celsi Epistola opinantur, ipsum animo in diversa studia diviso, Græca duntaxat medicinalia in Latinum convertisse, aut Empedoclis & Democriti exemplo non ut merus atque ad quæstum Medicus, sed ut sapientem, atque, ut Columellæ verbis utar, universæ naturæ prudentem, Medicinam veluti Philosophiæ partem cum sapientiæ studio conjunxisse. Ideoque nec factam ejus ab Aureliano mentionem, Barthio Adv. lib. 38. cap. 3. censente. Nec denique unquam Medicinæ operatum. Credat qui volet. Nec eam litem meam facio. Medicum certè agnovit magnus Scaliger de Re Num. 36. Remedia quidem, Hippocratis & Galeni exemplo, aliunde congesta digessisse, ultrò largior, ipsam verò Morborum τέκμαρσιν & θεραπείαν proprio ingenii ductu

## AUR. CORN. CELSI VITA.

ductu contextam pro me res ipsa loquitur. Quin ipsum Pharmaca præbuisse, non mediocri gloriâ, ex ipsius ad Julium Calistum Epistola satis liquet. Quorum artificiosam missionem se accuratè intellexisse prodit ipse lib. 7. cap. 26. Unde Cornarius fortassis inter Pharmaceuticos reposuit. Imò deditâ operâ ab aliis prætermissa proferre ac illustrare voluisse censuit Minadous variæ eruditionis Medicus, de Ext. Affect. lib. 2. cap. 3. Maximeque Medicum ejus Chirurgica probant, quæ Gesneri in Catalogo Chirurgorum sententiâ, veterum solus Latine scripsit, ut verè ipsum inter Chirurgos reponat doctissimus Septalius Animadv. lib. 8. Caut. 1. & 40. Tantâ verò id fide peregit, ut Hieronymus ab Aquapendente Medicus & Chirurgus usu vel annis nemini secundus, in Operat. Chirurg. cap. de Chir. Dent. his verbis sese in ipsius laudes diffuderit : *Mirabilis Celsus in omnibus : quem nocturnâ versare manu, versare diurnâ, consulo.* Nec mirum : quum Celsus eruditissimo Manardo Epist. Medic. lib. 9. Epist. 1. bonus & fidelis

\*\*\* 2

Hip-



## AUR. CORN. CELSI VITA.

Hippocratis interpres, licet in aliquo verbo quandoque lapsus videatur. Quod Viro in omni literarum genere exercitato vel ipsa πολυγραφία libenter profectò condonari jubet, quamvis non diffiteatur ipse non pauca se ex aliena quandoque sententia posuisse. Horatio pariter Augenio de Miss. Sanguin. lib. 8. cap. 1. Lommio, Ronseo Epist. Medic. lib. 8. sect. 3. cap. 7. Schenckio, Jo. Heurnio, Bened. Matamoro, Rod. à Castro, innumerisque præclari judicii Medicis, propter singularem & succinctam cum elegantia doctrinam, Latinus Hippocrates appellatur, in quo Pantini judicio Comment. ad Celsi lib. 1. cap. 1. optimæ Methodi ac viæ rationisque docendi discendique, & in summa brevitate mira Artis & Sapientiæ observatio plerunque animadvertatur. Rectè igitur Agricola de Pond. Rom. lib. 4. *Celsi, inquit, autoritas Medicis nota est, aut saltem esse debet.* Quam elegantissimis verbis Cælius Rhodiginus Antiq. Lect. lib. 26. cap. 3. insinuavit: *A. Cornelio Celso versuram faciunt multi. Verùm citra illius sen-*

## AUR. CORN. CELSI VITA.

*sententiam nihil fermè promunt; perinde ac verba sint veterum sacrorum, quæ demutasse piaculare flagitium planè censeri debeat, quodque hostiis majoribus procures. Inde Fernelio, Franciæ Hippocrati, referente Plantio in Vita Fernelii cùm ob orationis puritatem, tum ob sententiarum pondus, quam charissimus fuit. Jurisconsultis procul dubio iisdem nominibus usque adeò venerabilis, ut Pandectas suas hujus Viri auctoritate muniri voluerint. Verùm, ne nimiis laudibus veriùs is oneretur, quam ornetur, quem mortalium nemo rectè vituperavit: unicum Heurnii judicium, inter cetera gravissimum, huic Virtutum coronæ Iemisci loco satis erit. Ita ille Meth. Stud. Med. cap. 5. *Latinos inter Medicos primus est Cornelius Celsus: sed prudenter legendus. Nam in multis Asclepiadem Methodicum sectatur, ut fatetur ipse. Hujus cote stylum subigemus, & pluris Latinitatem ejus quam Medicinam faciemus.* Unicus itaque Celsus, ut scitè idem in Epist. ad Ronff. Celso præfixa, Medicis Latinis præferatur: qui pomœria Romanæ eloquentiæ eò protulit, ut*

AUR. CORN. CELSI VITA.

Medicina suavissimo ore eloquentiæ jam sese cultioribus ingeniis meritò commendat.

His quotquot naturæ associavit benignitas, æquos adferte animos, elegantissimi favete linguæ. Ita Vobis, & verum animi sermonisque cultum, & firmam valetudinis præsidia parabit. Tantum est.

*Optandum est, ut sit mens sana in corpore sano!*

# L I B R I

Quibus J. A. van der Linden  
usus fuit in hoc opere re-  
cognoscendo.

**M**ss. seu ἀπόγραφοι codicis Parisiensis,  
descriptum anno CIO CXXIV. Commu-  
nicavit V. cl. D. Joh. Hoornbeeck, SS. Theol.  
D. & Profess. ordin. in Academia, ac V. D.  
Min. in Ecclesia, quæ est Lugd. Batavorum,  
Collega reverendus.

Liber editus Venetiis, apud Aldum 1528.  
in 4. sed sedulo collatus atque emendatus à  
V. cl. Jac. Carpentario, Doct. Med. Pari-  
sienfi & Prof. Regio, ex codicibus duorum  
Med. Parisiensium, nempe Joh. Fernelii,  
viri incomparabilis, & Joh. Capellani, qui  
ei in comitina Archiatrōn anno CIO IO  
LVIII. successit apud Henricum II. Gal-  
liarum Regem. Mutuo dedit V. cl. D.<sup>a</sup> Gui-  
do Patinus, Bellovacus, Doct. Med. Pari-  
sienfis & Professor Regius, amicus mihi exi-  
mius.

Alius ibidem editus 1549. in folio cum  
Medicis antiquis. Quem sua manu V. cl.  
Nic. Nancelius contulit cum editionibus, quot-  
quot suo tempore extabant, excepta S:ephani;

\*\*\*4

1010

a Lettres de Feu Mr. Gny Patin, Lettre CXVI.

toto opere ad marginem adscriptis non modo lectionibus, ubi à libro, qui erat præ manu, variabant; sed & propriis conjecturis, raro non bonis & doctis. Hunc quoque utendum dedit V. cl. D. <sup>a</sup> Guido Patinus, ob singulare publicum juvandi studium nunquam & nulli non laudandus.

Alius Lugdini editus apud Joan. Torneſium 1554. in 12. cui ad oram V. ill. Joſ. Scaliger, ſeculi miraculum, & veteris cujuſdam codicis lectiones & ſuas emendationes atque notas adſcripſit. Quem ipſe teſtamento reliquit V. cl. D. Alio Everhardo Vorſtio, Botanices ac Medicinæ, dum viveret, Profefſori primario; ego autem uſui acceptum debeo V. cl. D. Adolfo Vorſtio, Parenti optimo in utraque & profeſſione & dignitate ſucceſſori digniſſimo, ac Collegæ meo honorando.

Varie lectiones, è Mſs. Codice antiquo Bibl. Regiæ Pariſienſis, qui inſcriptus erat, Medicina antiqua, deſcriptæ anno 1631. à V. cl. D. Joh. Waleo, Med. Doct. & poſtea Profefſore inſigni.

Varie lectiones è libro Sacri Johannis, ab eodem excerptæ. Et has & præcedentes mihi utendas dedit D. Antonius Clementius, o

μικα-

μακαρίτης, Cl. D. Walei ex sorore nepos,  
juvenis doctus, probus, pius, & si fata si-  
vissent, longiore vita dignus.

Præter quæ contuli etiam eorum editiones,  
emendationes, annotationes, lectionesque va-  
rias, quarum in epistola ad Cl. D. Patinum  
feci mentionem. Quemadmodum & illa,  
quæ Janus Cornarius in comm. ad Gal. de  
Comp. pharm. quæque alii & celebres inter  
Criticos (quos Fax Artium liberalium exhi-  
bet) authores observarunt. Hoc quoque te  
scire tua interesse, Lector amice, putavi.  
Nunc adi ad auctorem. Quem, si cum  
cura & studio leges, spondeo,

Lectio lecta, magis decies repetita, pla-  
cebit.

IN-



# INDICULUS

Editionum

C E L S I.

In Folio,

Apud

**N**icolaum, *Florentia* 1478.  
Leonardum Pachel Uldericum Sinczenzeler,  
*Mediolan.* 1481.

Joannem Rubeum, *Venet.* 1493.

Philippum Pinzi, *Venet.* 1497.

Aldum ex emendatione Bapt. Egnatii, *Venet.* 1524.

Christ. Wechelum, *Paris.* 1529.

Aldum cum Medicis antiquis, *Venet.* 1547.

Joannem Oporinum cum Notis Guilielmi Pantini, *Basilea.* 1552.

Henricum Stephanum Tom. III. Medicor. Princip. *Paris.* 1567.

*In Quarto,*

Francisc. Raphelengium, cum Notis Jerem. Thriverii Brachelii & Balduini Ronssci, *Lugd. Batav.* 1592.

*In Octavo,*

Aldum & Andr. Asulanum, *Venet.* 1528.

Johan Soterium, cum Notis Joh. Cæsarii, *Hagenoe* 1528. *Paris.* 1533.

Et *Salingiaci* 1538. *Tiguri* 1540.

— *Lugd.* 1542.

Matthæum Cerommium cum Notis Thriverii, *Antwerp.* 1539.

Marc. Anton. de Galassis, *Patavii* 1563.

Guilielm. Rovillium cum Annotationibus R. Constantini, *Lugd.* 1566.

Hieronymum Scotum, *Venet.* 1566.

Joann.



*In Duodecimo,*

Joann. Tornæsum, *Lugd.* 1549.

*Lugdun.* 1592.

*Lugdun.* 1608.

Joan. Tornæsum & Guilielmum Gazeium, *Lugdun.* 1554.

*Lugd.* 1587. Epistre Françoise à Monfr. de la Scala, p. 325.

Joann. de Tournes, *Genev.* 1625.

Joann. Elsevirium ex recognitione Joan. Antonid. van der Linden, *Lugd. Batav.* 1657.

Salom. Wagenaar, *Lugd. Batav.* 1665.

In Bibliotheca Eduardi Bernardi sunt binæ editiones, seu duo exemplaria cum Mss. collata. Exstant No. 7489. seu 143. & 7495. seu 149. pag. 227. *Catal. Mss. Anglia.*

Simon Bevelaqua *Lugdun.* 1516. in 4.

Simon Silvius. Ejus dedicatio exstat in Edit. *Parif.* 1529. Sed est impressus apud Christian. Wechelium in fol.

JODOCI LOMMII Commentarii de Sanitate tuenda in primum librum de Re Medica Aurelii Cornelii Celsi, Medicorum Romanorum longè principis. *Lovanii* apud Anton. Mariam Bergagne, 1558. in 8.

HIERONYMI RUBEI Annotationes in libros VIII, A. C. Celsi de Re Medica, quibus omnia, quæ ad universam Medicinam spectant, dilucide & compendiose explicantur. *Venet.* ex Typographia Francisci Rampazeti, 1614. in 4.

PETRI PAAW. Amstelædamentis Succenturiatus Anatomicus, continens Commentaria in Hippocratem de capitis vulneribus. Additæ in aliquot capita libri VIII, A. C. Celsi explanationes. *Lugd. Bat.* apud Jodocum à Colster A. 1616. in 4.

JOANNES MORISOTUS scripsit Annotationes in Corn. Celsum, *Basil.* ap. Joan. Oporin. 1547.

PRO-

## PROMISSÆ EDITIONES.

*Franc. Vertunianus in Epistol. Dedicat. in Librum Hippocrat. de Capitis vulner. cum Notis Scaligeri.*

**U** Num addam, quod tibi ac Asclepiadis omnibus scio fore gratissimum, si à te tuique simillimis hunc primum suum conatum probatum iri animadverterit Scaliger, idem in reliquo Hippocrate tentaturum: quod jam in non minus eloquenti, quam fido ejusdem Hippocratis interprete Celso, cursim volutando, perfecit, cujus novam editionem, si per otium relegere dignabitur, castæ emendatæque Latinitatis amantibus propediem adornat.

*Joannes Tornæsius in Epistolis Gallicis ad Jos. Scaligerum, pag. 325.*

**J**'Imprime *Corn. Celsus* en petit volume, comme autrefois feu mon Pere l'avoit imprimé. Je me sers de ce que je treuve de bon en l'edition de Constantin par Rouillé, & en celle de Henri Estienne. J'ay entendu depuis deux jours que vous avez des Notes sur cet Auteurlà, tant de feu Monsieur vôtre Pere que de vous. Je vous supplie bien fort & avec toute affection, qu'il vous plaise me vouloir faire part de ce que vous avez: je l'imprimeray avec toute la diligence qu'il me fera possible. Vous ferez du bien au public, & je recognoistray le secours que vous m'aurez fait ainsi que le trouverez bon.

*Paulo post.*

Pour revenir à mon affaire, je vous prieray me faire ce bien que d'envoyer à Paris au Sire Ambroise Drouard Libraire juré près Saint Benoist ce que vous aurez sur *Celsus*, afin qu'il me le fasse tenir le plus promptement qu'il pourra. &c.

*P. Cole-*

*P. Colomesius Gallia Oriental. pag. 116.*

Celsum etiam pollicebatur Joh. Walæus D.M. de cujus morte Sam. Sorberius in Epistol. Gallicis p. 442. In eundem Authorem notas parabat Ælius Everardus Vorstius apud Leydenses primarius Medicinæ Professor, de quo Cunæus in laudatione funebri.

*Lettres de Feu Mr. Guy Patin, Lettre CXVI.  
de la dernière édition.*

On dit que Mr. Rhodius en fait imprimer un (Celse) à Padouë, & nous avons ici (à Paris) Mr. Mentel qui en promet un pareillement en vertu de plusieurs manuscrits & revisions qu'il a devers soi. Pour ce dernier, quoi qu'il dise & promette beaucoup, il ne fait jamais rien, & dit toujours qu'il fera merveille.

JACOBUS HOLSTIUS Tønningæ Medicus scripsit commentarium in Celsum *Morhof. Polyhistor. liter. IV. cap. 12. pag. 174.*

PETRUS DACQUETUS Furnensis Medicus scripsit Commentarium in Celsum. *Valer. Andr. Deffel. Biblioth. Belgic. p. 734.*

## TESTIMONIA

E T

ELOGIA de CELSO.

*Quintilian. Instit. Orat. L. XII. C. XI.*

Quid plura? cum etiam Cornelius Celsus mediocri vir ingenio non solum de his omnibus conscripserit artibus, sed amplius rei militaris, & rusticæ etiam, & medicinæ præcepta reliquerit? dignus vel ipso proposito, ut eum scisse omnia illa credamus.

*Fran-*

*Franciscus Floridus Sabinus Lectio.*  
*Subcisiv. lib. I. cap. IV.*

Cornelium Celsum ego tam excellentem scriptorem fuisse reor, ut paucos ei anteponendos Latium protulisse censeam, cum medicinam tam candide, eleganterque Romanis literis illustraverit, quam potuit, qui ingenium sic ad omnes scientias versatile habuit, ut ad id unum à natura formatus videretur, quod vir præstantissimus tractare constituisset. Itaque cum ejus, quæ exstant, lucubrationibus nihil sit pulcrius, nihil elegantius, quam ornate Philosophica explicasse credendus est? de quibus non pauca ab illo Scepticos imitato scripta fuisse, memoriæ prodidit Fabius Quintilianus, in iis etiam Celso persæpe (ut ejus de Oratoria Institutione libri testantur) adversatus, quæ ad Oratoriam artem spectantia, utinam cum infinitis aliorum voluminibus commune naufragium passâ non fuissent. Nam & Celsi ingenium latius agnosceremus, & Rhetoricos ad Herennium libros non modo non ad Celsum, sed ne ad mediocrem quidem Celsi auditorem esse referendos, tamquam in speculo (ut est in proverbio) conspiceremur.

*Claudius Verderius Censio. in*  
*Auctores, pag. 144.*

Cornelius (Celsus) de Latinitate est tam bene meritus, ut inter Latinos videatur is, qui inter Græcos Theophrastus fuit. Sed Hippocratem, & Græca pene omnia parum feliciter veruit. Exemplo sit Aphorismus quidam Hippocratis, quem ille sic interpretatur lib. II. cap. VII. circa finem. *Alvus nigra, inquit, sanguini atro similis repentina, sive cum febre, sive sine febre pernicioza est. αὐτόμαλ* autem in Hippocratis Græco non repentinum, sed spon-

spontaneum significat : ut idem alio Aphorismo  
*αὐτομαίτως κόπυς ἀθραγγέλης καὶ κήρυκας τῶν νόσων*  
 esse dixit, hoc est lassitudines non quidem repen-  
 tinas, sed spontaneas, prænuncias & præcones  
 morborum esse. Etenim ex repentino motu re-  
 pentina lassitudo evenire potest, non tamen erit  
 morbi prænuncia, quia causam habet motum :  
 deinde vero Celsus, *repentina*, particulam ita col-  
 locat, ut ad *albumine* an ad *febrem* referatur, vix  
 dignoscas. Melius itaque vertit Theodorus: *De-*  
*jectiones nigrae modo sanguinis atri sponte ve-*  
*nientes, cum febre sive sine febre pessima sunt, &*  
*quo plures sunt pravi colores eo pejus: sed si ex*  
*medicamento tales digeruntur melius est, & qua*  
*plures non pravi colores eo melius.* Nec quoque  
 integrum Aphorismum vertit Celsus, sed senten-  
 tiam Hippocratis secuit per medium. Nec Theo-  
 dorus utique bene vertit, sic enim transtulit Apho-  
 rismum 79 particulæ IV. *Si quis sanguinem mingit, &*  
*grumos, & guttatim emittit urinam, ac dolorem ad*  
*ventrem imium, & pectinem & foemen, vitium vesicae*  
*laborat.* Celsus in eundem errorem incidit. *Aut*  
*si paulatim distillat, ait Celsus, vel si sanguis per hanc*  
*editur, & in eo quaedam cruenta concreta sunt, idque*  
*ipsum cum difficultate redditur, & circa pubem inferio-*  
*res partes dolent, in vesica vitium est.* Græcum autem  
 Hippocratis, *in vesica*, non habet, sed *circa vesicam*  
 hoc est, *ἄλὲ κώσης*. Celsus lib. II. cap. 2. *Si Austri*  
*pluviaque hyemem occuparint, ver autem frigidum &*  
*siccum est gravis quidem foemina, quibus adest partus*  
*abortu periclitantur: hæ vero quæ gignunt, imbecillos*  
*vixque vitales edunt. Ceteros lippitudo arida, & si*  
*seniores sunt, gravedines atque distillationes, male ha-*  
*bent.* Hæc ad verbum ex Hippocrate esse viden-  
 tur, nisi quod *συντόμως ἀποθήσκειν*, male habere  
 non est. Magna certe est differentia inter male  
 habere



habere & continuo mori. at male habet, qui continuo moritur. credo equidem: sed ita fit, Celsus Hippocratem non bene vertit. Pylorum intestinum à Græcis ita dictum esse commentatur quod per partes inferiores, tanquam per ostium, ea quæ in corpore excrescunt, emittat: cum Pylorum, pugnante è diametro ratione, tale nomen sortitum esse ex Galeno pateat, quia scilicet nihil nisi prius in chylum (chylum enim pro Latina voce usurpant medici) conversum tanquam bonus janitor exire sinat, & postea ad inferiora intestina deducit, non ut dejiciat, sed ut remoretur potius in corpore, & ab hepate in sanguinem transmittatur. Eaque ratione permotus Galenus V. de Usu partium, non τῶν ἄστρομαίων, sed alimentorum ait esse instrumenta: ideoque à natura flexuosa facta ut. cibus non repente fluat, sed persistans concoquatur & nutriat. Apud Celsum deniq; observationes quædam sunt ludicræ: qualis hæc, si nimirum ægrotus summis digitis extrema parietum evellat, hoc est lapillos ex muro exradicet, signum mortis esse.

Ab hoc Latinitatis amantes Latinas morborum nuncupationes repetere debebant. *Vertunianus in Hippocrat. librum de vulneribus cap. pag. 71.*

Medicorum Deus. *Casaub. Ep. 29.*

Purissimus Scriptor Cornelius Celsus.  
*Voss. de Vitiis Serm. I. c. 16.*

A. CORN.



A. CORN. CELSI  
M E D I C I N Æ  
LIBER PRIMUS.

P R Æ F A T I O.

**V** TALIMENTA sanis corporibus Agricultura, sic a sanitatem ægris Medicina promittit. Hæc nusquam quidem non est. Siquidem etiam imperitissimæ gentes herbas, aliaque prompta in auxilium vulnerum morborumque noverunt. Veruntamen apud Græcos aliquanto magis, quam in cæteris nationibus, exulta est, ac ne apud hos quidem à prima origine, sed paucis ante nos seculis; utpote cum verustissimus auctor Æsculapius celebretur. Qui, quoniam adhuc rudem & vulgarem hanc scientiam paulo subtilius excoluit, in deorum numerum receptus est. Hujus deinde duo filii, Pödalirius & Machaon, bello Trojano ducem Agamemnomem secuti, non mediocrem opem commilitonibus suis attulerunt.

a De Vet. Med. T. viii. 22. b De Vet. Med. iii. 8. c Orat. Theff. N. 178. d Orat. Theff. 183. Maxim. Tyr. Dissert. xxix. Plato de Rep. l. iii. pag. 407. T. 2. ed. H. Steph. Aristides Oration. in Asclepiada.



lerunt. Quos tamen Homerus non in pestilentia, neque in variis generibus morborum aliquid attulisse auxilii, sed vulneribus tantummodo ferro & medicamentis mederi solitos esse proposuit. Ex quo apparet, has partes medicinæ solas ab his esse tentatas, easque esse vetustissimas. Eodemque auctore disci potest, morbos tum ad iram deorum immortalium relativos esse; & ab iisdem open posci solitam. Verique simile est, inter non multa auxilia adversæ valetudinis, plerumque tamen eam bonam contigisse ob bonos mores, quos neque desidia, neque luxuria vitiant. Siquidem hæc duo corpora, prius in Græcia, e deinde apud nos affligerunt. Ideoque multiplex ista medicina, neque olim, neque apud alias gentes necessaria, vix aliquot ex nobis ad senectutis principia perducit. Ergo etiam post eos, de quibus retuli, nulli clari viri medicinam exercuerunt; donec majore studio literarum disciplina agitari cœpit, quæ ut animo præcipue omnium necessaria, sic corpori inimica est. Primoque medendi scientia, sapientiæ pars habebatur, ut & morborum curatio, & rerum naturæ contemplatio sub iisdem auctoribus nata sit: scilicet his hanc maxime f requirentibus, qui corporum suorum robora inquieta cogitatione, nocturnaue vigilia minuerant. Ideoque multos ex sapientiæ professoribus peritos ejus fuisse accepimus: clarissimos vero ex his Pythagoram, & Empe-

e Serv. ad Virg. Aen. I. 641. Isid. Orig. L. XIV. c. 111. p. 1162. Suidas V. Ἀπόδοσις f Cælius Aurelianus. Tard. Pass. I. v. c. 9. Hippocrates. Democrit de nat. hom. 13.

Empedoclem , & Democritum. Hujus autem ( ut quidam crediderunt ) discipulus Hippocrates Cous , primus quidem ex omnibus memoria dignis , ab studio scientiæ disciplinam hanc separavit , vir & arte & facundia insignis. Post quem Diocles Carystius , deinde Praxagoras & Chrysi-  
 5 pus , tum Herophilus & Erasistratus sic artem hanc exercuerunt , ut etiam in diversas  
 10 curandi vias processerint.

Iisdem temporibus in tres partes medicina diducta est : ut una esset , quæ victu : altera , quæ medicamentis : tertia , quæ manu mederetur. Primam *δαιτητικὴν* , secundam *φαρμακευτικὴν* , tertiam *χειρουργικὴν*  
 15 Græce nominaverunt. Ejus autem , quæ victu morbos curat , longe clarissimi auctores etiam alius quædam agitare conati , rerum quoque naturæ & sibi cognitionem 13, 11.  
 20 vendicaverunt , tanquam sine ea , trunca & debilis medicina esset. Post quos Serapion , primus omnium , nihil hanc rationalem disciplinam pertinere ad medicinam , professus , in usu & experimentis eam posuit.  
 25 Quem Apollonius , & Glaucias , & aliquanto post Heraclides Tarentinus , & alii quoque non mediocri viri secuti , ex ipsa professione se *ἐμπειρικούς* appellaverunt. Sic in duas partes ea quoque , quæ victu curat ,  
 30 medicina divisa est , aliis rationalem artem , aliis usum tantum sibi vendicantibus : nullo vero quicquam post eos , qui supra comprehensi sunt , agitante , nisi quod acceperat : donec Asclepiades medendi rationem

nem magna ex parte mutavit. Ex cujus  
 successoribus Themison nuper ipse quo-  
 que quædam in senectute deflexit. Et per  
 11, 7. hos quidem maxime viros salutaris ista no-  
 bis professio increvit.

Quoniam autem ex tribus medicinæ  
 partibus, ut difficillima, sic etiam clarissi-  
 ma est ea, quæ morbis medetur, ante om-  
 nia de hac dicendum est. Et, quia prima in  
 ea dissensio est, quod alii sibi experimento- 10  
 rum tantummodo notitiam necessariam esse  
 se contendunt: alii, nisi corporum rerum-  
 que naturalium ratione comperta, non satis  
 potentem usum esse proponunt: indican-  
 dum est, quæ maxime ex utraque parte di- 15  
 cantur, quo facilius nostra quoque opinio  
 interponi possit.

Igitur hi, qui rationalem medicinam  
 profitentur, hæc necessaria esse propo-  
 nunt: Abditarum & morbos continentium 20  
 causarum notitiam, deinde Evidentium,  
 post hæc etiam Naturalium actionum, no-  
 vissime Partium interiorum. Abditas cau-  
 sas vocant, in quibus requiritur, ex qui-  
 bus principiis nostra corpora sint, quid se- 25  
 cundam, quid adversam valetudinem fa-  
 5, 10. ciat. Neque enim credunt, posse eum scire,  
 32, quomodo morbos curare conveniat, qui,  
 6, 32. unde hi sint, h ignoret. Neque esse dubium,  
 7, 3, 19. quin alia curatione opus sit, si ex quatuor 30  
 principiis vel superans aliquid vel deficiens  
 adversam valetudinem creat; ut quidam  
 ex sapientiæ professoribus dixerunt: alia,  
 si in humidis omne vitium est; ut He-  
 ro-

h De Flatib. 11. 3. 4. Pallad. ad Hippocr.  
 Epid. vi. pag. 224.

rophilo visum est : alia , si in spiritu ; ut  
 Hippocrati : alia , si sanguis in eas venas ,  
 quæ spiritui accommodatæ sunt , transfun- 1620.  
 ditur , & inflammationem , quam Græci  
 5 φλεγμονήν nominant , excitat , eaque in-  
 flammatio talem motum efficit , qualis in  
 febre est ; ut Erasistrato placuit : alia , si 139,15.  
 manantia corpuscula per invisibilia forami-  
 na subsistendo iter claudunt ; ut Asclepiades  
 10 contendit. Eum vero recte curaturum , 4, 27.  
 quem prima i origo causæ non fefellerit.  
 Neque vero inficiantur , experimenta quo-  
 que esse necessaria ; sed , ne ad hæc quidem  
 aditum fieri potuisse , nisi ab aliqua ratio-  
 15 ne , contendunt. Non enim quilibet an-  
 tiquiores viros ægris inculcasse ; sed cogi-  
 tasse , quid maxime conveniret ; & id usu  
 explorasse , ad quod ante conjectura aliqua  
 ducti essent. Neque interesse , an initio ple-  
 20 raque explorata sint , si à consilio tamen  
 cœperunt. Et id quidem in multis ita se  
 habere. Sæpe vero etiam nova incidere ge- 13, 27.  
 nera k morborum , in quibus nihil adhuc  
 usus ostenderit , ut ideo necessarium sit  
 25 animadvertere , unde ea cœperint ; ceu sine  
 quo nemo mortalium reperire possit , cur  
 hoc , quam illo , potius utatur. Et ob hæc  
 quidem in obscuro positas causas perse-  
 quuntur. Evidentes vero has appellant ,  
 30 in quibus quærunt , initium morbi calor  
 attulerit , an frigus ; fames , an satietas ; &  
 quæ similia sunt. Occursurum enim ini-  
 tio dicunt eum , qui originem non igno- 4, 27.  
 rarit. Naturales vero corporis actiones 6, 32.  
 13, 4.

A 3

appel-

i Hippocr. de Art. xx. 4. k Plato de Republ. l. 3.  
 Tom. 2. pag. 405. ed. H. Steph. Lindan. Exercitat.  
 Batav. pag. 754.

appellant, per quas spiritum trahimus & emittimus; cibum potionemque assumimus & concoquimus: itemque, per quas eadem hæc in omnes membrorum partes digeruntur. Tum requirunt etiam, quare venæ nostræ modo submittant se, modo attollant: quæ ratio somni, quæ vigiliæ sit. Sine quorum notitia, neminem putant vel occurrere, vel mederi morbis, intra hæc nascentibus, posse. Ex quibus quia quam maxime pertinere ad rem concoctio videtur, huic potissimum insistant; & duce, alii, Erasistrato I, atteri cibum in ventre contendunt: alii, Plistonico Praxagoræ discipulo, putrescere: alii credunt Hippocrati, per calorem cibos concoqui. Acceduntque Asclepiadis æmuli, qui, omnia ista vana & supervacua esse, proponunt. Nihil enim concoqui, sed in crudam materiam, sicut assumpta est, in corpus omne diduci. Et hæc quidem inter eos parum constant. Illud vero convenit, alium dandum cibum laborantibus, si hoc; alium, si illud verum est. Nam si teritur intus, eum quærendum esse, qui facillime teri possit. Si putrescit, eum, in quo hoc expeditissimum est. Si calor concoquit, eum, qui maxime calorem foveat. At nihil ex his esse quærendum, si nihil concoquitur: ea vero sumenda, quæ maxime manent, qualia assumpta sunt. Eademque ratione, cum spiritus gravis est, cum somnus aut vigilia urget, cum mederi posse arbitrantur, qui prius illa ipsa, qualiter eveniant, perceperit. Præter hæc, cum in interiori-

I Macrob. Satur. vii. 15. in Cælius Aurelian. Acut. Morb. l. i. c. 14.



rioribus partibus & dolores & morborum  
 varia genera nascantur, neminem putant  
 his adhibere posse remedia, n̄ quas ipse i-<sup>4, 27.</sup>  
 gnoret. Necessarium ergo esse, incidere o<sup>13, 4.</sup>  
 5 corpora mortuorum, eorumque viscera at-  
 que intestina scrutari. Longeque optime fe-  
 cisse Herophilum p & Erasistratum, qui no-  
 centes homines, à regibus ex carcere acce-  
 ptos, vivos inciderint, considerarintque e-  
 10 tiamnum spiritu remanente, ea, quæ natura <sup>11, 12.</sup>  
 ante clausisset, eorumque q posituram, co-  
 lorem, figuram, magnitudinem, r ordinem,  
 duritiem, mollitiem, lævorem, contra-  
 ctum: processus deinde singulorum & re-  
 15 cessus, sive quid inseritur alteri, sive quid  
 partem alterius in se recipit. Neque enim,  
 cum dolor intus incidit, scire, quid doleat,  
 cum, qui qua parte quodque viscus intesti-  
 numve sit, non cognoverit. Neque curari  
 20 id, quod ægrum est, posse ab eo, qui, quid  
 sit, ignoret. Et cum per vulnus alicujus vi-  
 scera patefacta sunt, cum, qui sanæ cujus-  
 que colorem partis ignoret, nescire, quid  
 integrum, quid corruptum sit; ideo nec suc-  
 25 currere quidem posse corruptis: aptiusque  
 extrinsecus imponi remedia, compertis  
 interiorum & sedibus & figuris, cognitaque  
 eorum magnitudine: similesque omnia,  
 quæ proposita sunt, rationes habere. Ne-  
 30 que esse crudele, sicut plerique proponunt,  
 hominum nocentium, & horum quoque  
 paucorum, suppliciiis remedia populis in-  
 nocentibus seculorum omnium quæri.

Contra hi, qui se ἐμπειρικὸς ab experien-

A 4

tia

n De diæt. I. T. I. Gal. Med. M. I. 2. o Cic T. Q. II. 39.  
 p Tert. de An. c. x. & xxv. Gal. Adm. An. III. 5. q Gal  
 ad Eug. de prop. I. p. 50: T. I. r De Vet. Med. xli.  
 25. seq. A. Tral. VII. 3.

tia nominant, evidentes quidem causas, ut  
 necessarias, amplectuntur: obscurarum vero  
 causarum & naturalium actionum quæ-  
 stionem ideo supervacuum esse contem-  
 dunt, quoniam incomprehensibilis natura  
 fit. Non posse vero comprehendi, patere  
 ex eorum, qui de his disputarunt, discor-  
 dia: cum de ista re, neque inter sapientiæ  
 professores, neque inter ipsos medicos con-  
 veniat. Cur enim potius aliquis Hippocra- 10  
 ti credat, quam Herophilo? cur huic potius,  
 quam Asclepiadi? Si rationes sequi velit,  
 omnium posse videri non improbabiles: si  
 curationes, ab omnibus his ægros perdu-  
 ctos esse ad sanitatem. Itaque neque dispu- 15  
 tationi, neque auctoritati cuiusquam fi-  
 dem derogari oportuisse. Etiam sapientiæ  
 studiosos maximos medicos esse, si ra-  
 tiocinatio hos faceret: nunc illis verba  
 superesse, deesse medendi scientiam. Dif- 20  
 18, 33. ferre s quoque pro natura locorum, ge-  
 nera medicinæ; & aliud opus esse Romæ,  
 119, 15. aliud in Ægypto, aliud in Gallia. Quod si  
 morbos hæ causæ facerent, quæ ubique eæ-  
 dem essent, remedia quoque ubique eadem 25  
 esse debuissent. Sæpe etiam causas apparere,  
 ut puta lippitudinis, vulneris; neque ex his  
 patere medicinam. Quod si scientiam hanc  
 non subjiciat evidens causa, multo minùs  
 eam posse subjicere, quæ in dubio est. Cum 30  
 igitur illa incerta incomprehensibilisque  
 fit, à certis potius & exploratis petendum  
 esse præsidium; id est, his, quæ experien-  
 tia in ipsis curationibus docuerit, sicut  
 in

f Thessal. orat. 130. Galen. de Simpl. Med. Fa-  
 cult. 117. 12. Clem. Alex. Strom. l. VI. Valeriol.  
 Enarrat. lib. 11. Enar. v.



in cæteris omnibus artibus. Nam ne agricolam quidem aut gubernatorem disputatione, sed usu fieri. Ac, nihil istas cogitationes ad medicinam pertinere, eo quoque disci, quod, qui diversa de his senserint, ad eandem tamen sanitatem homines perduxerint. Id enim fecisse, quia non ab obscuris causis, neque à naturalibus actionibus, quæ apud eos diversæ erant; sed ab experimentis: prout cuique responderant, medendi vias traxerint. Ne inter initia quidem ab istis quæstionibus deductam esse medicinam, sed ab t experimentis. 15, 28. Ægrorum enim, qui sine medicis erant, alios propter aviditatem primis diebus protinus cibum assumpsisse, alios propter fastidium v abstinuisse, levatumque magis eorum morbum fuisse, qui abstinerant. Itemque alios in ipsa febre aliquid edisse, alios paulo ante eam, alios post remissionem ejus: optime deinde his cessasse, qui post finem febris id fecerant. Eademque ratione alios inter principia protinus usos esse cibo pleniore, alios exiguo; gravioresque eos factos, qui se implerant. Hæc similiaque cum quotidie inciderent, diligentes homines x notasse, quæ plerunque melius responderent: deinde ægrotantibus ea præcipere cœpisse. Sic medicinam ortam, subinde aliorum salute, y aliorum interitu, perniciofa discernentem à salutaribus. Repertis deinde medicinæ remediis, homines de rationibus eorum differere cœpisse: nec post rationem, medicinam esse

A 5                                    se

† Diod. Sicul. 1. 82. v Hippocrat. de Arte T. vi. de Vet. Med. x. 17. x Præcept. 11. 26. 27. y Columell. 1. 1. c. 1.

se inventam ; sed post inventam medicinam , rationem esse quæsitam. Requiritur etiam , ratio idem doceat , quod experientia , an aliud. Si idem , supervacuam esse : si aliud , etiam contrariam. Primo tamen remedia exploranda summa cura fuisse , nunc vero illa explorata esse : neque ulla aut nova genera morborum reperiri , aut novam desiderari medicinam. Quod si jam incidat mali genus aliquod ignotum , non ideo tamen fore medico de rebus cogitandum obscuris : sed eum protinus visurum , cui morbo id proximum sit ; tentaturumque et remedia similia illis , quæ vicino malo sæpe succurrerint ; & per ejus similitudinem opem reperturum. Neque enim se dicere , consilio medicum non egere , & irrationabile animal hanc artem posse præstare ; sed has latentium rerum conjecturas ad rem non pertinere , quia non inter sit , quid morbum faciat , sed quid tollat. Neque ad rem pertinere , quomodo , sed quid optime digeratur , sive hac de causa concoctio intercitat , sive de illa ; & sive concoctio sit illa , sive tantum digestio. Neque querendum esse , quomodo spiremus , sed , quid gravem tardumque spiritum expediat : neque , quid venas moveat ; sed , quid quæque motus genera significant. Hæc autem cognosci experimentis. Et in omnibus ejusmodi cogitationibus in utramque partem differi posse. Itaque ingenium & facundiam vincere : morbos autem , non a eloquentia ; sed remediis curari. Quæ si quis elinguis usu discre-

z Maxim. Tyrius ferm. xl. a Lucian. Hippias. pag 503. Tom. II. ed. Bened.

discreta bene norit, hunc aliquanto majorem medicum futurum, quam si sine usu linguam suam excoluerit. Atque ea quidem, de quibus est dictum, supervacua esse tantummodo. Id vero, quod restat, etiam crudele; vivorum hominum alvum atque præcordia incidi; & salutis humanæ præfidem artem, non solum pestem alicui, sed hanc etiam atrocissimam inferre: cum præsertim ex his, quæ tanta violentia quærantur, alia non possint omnino cognosci, alia possint etiam sine scelere. Nam colorem, lævorem, mollitiem, duritiem, similiaque omnia, non esse talia, inciso corpore, qualia integro fuerint. Tum quia, corporibus inviolatis, hæc tamen metu, dolore, inedia, cruditate, lassitudine, & mille aliis mediocribus affectibus sæpe mutantur. Unde multo magis verisimile, interiora, quibus major mollities & lux ipsa nova est, sub gravissimis vulneribus & ipsa trucidatione mutari. Neque quicquam esse stultius, quam quale quid vivo homine est, tale existimare esse moriente, imo jam mortuo. Nam ne uterum quidem, ut nihilominus aerem contineat, spirante homine posse diduci: simulatque vero ferrum ad præcordia accessit, & discissum transversum septum est, quod membrana quadam superiores partes ab inferioribus diducit (*διάφραγμα* Græci vocant) hominem protinus animam amittere: itaque demum mortui præcordia & viscus omne in conspectum atrocinantis medici dari: quod

A 6 neces-

b Quintil declam. VI II. pag. 116. ed. Gron. c Aristot. Hist. Anim. III. 2.

neceſſe ſit tale eſſe , quale mortui ſit , non quale vivi fuit. Itaque conſequi medicum , ut hominem crudeliter jugulet ; non ut ſciat , qualia vivi viſcera habeamus. Si quid tamen ſit , quod adhuc ſpirante homine conſpectui ſubjiciatur ; id ſæpe caſum offerre curantibus. Interdum enim gladiatorem in arena , vel militem in acie , vel viatorem à latronibus exceptum ſic vulnerari , ut ejus interior aliqua pars , & in alio alia , aperiatur ; atque ita ſedem , poſitum , ordinem , figuram , ſimiliaque cognoscere prudentem medicum , non cædem , ſed ſanitatem molientem ; idque per miſericordiam diſcere , quod alii dira crudelitate cognoverint. Ob hæc , ne mortuorum quidem lacerationem neceſſariam eſſe. Quæ , eſſi non crudelis , tamen foeda ſit , cum aliter pleraque in mortuis ſe habeant : quantum vero in vivis cognosci poteſt , ipſa curatio oſtendat.

Cum hæc per multa volumina , perque magnæ contentionis diſputationes à medicis ſæpe tractata ſint atque tractentur : ſubjiciendum eſt , quæ proxima vero videri poſſint , neque addiſta alterutri opinioni , neque ab utraque nimium abhorrentia , ſed media quodammodo inter diverſas ſententias. Quod in plurimis contentionibus deprehendere licet , ſine ambitione verum ſcrutantibus , perinde ut in hac ipſa re. Nam quæ demum cauſæ , vel ſecundam valetudinem præſtent , vel morbos excitent ; quomodo ſpiritus , aut cibus ,  
vel

vel deferatur, vel digeratur, ne sapientiæ quidem professores scientia comprehendunt, sed conjectura prosequuntur. Cujus autem rei non est certa notitia, ejus opinio 5, 33.  
 5 certum reperire remedium non potest. Verumque est, ad ipsam curandi rationem nihil plus conferre, quam experientiam. Quanquam igitur multa sint, ad ipsas artes proprie d non pertinentia, tamen eas adju-  
 10 vant, excitando artificis ingenium. Itaque ista quoque naturæ rerum contemplatio, quamvis non faciat medicum, aptiorem <sup>406.</sup> 29.  
 tamen medicinæ reddit. Profecto verisimile est, & Hippocratem & Erasistratum  
 15 & quicumque alii, non contenti febres & ulcera agitare †, rerum quoque naturam ex aliqua parte scrutati sunt, non ideo quidem medicos fuisse, verum ideo quoque majores medicos extitisse. Ratione vero opus  
 20 est ipsi medicinæ, si non semper inter obscuras causas, neque inter naturales actiones, tamen sæpe. Est enim hæc ars e con- 57, 16.  
 jecturalis, neque respondet ei plerumque non solum conjectura, sed etiam experien-  
 25 tia. Et interdum non febris, non cibus, non somnus subsequitur, sicut assuevit. Rarius, sed aliquando morbus quoque ipse 5, 22.  
 novus est: quem non incidere, manifeste falsum est; cum ætate nostra quædam, ex  
 30 naturalibus partibus carne prolapsa & arente, intra paucas horas expiraverit; sic ut nobilissimi medici neque genus mali, neque remedium invenerint. Quos ideo nihil tentasse judico, quia nemo in splendida  
 persona

d Augustin de Doctrin. Chr. 11. 39. Hippocrat. Epist. ad Thessal. fil. De decent. Ornat. T. 1. 11. 111.  
 † i. e. tradere. e Hip. Cratev. ep. 7. Plato deleg. 2111. p. 976. T. 2. Arist. Or. Plat. 1, p. 364.



persona periclitari conjectura sua voluerit;  
 283, 5. ne occidisse, nisi servasset, videretur. Veri  
 tamen simile est, potuisse aliquid excogi-  
 tare, detracta tali verecundia, & fortasse  
 responsurum fuisse id, quod aliquis esset §  
 expertus. Ad quod medicinæ genus, ne-  
 que semper similitudo aliquid confert; &  
 si quando confert, tamen idipsum rationa-  
 bile est, inter multa similia genera, & mor-  
 borum & remediorum, cogitare, quo po- 10  
 tissimum medicamento sit utendum. Cum  
 igitur talis res incidit, medicus aliquid  
 oportet inveniat, quod non ubique for-  
 tasse; sed sæpius tamen etiam respondeat.  
 Petet autem novum quoque consilium, 15  
 non ab rebus latentibus (istæ enim dubiæ  
 & incertæ sunt) sed ab his, quæ explorari  
 possunt; id est, evidentibus causis. Inter-  
 est enim, fatigatio morbum, an sitis; an  
 frigus, an color; an vigilia, an fames fece- 20  
 rit; an cibi vini que abundantia, an intem-  
 perantia libidinis. Neque ignorare hunc  
 27, 33. oportet, quæ sit ægri natura: humidum  
 magis, an magis siccum corpus ejus sit:  
 validi nervi, an infirmi: frequens adversa 25  
 valetudo, an rara: eaque, cum est, vehe-  
 mens esse soleat, an levis; brevis, an longa:  
 quod is vitæ genus sit secutus; laboriosum,  
 an quietum; cum luxu, an cum frugalitate.  
 Ex his enim, similibusque, sæpe curandi 30  
 nova ratio ducenda est. Quamvis ne hæc  
 quidem sic præteriri debent, quasi nullam  
 controversiam recipiant. Nam & Eras-  
 stratus non ex his fieri morbos dixit; quo-  
 niam  
 niam



niam & alii, & idem alias post ista non febricitarent.

Et quidam Methodici seculi nostri, sub auctore (ut ipsi videri volunt) Themisone contendunt, nullius causæ notitiara quicquam ad curationes pertinere: satisque esse, quædam communia morborum intueri, Et quidem horum tria genera esse, unum adstrictum, alterum fluens, tertium mixtum. Nam modo parum excernere ægros, modo nimium: modo alia parte parum, alia nimium. Hæc autem genera morborum, modo acuta esse, modo longa; & modo incrementum, modo consistere, modo minui consuevissent. Cognito igitur eo quod ex his est, si corpus adstrictum est, digerendum esse: si profluvio laborat, continendum: si mixtum vitium habet, occurrendum subinde vehementiori malo. Et aliter acutis morbis medendum, aliter vetustis: aliter incrementibus, aliter subsistentibus, aliter jam ad sanitatem inclinantibus. Horum observationem medicinam esse, quam ita 9, 13. finiunt, ut quasi viam quandam, quam 25 *μέθοδος* Græci nominant, eorumque, quæ in morbis communia sunt, contemplatricem esse contendant. Ac neque rationalibus se, neque experimenta tantum spectantibus annumerari volunt: cum ab illis eo nomine 30 dissentiant, quod in conjectura rerum latentium nolunt esse medicinam: ab his eo, quod parum artis esse in observatione experimentorum credunt. Quod ad Erasistratum pertinet, primum, ipsa evidentia ejus  
opini-

opinionem repugnat; quia raro, nisi post horum aliquid, morbus venit. Deinde non sequitur, ut quod alium non afficit, aut eundem alias, id ne alteri quidem, aut eodem tempore alio noceat. Possunt enim quædam subesse corpori; vel ex infirmitate ejus, vel ex aliquo affectu, quæ vel in alio non sunt, vel in hoc alias non fuerunt, eaque per se non tanta, ut concitent morbum; tamen obnoxium magis aliis injuriis corpus efficiant. Quod si contemplationem rerum naturæ f (quam non temere Medici sibi vendicant) satis comprehendisset, etiam illud scisset, nihil omnino ob unam causam fieri, sed id pro causa apprehendi, quod contulisse plurimum videtur. Potest autem id, dum solum est, non movere, quod junctum aliis maxime moveret. Accedit ad hæc, quod ne ipse quidem Erasistratus, qui transfuso in arterias sanguine febrem fieri dicit, idque nimis repleto corpore incidere, reperit, cur ex duobus æque repletis, alter in morbum inciderit, alter omni periculo vacarit; quod quotidie fieri apparet. Ex quo disci potest, ut vera sit illa transfusio, tamen illam non per se, cum plenum corpus est, fieri; sed cum horum aliquid accesserit.

Themisonis vero æmuli, si perpetua, quæ † promittunt, habent, magis etiam, quam illi rationales sunt. Neque enim, si quis non omnia tenet, quæ rationalis alius probat, protinus alio novo nomine artis indiget: si modo, quod primum est, non me-

f De Vet. Med. xxxvi. 18. † Horat. ad medicorum esse promittunt medic.

memoriæ soli , sed rationi quoque insistit.  
 Sin , quod vero propius est ; vix ulla † perpe- 119,  
 tua præcepta medicinalis ars recipit , iidem 25.  
 sunt , quod ii , quos experimenta sola susti-  
 5 nent : eo magis , quoniam , si compresserit  
 aliquem morbus , aut fuderit , quilibet etiam  
 imperitissimus videt. Quid autem com-  
 pressum corpus resolvat , quid solutum te-  
 neat , si à ratione tractum est , Rationalis est  
 10 medicus : sin , ut ei , qui se rationalem ne-  
 gat , confiteri necesse est , ab experientia ,  
 Empiricus. Et ita apud eum morbi cogni-  
 tio extra artem , medicina intra usum est.  
 Neque adjectum quicquam Empiricorum  
 15 professioni , sed demum est ; quoniam illi  
 multa circumspiciunt , hi tantum facillima ,  
 & non plus , quam vulgaria. Nam & hi , qui  
 pecoribus ac jumentis medentur , cum pro-  
 pria cuiusque ex mutis animalibus nosse  
 20 non possint , communibus tantummodo in-  
 sistunt. Et exteræ gentes , cum subtilem  
 medicinæ rationem non noverint , com-  
 munia tantum vident. Et qui ample va-  
 letudinarios nutriunt , quia singulis sum-  
 25 ma cura consulere non sustinent , ad com-  
 munia ista confugiunt. Neque , hercules ,  
 istud antiqui medici nescierunt , sed his  
 contenti non fuerunt. Ergo etiam vetustis-  
 simus auctor Hippocrates , dixit g mederi 19, 20.  
 30 oportere , & communia , & propria intuen- 18, 10.  
 tem. Ac ne isti quidem ipsi intra suam 96, 15.  
 professionem consistere ullo modo possunt.  
 Siquidem & compressorum & fluentium  
 morborum genera diversa sunt ; facilius-  
 B que

† De Loc. in Homin. T. L. 2. g Epidem. 1.  
 5. & III. 2.

que id in his, quæ fluunt, inspicere potest. Aliud est enim sanguinem, aliud bilem, aliud cibum vomere: aliud dejectionibus, aliud torminibus laborare: aliud sudore digeri, aliud tabe consumi. Atque in partes quoque humor erumpit, ut oculos, auresque, quo periculo nullum humanum membrum vacat. Nihil autem horum sic, ut aliud curatur. Ita protinus in his à communi fluentis morbi contemplatione ad propriam medicina descendit. Atque in hac quoque rursus alia proprietatis notitia sæpe necessaria est; quia non eadem omnibus, etiam in similibus casibus, opitulatur. Siquidem certæ quædam res sunt, quæ in pluribus ventrem aut astringunt, aut resolvunt. Inveniuntur tamen, in quibus aliter, atque in cæteris, idem eveniat. In his ergo communium inspectio contraria est, priorum tantum salutaris. Et causæ quoque æstimatio sæpe morbum solvit. Ergo etiam ingeniosissimus seculi nostri medicus, quem nuper vidimus, Cassius, febricitanti cuidam & magna siti affecto, cum post ebrietatem eum premi coepisse cognosceret, aquam frigidam ingessit. Qua ille epota, cum vini vim miscendo fregisset, protinus febrem somno & sudore discussit. Quod auxilium medicus opportune providit, non ex eo, quod aut strictum corpus erat, aut fluebat; sed ex causa, quæ ante præcesserat. Estque etiam proprium aliud hæc & loci & temporis, istis quoque authoribus. Qui, cum disputant, quem-

112,  
17.  
405,  
17.

2, 21.  
119,  
32.

quemadmodum sanis hominibus agendum sit, præcipiunt, ut gravibus aut locis aut temporibus magis vitetur frigus, æstus, fatieras, labor, libido; magisque ut conquiescat iisdem aut locis aut temporibus, si quis gravitatem corporis sentit; ac neque vomitu stomachum, neque purgatione alvum sollicitet. Quæ vera quidem sunt; à communibus tamen ad quædam propria descendunt. Nisi persuadere nobis voluit, sanis quidem considerandum esse, quod cælum, quod tempus anni sit: ægris vero non esse. Quibus tanto magis omnis observatio necessaria est, quanto magis obnoxia 15 offensis infirmitas est. Quinetiam morborum in iisdem hominibus aliæ atque aliæ proprietates sunt: & qui secundis aliquando frustra curatus est, contrariis sæpe restituitur. Plurimæque in dando cibo discrimina 16. 20 reperiuntur: ex quibus contentus uno ero. Nam famem facilius fert *k* adolescens, quam puer: facilius in denso cælo, quam in tenui: facilius hieme, quam æstate: facilius uno cibo, quam prandio quoque assuetus: facilius 25 inexercitatus, quam exercitatus homo. Sæpe autem in eo magis necessaria cibi festinatio est, qui minus inediam tolerat. Ob quæ conjicio, eum, qui propria non novit, communia tantum intueri debere: eumque, qui 30 nosse propria potest, illa quidem non oportere negligere, sed his quoque insistere. Ideoque, cum par scientia sit, utiliorem tamen medicum esse *l*amicum, quam extraneum. Igitur, ut ad propositum meum redeam

B 2

*i* Aphor. II. 22. *k* Aphor. I. 13. *l* Plaut. Pers. IV. 4. 46. Hippocrat. Dionys. 29. 30. 31.



deam, rationalem quidem puto medicinam esse debere: instrui vero ab evidentibus causis; obscuris omnibus, non à cogitatione artificis, sed ab ipsa arte rejectis. Incidere autem vivorum corpora, & crudele, & supervacuum est: mortuorum vero, in di-  
 12, 11. scentibus necessarium. Nam positum & ordinem nosse debent. Quæ cadavera melius, quam vivus & vulneratus homo, repræsentant. Sed & cætera, quæ in vivis  
 cognosci modo possunt, in ipsis curationibus vulneratorum paulo tardius, sed aliquanto mitius usus ipse monstrabit. His  
 propositis, primum dicam, quemadmodum Sanos agere conveniat: tum ad ea transibo, quæ ad Morbos & curationes eorum pertinebunt.

## C A P U T I.

*Quemadmodum sanos agere conveniat.*

SANUS homo, qui & bene valet, & suæ spontis est, nullis obligare se legibus debet; ac neque medico, neque iatroalipia egere. Hunc oportet a varium habere vitæ genus: modo ruri esse, modo in urbe, sæpiusque in agro: navigare, venari, quiescere interdum, sed frequenter se exercere.  
 28, 12. Siquidem ignavia b corpus hebetat, labor firmat, illa maturam senectutem, hic longam adolescentiam reddit. Prodest etiam interdum balneo, interdum aquis frigidis uti: modo ungi, modo idipsum negligere: nullum cibi genus fugere, quo populus uratur: interdum in convictu esse, interdum

m Cicero A. Qu. 11. 39. a Cæl. Aurel. de Morb. Acut. 1. 14. b De Diatal. 1. T. 1. 18. l. 11. T. xxxvii. 13. & 28. 1. Off. Med. xii. 4. Dion. Chryf. Or. l. p. 5. ed. Caf. Pallad. ad Hipp. l. 6. Epid. p. 252.



dum ab eo se retrahere : modo plus justo,  
 modo non amplius assumere : \* bis die potius, <sup>33, 29.</sup>  
 quam semel cibum c capere : & † semper  
 quam plurimum , dummodo hunc concoquat.  
 5 Sed ut hujus generis exercitationes cibi-  
 que necessarii sunt ; sic athletici superva-  
 cui. Nam & intermissus propter aliquas  
 civiles necessitates ordo exercitationis cor-  
 pus affligit : & ea corpora , quæ more  
 10 eorum repleta sunt , celerrime & senescunt,  
 & ægrotant.

*De Concubitu.*

Concubitus vero neque nimis concupi-  
 scendus , neque nimis pertimescendus est.  
 15 Rarus , corpus excitat ; frequens , d solvit.  
 Cum autem frequens , non numero sit ,  
 sed natura , ratione ætatis , & corporis , scire  
 licet , eum non inutilem esse , quem corpo-  
 ris neque languor , neque dolor sequitur.  
 20 Idem interdiu peior , tutior noctu : ita  
 tamen , si neque illum cibus , neque hunc  
 cum vigilia labor statim sequitur. Hæc  
 firmis servanda sunt : cavendumque , ne in  
 secunda valetudine adversæ præsidia consu-  
 mantur.

25

C A P. II.

*Quæ imbecillis servanda sint.*

30 **A** t imbecillis (quo in numero magna  
 pars urbanorum , omnesque pene cu-  
 pidi literarum a sunt) observatio major <sup>2, 29.</sup>  
 necessaria est : ut , quod vel corporis ,  
 vel loci , vel studii ratio detrahit , cura re-

B 3

stituat

\*;Vide Nonn. de Re Cibar. l. i. c. 4. c De Vet.  
 Med. xviii. † Casaub. in Athen. ii. 8. d De Gen.  
 i. 5. 11. Præd. viii. 15. 16. a Nazian. Orat. Funeb.  
 in Basil. Magn.

stiat. Ex his igitur, qui bene concoxit  
 mane tuto surget: qui parum, quiescere de-  
 bet; &, si mane surgendi necessitas fuerit,  
 25, 21. redormire. Qui non concoxit, ex toto con-  
 24, 8. quiescere, ac neque labori se, neque exer-  
 14. citationi, neque negotio credere. Qui cru-  
 37, 19. dum sine præcordiorum dolore ructat, is  
 ex intervallo aquam frigidam bibere, & se  
 nihilominus continere. Habitare vero ædi-  
 ficio lucido, perflatum æstivum, hibernum 10  
 solem habente: cavere meridianum b so-  
 lem, matutinum & vespertinum frigus;  
 itemque auras fluminum atque stagnorum;  
 minimeque nubilo cælo, soli aperienti se  
 committere, ne modo c frigus, modo calor 15  
 moveat: quæ res maxime gravedines de-  
 stillationesque concitat. Magis vero gra-  
 vibus locis ista servanda sunt, in quibus  
 etiam pestilentiam faciunt. Scire autem  
 40, 17. licet, integrum corpus esse, cum quotidie 20  
 mane urina alba, dein rufa est. Illud con-  
 coquere, hoc concoxisse significat. Ubi ex-  
 perrectus est aliquis, paulum intermittere;  
 36, 11. deinde, nisi hiems est, fovere os multa  
 aqua frigida debet. Longis diebus meri- 25  
 diari potius ante cibum; sin minus, post  
 eum. Per hiemem potissimum totis nocti-  
 bus conquiescere. Sin lucubrandum est,  
 37, 19. non post cibum id facere, sed post conco-  
 ctionem. Quem interdiu vel domestica, 30  
 vel civilia officia tenuerunt, huic tempus  
 aliquod servandum curationi corporis sui  
 est. Prima autem ejus curatio, exercitatio  
 est, quæ semper antecedere cibum debet:

iii

b De Diata. III. x. 6. 7. 8. c Aphor. III. I. Epi-  
 dem. VI. 4. 41. d Plin. XXVIII. 6.

in eo , qui minus laboravit , & bene con-  
coxit, remissior: in eo , qui assuetus est , &  
minus concoxit , amplior. Commode vero  
exercent, clara lectio, arma , pila , cursus, 38, 26.  
5 ambulatio , atque hæc non utique plana ,  
commodior est : siquidem melius ascensus  
quoque & descensus , cum quadam varie-  
tate corpus moveat ; nisi tamen id perquam  
imbecillum est. Melior autem est sub divo,  
10 quam in porticu : melior , si caput patitur ,  
in sole , quam in umbra : in melior in umbra ,  
quam parietes aut viridaria efficiunt , quam  
quæ recto subest : melior recta , quam fle-  
xuosa. Exercitationis autem plerumque fi-  
15 nis esse debet e sudor , aut certe lassitudo ,  
quæ citra fatigationem sit : idque ipsum ,  
modo minus , modo magis faciendum est.  
Ac ne his quidem , athletarum exemplo ,  
vel certa esse lex , vel immodicus esse la-  
20 bor debet. Exercitationem recte sequitur,  
modo unctio , vel in sole , vel ad ignem ; mo-  
do balneum , sed in conclavi quam maxime  
& alto & lucido & spaciolo. Ex his vero  
neutrum semper fieri oportet ; sed sæpius  
25 alterutrum , pro corporis natura. Post hæc  
paulum conquiescere opus est. Ubi ad ci-  
bum ventum est , nunquam utilis est nimia 24, 33.  
fatieras : sæpe inutilis nimia abstinentia :  
sæpe , si qua intemperantia subest , tutior est  
30 in potione , quam in esca. Cibus à salsamen-  
tis, oleribus , similibusque rebus melius in-  
cipit. Tum caro assumenda est , quæ assa  
optima , aut elixa est. \* Condita omnia dua-  
bus de causis inutilia sunt , quoniam & plus

B 4

pro-

e Epid vi. 3. 13. f Aph. 11. 51. Vet. Med. xv. 10. 15.  
Tert. carm. ad Sen. Leon. Imp. nov. Const. 1. Arist.  
de Mor. 11. 2. \* Salmaf. ad Simplicium p. 21. 22.

propter dulcedinem assumitur, & quod modo par est, tamen ægrius concoquitur. Secunda mensa bono stomacho nihil nocet, in imbecillo coacescit. Si quis itaque hoc parum valet, palmulas, pomaque, & similia melius primo cibo assumit. Post multas potiones, quæ aliquantum sitim excesserunt, nihil edendum est: post satietatem, nihil agendum. Ubi expletus est aliquis, facilius concoquit, si, quicquid assumpsit, potione aquæ frigidæ includit, tum paulisper invigilat, deinde bene dormit. Si quis interdium se implevit, post cibum neque frigori, neque æstui, neque labori se debet committere. Neque enim tam facile hæc inani corpore, quam repleto nocent. Si quibus de causis futura ginedia est, labor omnis vitandus est.

## C A P. III.

29

*Observationes quædam, prout res novæ incidunt, & corporum genera, & sexus, & ætates, & tempora anni sunt.*

**A**T Q U E hæc quidem pene perpetua sunt: quasdam tamen observationes desiderant & novæ res, & corporum genera, & sexus, & ætates, & tempora anni. Nam neque ex salubri loco in gravem, neque ex gravi in salubrem transitus satis tutus est. Ex salubri in gravem, prima hieme: ex gravi in eum, qui salubris est, prima æstate transire melius est. Neque vero ex multa fame nimia a satietas: neque ex nimia satietate fames idonea est.

Peri-

Periclitaturque & , qui semel , & , qui bis die cibum incontinenter , contra consuetudinem , assumit. Item , neque ex nimio labore subitum ocium , neque ex nimio ocio subitus labor , sine gravi noxa est. Ergo , cum quis mutare aliquid volet , paulatim debet b assuescere. Omnem etiam c laborem facilius vel puer vel senex , quam insuetus homo sustinet. Atque ideo quoque nimis  
 10 ociosa vita utilis non est ; quia potest incidere laboris necessitas. Si quando tamen insuetus aliquis laboravit , aut multo plus , quam solet , etiam is qui assuevit , huic jejuno dormiendum est : multo magis , si etiam  
 15 os amarum est , vel oculi caligant , aut venter perturbatur. Tum enim non dormiendum tantummodo jejuno est , sed etiam in posterum diem ita permanendum , nisi cito id quies sustulit. Quod si factum est , sur-  
 20 gere oportet , & lente paululum ambulare. At si somni necessitas non fuit , quia modi-<sup>22, 3.</sup> ce magis aliquis laboravit , tamen ingredi aliquantum eodem modo debet.

Communia deinde omnibus sunt post  
 25 fatigationem cibum sumpturis , ubi paulum ambulaverunt , si balneum non est , calido loco , vel in sole , vel ad ignem ungi , atque sudare : si est , ante omnia in tepidario residere : deinde , ubi paulum conquie-  
 30 runt , intrare & descendere in † solium ; tum multo oleo ungi , leniterque perfricari ; iterum in solium descendere : post hæc , os aqua calida fovere , deinde frigida. Balneum his fervens idoneum non est. Ergo si

C § nimium

b Aphor. II. 50. II. De Diet. XLIV. 2. 3. c Aph. II, 49. † Alveum A. ad Heren. lib. IV. 10.



nimium alicui fatigato pene febris est, huic  
 abunde est, loco tepido demittere se ingui-  
 nibus tenus in aquam calidam, cui paulum  
 olei adjectum sit: deinde totum quidem  
 corpus, maxime tamen eas partes quæ in 5  
 aqua fuerunt, leniter perfricare ex oleo,  
 cui vinum & paulum contriti salis sit adje-  
 ctum. Post hæc, omnibus fatigatis aptum  
 est, cibum sumere, eoque humido uti;  
 aqua, vel certe diluta potione esse conten- 10  
 tior; maximeque ea, quæ moveat urinam.  
 Illud quoque nosse oportet, quod ex labore  
 sudanti frigida potio perniciosissima est:  
 209, 19. atque etiam, cum sudor remisit, itinere  
 fatigatis inutilis. A balneo quoque venien- 15  
 tibus Asclepiades inutilem eam judicavit.  
 Quod in his verum est, quibus alvus facile,  
 nec tuto, resolvitur, quique facile inhorres-  
 cunt: perpetuum in omnibus non est,  
 cum potius naturale sit, potione æstuan- 20  
 tem stomachum refrigerari, frigentem  
 caleferi. Quod ita præcipio, ut tamen fa-  
 rear, ne ex hac quidem causa sudanti adhuc  
 frigidam bibendam esse. Solet etiam pro-  
 desse, post varium cibum, frequentesque 25  
 dilutas potiones, vomitus, & postero die  
 longa quies, deinde modica exercitatio. Si  
 assidua oscitatio urget, inyicem modo aqua,  
 modo vinum bibendum est, raroque balneo  
 utendum. Levatque lassitudinem etiam la- 30  
 boris mutatio: eumque, quem novum ge-  
 nus cujusdam laboris preffit, id, quod in  
 consuetudine est, reficit. Fatigato quoti-  
 dianum cubile d tutissimum est: insolitum  
 con-



contra, lassat. Quod enim contra e consuetudinem est, nocet, seu molle, seu durum est.

Proprie quædam ad eum pertinent, qui  
 5 ambulando fatigatur. Hunc reficit in ipso  
 quoque itinere frequens frictio: post iter,  
 primum sedile, deinde unctio; tum calida  
 aqua aut balneo magis inferiores partes, quam  
 superiores foveat. Si quis vero exustus in  
 10 sole est, huic in balneum protinus eundum  
 est, perfundendumque oleo corpus & caput:  
 deinde in solium bene calidum descenden-  
 dum est, tum multa aqua per caput in-  
 fundenda prius calida, deinde frigida est.  
 15 At ei, qui perfrixit, opus est in laconico  
 primum involuto sedere, donec insudet;  
 tum ungi; deinde lavari: cibum modicum,  
 portiones meracas assumere.

Is vero, qui navigavit, & nausea pressus  
 20 est, si multam bilem evomuit, vel abstinere  
 cibo debet, vel paulum aliquid assumere.  
 Si pituitam acidam effudit, utique sume-  
 re cibum, sed assueto leviolem: si sine vo-  
 mitu nauseavit, vel abstinere, vel post ci-  
 25 bum vomere. Qui vero toto die, vel in ve-  
 hiculo, vel in spectaculis sedit, huic nihil  
 currendum, sed lente ambulandum est.  
 Lenta quoque in balneo mora, dein cœna  
 exigua prodesse consueverunt. Si quis in  
 30 balneo æstuat, reficit hunc ore exceptum,  
 & in eo retentum acetum: si id non est, eo-  
 dem modo frigida aqua assumpta. Ante  
 omnia autem scire convenit f naturam cor-  
 poris: quia alii graciles, alii obesi sunt; alii  
 calidi

calidi; alii frigidiores; alii humidi, alii fic-  
 ciores; alios adstricta, alios resoluta alvus  
 exercet. Raro quisquam non aliquam par-  
 tem corporis imbecillam habet. Tenuis  
 vero homo implere se debet, plenus extenu- 5  
 are, calidus refrigerare, frigidus calefa-  
 cere, madens siccare, ficcus madefacere.  
 itemque alvum firmare is, cui fusa: solvere  
 is, cui adstricta est. Succurrendumque sem-  
 per parti maxime laboranti est. 10

*De causis qua implent corpus.*

20, 28. Implet autem corpus modica h exercita-  
 tio, frequentior quies, unctio, & si post  
 prandium est, balneum, contracta alvus,  
 modicum frigus hieme, somnus plenus & 15  
 non multum nimis longus, molle cubile,  
 animi securitas, assumpta per cibos & po-  
 tionem maxime dulcia & pingua, frequen-  
 tior cibus, & quantum plenissime potest  
 digerere. 20

*De his, qua extenuant corpus.*

40, 6. Extenuat corpus aqua calida, si quis in  
 eam descendit, magisque si salsa est: in je-  
 juno balneum, inurens sol, & omnis ca-  
 lor, cura, vigilia, somnus nimium vel 25  
 brevis vel longus: lectus, per æstatem, terra;  
 hieme, durum cubile: cursus, multa am-  
 bulatio, omnisque vehemens exercitatio,  
 vomitus, dejectio, acidæ res & austeræ, &  
 semel in die assumptæ epulæ, & vini non 30  
 perfrigidi potio jejuno in consuetudinem  
 adducta.

Cum vero inter extenuantia posuerim  
 vomitum & dejectionem, de his quoque  
 pro-

propria, quædam dicenda sunt. Rejectum esse ab Asclepiade vomitum h in eo volumine, quod de tuenda sanitate composuit, video: neque reprehendo, si offensus eorum est consuetudine, qui quotidie ejiciendo vorandi facultatem moliuntur, Paulo etiam longius processit. Idem purgationes i quo- 85, 70  
que eodem volumine expulit. Et sunt hæc 118,  
perniciosæ, si nimis valentibus medica- 10.  
mentis fiunt. Sed hæc tamen submoven-  
10 da esse, non est perpetuum: quia cor-  
porum temporumque ratio potest ea fa-  
cere necessaria, dum & modo, & non nisi  
cum opus est, adhibeantur. Ergo ille quo- 31, 14-  
15 que ipse, si quid jam corruptum esset, ex-  
pelli debere confessus est. Ita non ex toto  
res condemnanda est. Sed esse ejus etiam  
plures causæ possunt: estque in ea quædam  
paulo subtilior observatio adhibenda.

20

*De Vomitu.*

87.

Vomitus utilior est k hieme, quam æ-  
stare nam tum & pituitæ plus, & capitis  
gravitas major subest. † Inutilis est gracili-  
bus, & imbecillum stomachum habentibus,  
25 utilis vero plenis & biliosis omnibus, si vel  
nimium se replerunt, vel parum conco-  
xerunt. Nam, si plus est, quam quod con-  
coqui possit, periclitari, ne corrumpatur,  
non oportet: si jam corruptum est, nihil  
30 commodius est, quam id, qua via i primum  
expelli potest, ejicere. \* Itaque, ubi amari  
ructus cum dolore & gravitate præcor-  
diorum sunt, ad hunc protinus confugien-  
dum est. Idem prodest ei, cui pectus m æstuat  
&

h Plin. L. xxvi. 3. i Scribon. Larg. Epist. ad Cal-  
list. k De Salubr. diæt. vi. 2. 3. 4. † Aph. iv. 6. l De  
loc. in Hom. L. v. 11. 12. m Soran. Ephes. Isagog.  
c. 7. \* Aph. iv. 17.

& frequens saliva, vel nausea est; aut sonant aures, aut madent oculi, aut nos amarum est. Similiterque ei, qui vel cœlum, vel locum mutat; hisque, quibus, si per plures dies non vomuerunt, dolor præcordia infestat. Neque ignoro, inter hæc præcipi quietem, quæ non semper contingere potest agendi necessitatem habentibus: nec in omnibus idem facit. Itaque istud luxuriæ causa fieri non oportere confiteor: interdum valetudinis causa recte fieri, experimentis credo. Commoneo tamen, ne quis, qui valere & senescere volet, hoc quotidianum habeat. Qui vomere post cibum volet, si ex facili facit, aquam tantum tepidam ante debet assumere; si difficilius, aquæ vel salis, vel mellis paulum ad-jicere. At, qui mane vomiturus est, ante-bibere mulsum, vel hyssopum esse, aut o radiculam debet; deinde aquam tepidam, ut supra scriptum est, bibere. Cætera, quæ antiqui medici præceperunt, stomachum omnia infestant. Post vomitum, si stomachus infirmus est, paulum cibi, sed hujus idonei, gustandum; & aquæ frigidæ cyathi tres bibendi sunt, siquidem vomitus fauces exasperavit. Qui vomuit, si mane id fecit, ambulare debet, tum ungi, deinde cœnare: si post cœnam, postero die lavari, & in balneo sudare. Huic proximus cibus mediocris utilior est: isque esse debet cum pane hesterno, vino austero meraco, & carne assa, cibusque omnibus quam siccissimis. Qui vomere bis in mense vult, melius

n Aphor. IV. 17. Coac. Prænot. 200. o Soran. Ephes. I Hag. c. V11.

lius consulet, si biduo p continuarit, quam si post quintum decimum diem vomuerit; nisi hæc mora gravitatem pectori faciet.

*De Dejectionibus.*

5 Dejectio autem à medicamento quoque petenda est, ubi venter suppressus parum reddit, ex eoque inflationes, caligines, capitis dolores, aliaque superioris partis mala increpant. Quid enim inter hæc adjuvare  
 10 possunt quies & inedia, per quæ illa maxime eveniunt? Qui dejicere volet, primum cibis vinisque utatur his, quæ hoc præstant. Dehinc, si parum illa proficiunt, aloem sumat. Sed purgationes quoque, ut inter-  
 15 dum necessariæ sunt, sic, ubi frequentes sunt, periculum afferunt. Assuescit enim non ali corpus; & ob hoc infirmum erit: cum omnibus morbis obnoxia maxime infirmitas sit.

20 *De his, quæ calefaciunt & refrigerant corpus.*

p. 105.

Calefaciunt unctio, aqua q salsa, magisque si calida est; omnia salsa, vinum austerrum. Contra refrigerant, in jejuno, amara,  
 25 carnosa; si post cibum est, balneum, & somnus, nisi nimis longus est, & omnia acida; aqua quam frigidissima; oleum, si aqua miscetur; & lotus.

*De his, quæ humidant, & siccant.*

30 Humidant autem corpus labor minor, quam ex consuetudine, frequens balneum; cibus plenior, multa potio; post hanc, ambulatio, & † vigilia. Per se quoque ambulatio multa & vehemens, & matutinæ exerci-  
 tationi

p De Salubri Diæt. T. vii. 13. q II. De diæt. xxxv 4. r De diætata xxxv. 7. † Siccare, ait Galenus M. Med. c. 7.



tationi non protinus cibus adjectus; ea genera escæ, quæ veniunt ex locis frigidis, & pluviis, & riguis. Contra siccant immodica exercitatio, fames, unctio, sine aqua calor, sal immodicus, frigida aqua, & cibus exercitationi statim subjectus, & is ipse ex siccis & æstuosis locis veniens.

*De his; qua alvum adstringunt & solvunt.*

106. Alvum adstringit labor, sedile, creta 10  
107. figularis corpori illita, cibus imminutus, & is ipse semel die assumptus ab eo, qui bis solet: exigua potio, neque adhibita, nisi cum cibi quis quantum assumpturus est, cepit: post cibum quies. Contra 15  
tra solvit aucta ambulatio atque escæ, motus qui post cibum est, subinde potiones cibo immixtæ. Illud quoque scire oportet, 20  
59, 28. quod ventrem vomitus solutum comprimit, compressum solvit. Itemque comprimit is vomitus, qui statim post cibum est: solvit is, qui tarde supervenit.

*De ætatum varietate.*

- 19, 21. Quod ad ætates vero pertinet, inediã facillime sustinent s mediæ ætates, minus 25  
juvenes, minime pueri & senectute confecti. Quo minus fert facile quisque, eo sapius debet cibum assumere; maximeque eo eget, t qui increfcit. Calida lavatio, & pueris & senibus apta est. Vinum dilutius pueris, senibus meracius, neutri ætati, quæ in- 30  
flationes movent. Juvenum minus, quæ assumant, & quomodo curentur, interest. Quibus juvenibus fluxit alvus v, plerumque  
in

f Aphor. I, 13, 14. t Aphor. I, 14. Cassii Medic. Probl. 46. v Aphor. II, 20. 53.



in senectute contrahitur. Quibus in adolescentia fuit adstricta, sæpe in senectute solvitur. w Melior est autem in juvene fusior, in sene adstrictior.

5 De varietate temporum.

Tempus quoque anni considerare oportet. Hieme plus esse x convenit; minus, sed 19,23. meracius bibere; multo pane uti, carne potius elixa, modice oleribus; semel die cibum capere, nisi si nimis venter adstrictus 10 est. Si prandet aliquis, utilius est exiguum aliquid, & ipsum siccum sine carne, sine potione sumere. Eo tempore anni calidis omnibus potius utendum est, vel calorem 15 moventibus. Venus tum non æque perniciosa est. At vere y paulum cibo demendum, adjiciendumque potioni, sed dilutius tamen bibendum est: magis carne utendum, magis oleribus, transeundum paulatim ab elixis ad assa. Venus eo tempore 20 anni tutissima est.

De diata ciborum potionumque.

Æstate vero & z potione & cibo sæpius corpus eget; ideo prandere quoque com- 25 modum est. Eo tempore aptissima sunt & caro & olus: potio quam dilutissima, ut & sitim tollat, nec corpus incendat: frigida lavatio, caro assa, frigidi cibi, vel qui refrigerent. Ut sæpius autem cibo utendum, 21, 2. 30 sic exiguo est.

Autummalis diata.

Per autumnum vero, propter a cœli varietatem, periculum maximum est. Ita- 42,21. que neque sine veste, neque sine calcea-

C mentis

w Aph. 11. 53. x De Sal. diæt. 7. 2. De diæt. 111. 111. N. 11. 12. 13. Aph. 1. 15. Orib. Sard. de Vi&t. rat. Ægin. 1. 53. y De Sal. diæt. 1. 8. z De Diæt. sal. 1. 17. a Aph. 111. 4.

mentis prodire oportet, præcipueque diebus frigidioribus, neque sub divo noctu dormire, aut certe bene operiri. Cibo vero jam paulo b pleniore uti licet; minus, sed, meracius bibere. Poma c nocere quidam s putant, quæ immodice toto die plerumque sic assumuntur, ut ne quid ex densiore cibo remittatur. Ita non hæc, sed d consummatio omnium nocet. Ex quibus in nullo tamen minus, quam in his noxa est. Sed his uti non 10 sæpius, quam alio cibo convenit. Denique aliquid densiori cibo, cum hic accedit, necessarium est demi. Neque e æstate vero, neque autumnò utilis venus est. Tolerabilior tamen per autumnum: æstate in to- 15 tum, si fieri potest, abstinendum est.

## C A P. I V.

*De his, quibus Caput infirmum est.*

**P**R O X I M U M est, ut de his dicam qui 20 partes aliquas corporis imbecillas habent. Cui caput infirmum est, is si bene concoxit, leniter perfricare id mane manibus suis debet; nunquam id, si fieri potest, veste velare, aut ad cutem tondere: 25 utileque lunam a vitare, maximeque ante ipsum lunæ solisque concursum: sed nusquam post cibum progredi. Si cui capilli sunt, eos quotidie pectere: multum ambulare; sed, si licet, neque sub tecto, neque 30 in sole: utique autem vitare solis ardorem, maximeque post cibum & vinum: potius ungi, quam lavari; nunquam ad flammam ungi, interdum ad prunam. Si in balneum venit,

b De Salubr. Diæt. I. 25. c Æginet. I. 53. de Affect. L. I. 3. d Aphor. II. 51. Actuar. M. M. III. 9. e Aëtius Tetrab. I. Serm. III. 6. 8. a Macrob Saturn. VII. 16.

venit, sub veste primum paulum in tepidario insudare, ibi ungi, tum transire in calidarium: ubi sudarit, in solium non descendere, sed multa calida aqua per caput se totum perfundere, tum tepida, dein frigida; diutiusque ea caput, quam cæteras partes perfundere; deinde id aliquandiu perfricare; novissime detergere & ungere. Capiti nihil æque prodest atque aqua frigida. Itaque is, cui hoc infirmum est, per æstatem id bene largo canali quotidie debet aliquandiu subjicere. Semper autem, etiamsi sine balneo unctus est, neque totum corpus refrigerari sustinet, caput tamen aqua frigida perfundere. Sed cum cæteras partes attingi nolit, demittere id, ne ad cervices aqua descendat; eamque, ne quid oculis, aliisve partibus noceat, defluentem subinde manibus ad hoc regere. Huic modicus cibus necessarius est, quem facile concoquat: isque, si jejuno caput læditur, assumendus etiam medio die est: si non læditur, semel potius. Bibere huic assidue vinum dilutum lene, quam aquam magis expedit; ut, cum caput gravius esse cœperit, sit, quo confugiat: eique ex toto neque vinum, neque aqua semper utilia sunt: medicamentum utrumque est, cum invicem assumitur. Scribere, legero, voce contendere, huic opus non est, utique post cœnam: postquam nec cogitatio quidem ei satis tuta est; maxime tamen vomitus alienus est.

## C A P. V.

*De his, qui lippitudine, gravedine, destillatione, tonsillisque laborant.*

35. 9. **N**EQVE vero his solis, quos capitis imbecillitas torquet, usus aquæ frigidæ prodest; sed iis etiam, quos assiduæ lippitudines; gravedines, destillationes, tonsillæque male habent. His autem non caput tantum quotidie perfundendum; sed 10  
 22, 24. os quoque multa frigida aqua fovendum est: præcipueque omnibus, quibus hoc utile auxilium est, eo utendum est, ubi gravius cœlum Austri reddiderunt. Cum-  
 24. 8. que omnibus inutilis sit post cibum aut contentio, aut fatigatio animi; tum his præcipue, qui vel capitis, vel arteriæ dolores habere consueverunt, vel quoslibet alios oris affectus. Vitari etiam gravedines, destillationesque possunt, si quam 20  
 minime is, qui his opportunus est, aërem vel loca aquasque mutat; si caput in sole protegit, ne incendatur, neve subitum ex repentino nubilo frigus dimoveat: si post concoctionem jejunos caput radit: si post 25  
 cibum neque legit, neque scribit.

## C A P. VI.

*Ad solutam Alvum remedia.*

**Q**UEM vero frequenter cita alvus 30  
 exercet, huic opus est pila similibusque superiores partes exercere; dum jejunos est, ambulare; vitare solis nimium ardorem, continua balnea;  
 ungi

ungi citra sudorem ; non uti cibis variis ,  
 minimeque jurulentis aut leguminibus ,  
 oleribusve his , quæ celeriter descendunt ;  
 omnia denique sumere , quæ tarde conco-  
 5 quuntur. Venatio, durique pisces , & ex  
 domesticis animalibus assa caro maxime 108, 1.  
 juvant. Nunquam vinum falsum bibere  
 expedit, ne tenue quidem ; aut dulce ; sed  
 austerum , & plenius, neque id ipsum per-  
 10 vetus. Si mulso uti voler , id ex decocto  
 melle faciendum est. Si frigidæ potiones  
 ventrem ejus non turbant , his utendum  
 potissimum est. Si quid offensæ in cœna  
 sensit, vomere debet ; idque postero quo-  
 15 que die facere: tertio, modici ponderis pa-  
 nem ex vino esse ; aut ova fricta ex oleo ,  
 vel ex defruto , similibusque aliis : deinde  
 ad consuetudinem redire. Semper autem 24, 8.  
 post cibum conquiescere , ac neque inten- 22, 28,  
 20 dere animum, neque ambulatione quamvis  
 leni dimoveri.

C A P. VII.

*Remedia ad coli dolorem.*

25 **A**T S I laxius intestinum dolere con-  
 suevit , quod κόλον nominant , cum  
 id nihil nisi genus inflationis sit , id agen-  
 dum est , ut concoquat aliquis ; ut lectione ,  
 & aliis generibus exerceatur ; utatur balneo  
 30 calido , cibis quoque & potionibus calidis ;  
 denique omnimodo frigus evitet , item dul-  
 cia omnia , leguminaque , & quicquid in-  
 flare consuevit.



## CAP. VIII.

*Quæ agenda sint Stomacho laborantibus.*

**S**I QUI S vero stomacho laborat, legere  
clare debet; post lectionem ambulare; 5  
tum pila, vel armis, aliove quo genere,  
quo superior pars movetur, exerceri. Non  
aquam, sed vinum calidum bibere jejunus.  
Cibum bis die assumere; sic tamen, ut faci-  
le concoquat. Uti vino tenui & austero; 10  
& post cibum, frigidis potionibus potius.  
Stomachum autem infirmum indicant pal-  
lor, macies, præcordiorum dolor, nau-  
sea, & nolentium vomitus, in jejuno do-  
lor capitis. Quæ in quo non sunt, is fir- 15  
mi stomachi est. Neque credendum uti-  
que nostris est, qui cum in adversa valetu-  
dine vinum aut frigidam aquam concu-  
pierunt, deliciarum patrocinium in accusa-  
tionem non merentis stomachi habent. At, 20  
qui tarde concoquant, & quorum ideo,  
præcordia inflantur, quive propter ardo-  
rem aliquem noctu † sitire consueverunt,  
ante quam conquiescant, duos tresve cya-  
thos per tenuem fistulam bibant. Prodest 25  
etiam adversus tardam concoctionem cla-  
re legere, deinde ambulare, tum vel ungi  
vel lavari; assidue vinum frigidum bibe-  
re; & post cibum, magnam portionem, sed,  
ut supra dixi, per siphonem: deinde omnes 30  
24, 11. potiones aqua frigida includere. Cui vero  
cibus acescit, is ante eum bibere aquam  
egelidam debet, & vomere. At si cui ex  
hoc frequens dejectio incidit, quotiens  
alvus

† Aphor. v. 27.



Cap. 9.            M E D I C I N A.            39  
alvus ei constiterit , frigida potione potissimum utatur.

C A P. I X.

5            *Quid observandum sit dolore Nervorum laborantibus.*

**S**I C U I vero dolere nervi solent , quod  
in podagra chiragrave esse consuevit ,  
huic , quantum fieri potest , exercendum  
10 id est , quod affectum est , objiciendum-  
que labori & frigori : nisi cum dolor in-  
crevit ; sub quo quies optima est. Venus  
semper inimica est. Concoctio , sicut in  
omnibus corporis affectibus , necessaria.  
15 Cruditas enim id maxime lædit , & quo-  
tiens offensum corpus est , vitiosa pars  
maxime sentit. Ut concoctio autem omni-  
bus vitiis occurrit , sic rursus aliis frigus ,  
aliis calor. Quæ sequi quisque pro \* habitu  
20 corporis sui debet. Frigus inimicum est  
seni , tenui , vulneri , a præcordiis , intestinis , 46, 14.  
vesicæ , auribus , coxis , scapulis , naturali-  
bus , b ossibus , dentibus , nervis , vulvæ , cere- 75, 34.  
bro. Idem summam cutem facit pallidam ,  
25 aridam , c duram , nigram. Ex hoc horrores  
tremoresque nascuntur. At prodest d juveni-  
bus , & omnibus plenis. Erectiorque mens  
est , & melius concoquitur , ubi frigus qui-  
dem est , sed cavetur. Aqua vero frigida  
30 infusa , præterquam capiti , etiam stomacho 35, 9.  
prodest. \* Item articulis doloribusque , qui  
sunt sine ulceribus. † Item rubicundis nimis  
hominibus , si dolore vacant. Calor autem  
adjuvat omnia , quæ frigus infestat : item

C 4

lip-

\* Aph. iii, 2. a Aph. v, 24. b. Aph. v, 18.  
c Aph. v, 20. d Aph. v, 21. \* Aph. v, 25. † Aph.  
v, 23.

lippientes, si nec dolor, nec lachrymæ sunt: nervos \* quoque, qui contrahuntur; præcipueque ea ulcera, quæ ex frigore sunt. Idem corporis colorem bonum facit: urinam movet. Si nimius est, corpus 5  
 28, 22. e effœminat, nervos † emollit, stomachum solvit. Minime vero aut frigus aut calor tuta sunt, ubi ‡ subita insuetis sunt. Nam frigus, lateris dolores, aliaque vitia; frigida aqua, strumas excitat. Calor conco- 10  
 ctionem prohibet, somnum aufert, sudore digerit, obnoxium morbis pestilentibus corpus efficit.

## C A P. X.

*Observatio in Pestilentia.* 15

**E**S T etiam observatio necessaria, qua quis in pestilentia utatur adhuc integer, cum tamen securus esse non possit. Tum igitur oportet peregrinari, navigare. Ubi 20  
 id non licet, gestari, ambulare sub divo, ante æstum, leniter; eodemque modo ungi: &, ut supra comprehensum est, vitare 22, 4. fatigationem, cruditatem, frigus, calorem, libidinem; multoque magis se continere. 25  
 Si qua gravitas in corpore est, tum neque mane surgendum, neque pedibus nudis ambulandum est, minimeque post cibum, aut balneum: neque jejuno, neque cœnato vomendum est: neque movenda alvus; 30  
 atque etiam, si per se mota est, comprimenda est. Abstinentum potius, si plenus corpus est. Itemque vitandum balneum, sudor, meridianus somnus, utique  
 si ci-

\* Aphor. v. 22. e Aphor. v. 16. † Aphor. v. 22.  
 ‡ Aphor. III. 1.

si cibus quoque antecessit ; qui tamen semel die tunc commodius assumitur ; insuper etiam modicus , ne cruditatem moveat. Alternis diebus invicem , modo aqua , modo vinum bibendum est. Quibus servatis , ex reliqua victus consuetudine quam minimum mutari debet. Cum vero hæc in omni pestilentia facienda sint , tum in ea maxime , quam Austri excitarint.

10 Atque etiam peregrinantibus eadem necessaria sunt , ubi gravi tempore anni discesserunt ex suis sedibus , vel ubi in graves regiones venerunt. Ac si cætera res aliqua prohibebit , utique abstinere debebit : atque ita à vino ad aquam , ab hac ad vinum ,

15 co, qui supra positus est , modo , transitus ei esse.

---

## LIBER SECUNDUS.

20

### *Præfatio.*

25



30

INSTANTIS autem valetudinis signa complura sunt. In quibus explicandis non dubitabo authoritate antiquorum virorum uti , maximeque Hippocratis ; cum recentiores quoque medici , quamvis in curationibus mutaverint , tamen hæc illum optime prælagisse fateantur. Sed antequam dico, quibus præcedentibus morborum timor subsit ; non alienum videtur exponere , quæ tempora anni , quæ tempestatum genera , quæ partes ætatis , quæ

lia corpora maxime tuta vel periculis opportuna sint, quod genus adversæ valetudinis in quoque timeri maxime possit. Non † quod non omni tempestatum genere, omnis ætatis, omnis habitus homines per omnia genera morborum & ægrotent & moriantur; sed quod frequentius tamen quædam eveniant. Ideo utile est scire unumquemque, quid, & quando maxime caveat.

C A P. I. 10

*Quæ anni tempora, quæ tempestatum genera, quæ partes ætatis, qualia corpora vel tuta vel morbis opportuna sunt, & quod valetudinis genus in quoque timeri possit.* 15

**I**GITUR saluberrimum † ver est: proxime deinde ab hoc, hiems: periculosior æstas, autumnus \* longe periculosissimus. Ex tempestatibus vero optimæ † æquales sunt, 20 sive frigidæ, sive calidæ: pessimæ, quæ maxime variant. Quo fit, ut a autumnus plurimos opprimat. Nam fere meridianis temporibus calor: nocturnis atque matutinis, simulque etiam vespertinis, frigus est. 25 Corpus ergo, & æstate, & subinde meridianis caloribus relaxatum, subito frigore excipitur. Sed ut eo tempore id maxime fit, sic quandocunque evenit, noxium est. Ubi æqualitas autem est, saluberrimi sunt b sereni 30 dies: meliores pluvii, quam tantum nebulosi, nubilive: optimique hieme, qui omni vento vacant: æstate, quibus Favonii perflant. Si genus aliud ventorum est, salubriores

† Aph. III. 19. † Aph. III. 9. \* Aph. III. 9. † Aph. III, 8. a Aphor. III. 9. b Aphor. III, 15.

briores Septentrionales, quam Subsolani, vel \* Austri sunt. Sic tamen hæc, ut interdum regionum sorte mutantur. Nam fere ventus ubique à mediterraneis regionibus veniens, salubris; à mari, gravis est. Neque solum in bono tempestatum habitu certior valetudo est; sed peiores morbi quoque, si qui inciderunt, leviores sunt, & promptius finiuntur. Pessimum ægro est cœlum, quod ægrum fecit; adeo ut in id quoque genus, quod naturâ pejus est, in hoc statu salubris † mutatio sit. Ætas media, tutissima est: quia neque juventæ calore, neque senectutis frigore infestatur. Longis morbis 15 senectus, acutis adolescentia magis patet. 47, 8. Corpus autem habilissimum quadratum est, neque gracile, neque obesum. Nam longa c statura, ut in juvena decora est, sic matura senecture conficitur. Gracile corpus 20 infirmum: obesum hebes est. Vere tamen maxime, quæcunque d humoris motu novantur, in metu esse consuerunt. Ergo tum lippitudines, pustulæ, profusio † sanguinis, abscessus corporis, quæ ἀποσήματα Γρα- 25 ci nominant, bilis atra, quam μελαγχολίαν appellant, insania, morbus comitialis, angina, gravedines, destillationes oriri solent. Hi quoque morbi qui in articulis nervisque modo urgent, modo quiescunt: tum 238, 4. 30 maxime & inchoantur & repetunt. At ætas e non quidem vacat plerisque \* his morbis; sed adjicit febres, vel ardentes, vel tertianas, vomitus, alvei dejectiones, auricularum dolores, ulcera oris, caneros, cum in cæteris

\* Galen de Theriac. l. i. c. 11. p. 945. T. 13. † Aph. 111. 3. c Dicæarch. Geogr. c. x. p. 56. Aph. 111. 54. † Soran. Ephes. Isag. c. 5. d Aph. 111, 20. e Aph. 111, 21. \* Soran. Ephes. Isag. c. 5.



cæteris quidem partibus, tum maxime ob-  
 scænis; & quicquid sudore hominem resol-  
 vit. Vix quicquam ex his in autumnum non  
 incidit: sed oriuntur eo quoque tempore fe-  
 bres incertæ, lienis dolor, aqua inter cutem, 5  
 167. tabes, quam Græci φθίσιν nominant; urinæ  
 difficultas, σπασμῶν quam appellant; te-  
 nuioris intestini morbus, quem εἰλεὸν nomi-  
 nant. Fit item lævitas intestinorum, quæ  
 λειεντερία vocatur; coxæ dolores, morbi 10  
 comitiales. Idemque tempus & diutinis  
 malis fatigatōs, & ab æstate, etiam proxi-  
 ma pressos interimit; & alios novis mor-  
 bis conficit; & quosdam longissimis impli-  
 cat, maximeque quartanis, quæ per hie- 15  
 mem quoque exercent. Neque aliud ma-  
 gis tempus pestilentiæ patet, cujuscumque  
 ea generis est; quamvis variis rationibus  
 nocet. Hiems autem g capitis dolores, tuf-  
 sim, & quicquid in faucibus, in \* lateribus, 20  
 in visceribus mali contrahitur, irritat.

Ex tempestatibus, † Aquilo tussim movet,  
 fauces exasperat, ventrem h adstringit, uri-  
 nam suppressit, horrores excitat, item dolo-  
 rem lateris & pectoris. Sanum tamen † corpus 25  
 spissat, & mobilius atque expeditius red-  
 dit. Auster i aures hebetat, sensus tardat,  
 capitis dolorem movet, alvum solvit, to-  
 tum corpus efficit hebes, humidum, lan-  
 guidum. Cæteri venti, quo huic vel illi 30  
 propiores sunt, eo magis vicinos his il-  
 lisve affectus faciunt. Calor omnis & je-  
 cur & lienem inflammat, mentem hebe-  
 rat, & ut k anima deficiat, ut sanguis pro-  
 rumpat,

f Aph. III. 22. g Aph. III. 23. † Cæl. Aurel.  
 Acut. Morb. II. \* Aph. III. 5. h Aph. III. 17. 13.  
 † Aph. III. 17. i Aph. III. 17. k Aph. V. 16.

rumpat, efficit. Frigus modo l nervorum distentionem, modo rigorem infert; illud σπασμὸς, hoc τέτανος Græce nominatur: nigrorum in ulceribus, & horrorem in febribus excitat. In siccitatibus, \* acutæ febres, lippitudines, † tormina, urinæ difficultas, articulorum dolores oriuntur. Per imbres, m longæ febres, alvi dejectiones, angina, cancri, morbi comitiales, resolutio nervorum, quam παράλυσις Græci nominant. 178.

Neque solum interest, quales dies sint, sed etiam quales ante præcesserint. Si hiems sicca Septentrionales ventos habuit, ver autem Austros & pluvias exhibet, fere 15 subeunt n lippitudines, tormina, febres, maximeque in mollioribus corporibus, præcipue in muliebribus. Si vero, Austri o pluviaque hiemem occuparunt, ver autem frigidum & siccum est, gravidæ quidem scæminæ, quibus tum adest partus, abortu periclitantur: hæ vero quæ gignunt, imbecillos, vixque vitales edunt. Cæteros lippitudo arida, & si seniores sunt, 25 gravedines atque destillationes male habent. At si à prima hieme Austri ad ultimum ver continuarint, laterum dolores, & insania febricitantium, quam Φρενίτις appellat, quam celestime rapiunt. Ubi vero 148. calor à primo vere orsus æstatem quoque 30 similem p exhibet, necesse est multum sudorem in febribus subsequi. At si sicca æstas q Aquilones habuit, autumno vero imbres Austrique sunt, tota hieme; quæ proxima est, tussis, destillatio, raucitas, in quibusdam etiam tabes

l Aph. v. 17. \* Aph. III. 7. † III. 16. m Aph. III. 16. n Aph. III. 11. o Aph. III. 12, p Aph. III. 6. q Aph. III. 13.

tabes oritur. Sin autem autumnus quoque æque siccus & iisdem Aquilonibus perflatur, omnibus quidem mollioribus corporibus, inter quæ muliebria esse proposui, secunda valetudo contingit: durioribus vero instare possunt, aridæ lippitudines, & febres partim acutæ, partim longæ, & hi morbi, qui ex atra bile nascuntur.

¶ Quod ad ætates vero pertinet, pueri proximique his vere optime valent, & ætate prima tutissimi sunt: senes ætate & autumni prima parte: juvenes hieme, quique inter juventam senectutemque sunt. Inimicior senibus hiems, æstas adolescentibus est. Tum si qua imbecillitas oritur, proximum est, ut infantes, tenerosque adhuc pueros serpentina & ulcera oris, quæ ἀφθας Græci nominant, vomitus, nocturnæ vigiliæ, aurium humor, circa umbilicum inflammationes exercent. Propria etiam v dentientium, gingivarum exulcerationes, distentiones nervorum, febriculæ, alvi dejectiones, maximeque caninis dentibus orientibus male habent. Quæ pericula plenissimi cujusque sunt, & cui maxime venter adstrictus est. At ubi ætas paulum processit, w glandulæ, & vertebrarum, quæ in spina sunt, aliquo inclinationes, strumæ, verrucarum quædam genera dolentia, ἀπροχορδόνια Græci appellant, & plura alia tubercula oriuntur. Incipiente vero jam pube, x ex iisdem multa, & longæ febres, & sanguinis ex naribus cursus. Maximeque omnis pueritia, y primum circa quadragesimum diem, deinde septimo

¶ Aph. III. 4. ¶ Aphor. III. 18. t Aphor. III. 24. v Aphor. III. 25. w Aphor. III. 26. x Aph. III. 27. y Aphor. III. 28.

septimo mense , tum septimo anno , postea  
 circa pubertatem periclitatur. Siqua etiam  
 genera morborum in infantem inciderunt ,  
 ac neque pubertate , neque primis coitibus ,  
 5 neque in foemina primis menstruis finita \* <sup>172,</sup>  
 sunt , fere longa sunt : saepius tamen his <sup>17.</sup>  
 morbi pueriles , qui diutius manserunt ,  
 terminantur. Adolescentia z morbis acutis, <sup>43, 15.</sup>  
 item comitialibus , tabique maxime obje-  
 10 cta est : fereque juvenes sunt , qui sangui-  
 nem exspuunt. Post hanc aetatem a laterum  
 & pulmonis dolores , lethargus , cholera ,  
 insania , sanguinis per quaedam etiam velut  
 ora venarum , *αιμορροϊδας* Græci appellant , <sup>62, 12.</sup>  
 15 profusio. In senectute , b spiritus & urinæ <sup>401.</sup>  
 difficultas , gravedo , articularum & renum <sup>494.</sup>  
 dolores , nervorum † resolutiones , malus  
 corporis habitus , *καχεξια* Græci appellant ,  
 nocturnæ vigiliæ , vitia longiora aurium ,  
 20 oculorum , etiam marium , præcipueque solu-  
 ta alvus , & , quæ sequuntur hanc , tormina ,  
 vel lævitas intestinorum , cæteraque fusi  
 ventris mala. Præter hæc graciles , tabes ,  
 dejectiones , destillationes , item viscerum  
 25 & laterum dolores fatigant. Obesi plerun-  
 que acutis morbis , & difficultate spirandi ,  
 strangulantur , subitoque c sæpe moriuntur ;  
 quod in corpore tenuiore vix evenit.

36 C A P. I I.

*De signis adversæ valetudinis futuræ.*

**A** N T E adversam autem valetudinem ,  
 ut supra dixi , quædam notæ oriun-  
 tur ; quarum omnium commune  
 est ,

\* Aph. III. 28. z Aphor. III. 29. a Aph. III.  
 30. b Aphor. III. 31. † Aphor. III. 31. vi. 57.  
 c Aph. II. 44.

est, aliter se corpus habere, atque consuevit; neque in pejus tantum, sed etiam in melius. Ergo si plenior aliquis, & speciosior, & coloratior factus est, a suspecta habere bona sua debet. Quæ quia neque in eodem habitu subsistere, neque ultra progredi possunt, fere retro, quasi ruina quadam, revolvuntur. Pejus tamen signum est, ubi  
 58, 19. aliquis contra consuetudinem emacuit, &  
 51, 22. colorem decoremque amisit: quoniam in 10  
 53, 24. his, quæ superant, est quod morbus demat; in his quæ desunt, non est quod ipsum morbum ferat. Præter hæc, protinustimeri debet, si graviora membra sunt; si crebra ulcera oriuntur; si corpus supra consuetudinem \* incaluit; si gravior somnus pressit; si tumultuosa somnia fuerunt; si sæpius expergiscitur aliquis, quam assuevit, deinde iterum soporatur; si corpus dormientis circa partes aliquas contra consuetudinem † insudat, maximeque si circa pectus, aut cervices, aut crura, vel genua, vel coxas. Item, si marcet animus: si loqui & moveri piget; si corpus torpet; si dolor præcordiorum est, aut totius pectoris, aut, qui in plurimis evenit, capitis; si salivæ plenum est os; si oculi cum dolore vertuntur; si tempora astricta sunt; si membra inhorrescunt; si spiritus gravior est; si circa frontem intentæ venæ moventur; si frequentes oscitationes; si genua quasi fatigata sunt, totumve ‡ corpus lassitudinem sentit. Ex quibus sæpe plura, nunquam non aliqua febrem antecedunt. In primis tamen illud  
 con-

a Aphor. I. 3. \* Aphor. IV. 39. † Aphor. IV. 38.  
 ‡ Aphor. II. 5.



considerandum est, num cui sæpius horum aliquid eveniat, neque ideo corporis ulla difficultas subsequatur. Sunt enim quædam proprietates hominum, sine quarum notitia non facile quicquam in futurum prælagiri potest. Facile itaque securus est in his aliquis, quæ sæpe sine periculo evasit. Ille sollicitari debet, cui hæc nova sunt; aut qui ista nunquam sine custodia sui tuto habuit.

C A P. III.

*Quæ bona in ægrotantibus signa sint.*

15 **U**B I vero febris aliquem occupat, scire licet, non periclitari, si in latus aut dextrum aut sinistrum, ut ipsi in usu est, cubat <sup>a</sup>, cruribus paulum reductis; qui fere sani quoque jacentis habitus est: si facile convertitur; si noctu dormit, si inter-  
 20 diu vigilat; si ex facili spirat; si non conflitatur; si circa umbilicum <sup>b</sup> & pubem cutis <sup>c</sup> plana est; si præcordia ejus sine ullo sensu doloris æqualiter mollia in utraque parte sunt: quod si paulo tumidiora sunt, tamen  
 25 digitis cedunt & non dolent. Hæc valetudo, ut spacium aliquod habeat, sic tuta erit. Corpus quoque, quod æqualiter molle & calidum est, quodque æqualiter <sup>c</sup> totum insudat, & cujus febricula <sup>†</sup> eo sudore finitur, securitatem pollicetur. Quando jam  
 30 ad sanitatem venit corpus, sternutamentum etiam inter bona indicia est, & cupiditas <sup>d</sup> cibi vel à principio servata, vel etiam post fastidium orta. Neque terrere debet

D ea

<sup>a</sup> Actuar. M. Med. 11. 3. <sup>b</sup> Aph. 11. 35. <sup>c</sup> De Judicat. 1, 3. <sup>†</sup> Aph. 14. 55. <sup>d</sup> Aphor. 11, 32.

ea febris, quæ eodem die finita est : ac ne ea quidem, quæ, quamvis longiore tempore tenuit, tamen ante alteram accessionem ex toto quievit, sic, ut corpus integrum, quod *εὐλακρινὲς* Græci vocant, fieret. Si quis autem incidit vomitus, mixtus esse ex bile & pituita debet : & in urina subsidere album, læve e, æquale ; sic ut etiam, si quæ quasi nubeculæ innatarint, in imum deferantur. Ac venter ei, qui à periculo tutus est, reddit mollia, figurata, atque eodem fere tempore, quo secunda valetudine assuevit, modoque convenientia his, quæ assumuntur. Pejor citra alvus est, sed ne hæc quidem terrere protinus debet, si matutinis temporibus coacta magis est, aut si procedente tempore paulatim contrahitur, & rufa est, neque fœditate odoris similem alvum sani hominis excedit. Ac lumbricos quoque aliquos sub fine morbi descendisse nihil nocet. Si flatio sine inflammatione in superioribus partibus † dolorem tumoremque fecit, bonum signum est sonitus ventris inde ad inferiores partes devolutus ; magisque etiam, si sine difficultate, cum stercore excessit.

## C A P. I V.

*Mala signa agrotantium.*

54, 28. **C**ONTRA gravis morbi periculum est, ubi supinus æger jacet, porrectis manibus, & cruribus : ubi residere vult in ipso acuti morbi impetu, præcipueque pulmonibus laborantibus : ubi nocturna vigilia premitur, etiamsi interdum somnus

e De Judicat. 1, 8. f De Judicat. 1, 6. g. De Judicat. 1, 7. Prænot. x, 1. Aph. 1v. 74.

nus accedit, ex quo tamen pejor est, qui inter quartam horam & noctem, quam qui à matutino tempore ad quartam. Pessimum tamen est, si somnus neque noctu, neque 5 interdiu accedit: id enim fere sine continuo a delirio esse non potest. Neque vero 64, 16. signum bonum est, somno ultra b debitum 54, 33. urgeri: pejusque, quo magis sopor interdiu, noctuque continuat. Mali etiam morbi 10 testimonium est vehementer & crebro spirare, à sexto c die cœpisse inhorrescere: 49, 20. pus expuere: vix excreare: dolorem habere 56, 3. continuum: difficulter ferre morbum: jactare brachia & crura: sine voluntate d la- 54, 31. 15 chrymare: habere humorem e glutinosum 54, 14. dentibus inhærentem; cutem circa f umbilicum & pubem macram; præcordia g inflammata, dolentia, dura, tumida, intenta; magisque, si hæc dextra parte quam sinistra 20 sunt: periculosissimum tamen est, si venæ quoque ibi vehementer agitantur. Mali etiam morbi signum est, nimis celeriter 48, 9. emacrescere: caput & pedes manusque † frigidas habere, ventre & lateribus calentibus; aut frigidas h extremas partes acuto 25 morbo urgente; aut post sudorem i inhorrescere; aut post vomitum k singultum esse, 27. vel rubere oculos: aut l post cupiditatem cibi, postve longas febres hunc fastidire; 53, 17. 30 aut multum sudare, maximeque frigido 56, 11. sudore; aut habere sudores non per totum 301, corpus æquales, quique febrem non finiant. 24. Malæ etiam febres, quæ quotidie tempore eodem revertantur; quæve semper pares

D 2 acced-

a Aph. VII, 18. b Aph. II, 3. c Aph. IV, 29. d Aph. IV, 52. VII, 2. e Aph. IV, 53. f Aph. II, 35. g Aph. II, 28. † Aph. VII, 12. h. Aph. VII, 1. 26. i Aph. VII, 4. k Aph. VII, 3. l Aph. VII, 6.

accessiones habeant, neque<sup>m</sup> tertio quoque die  
 leventur; quæve sic continent, ut per ac-  
 cessiones increcant, per decessiones tan-  
 tum molliantur, nec unquam integrum  
 corpus dimittant. Pessimum est, si ne leva- 5  
 tur quidem febris, sed æque concitata con-  
 tinuat. Periculosum est etiam, post arqua-  
 tum n morbum febrem oriri; utique si præ-  
 cordia dextra parte dura manserunt, aut  
 dolentibus iis læva. Nulla acuta febris le- 10  
 viter terrere nos debet. Neque unquam  
 in acuta o febre, aut a somno non est terribi-  
 lis nervorum distentio. Timere etiam ex  
 somno p, mali morbi est. Itemque in prima  
 febre protinus mentem esse turbatam, 15  
 membrumve aliquod esse resolutum. Ex  
 quo casu quamvis vita redditur, tamen id  
 fere membrum debilitatur. Vomitus etiam  
 56, 13. periculosus est sinceræ pituitæ vel bilis;  
 296, peiorque, si viridis, aut q niger est. At mala 20  
 10. urina est, in qua subsidunt subrubra aut  
 56, 17. livida: deterior, in qua quasi fila quædam  
 tenuia atque alba: pessima ex his, si tan-  
 quam ex furfuribus factas nubeculas re-  
 præsentat. Diluta quoque, atque alba, vi- 25  
 tiosa est, r sed in phreniticis maxime. Alvus  
 autem mala est, ex toto suppressa. Pericu-  
 losa etiam, quæ inter febres fluens con-  
 quiescere hominem in cubili non patitur;  
 utique, si quod descendit, est perliquidum, 30  
 aut albidum, aut pallidum, aut spumans.  
 Præter hæc periculum ostendit id, quod  
 excernitur, si est exiguum, glutinosum,  
 56, 32. læve, album, idemque subpallidum: vel si  
 est

m Aph. IV, 43. n Aph. IV, 62. o Aph. IV, 66.  
 p Aph. IV, 67. q Aph. IV, 22. r Aph. IV, 72.

est aut lividum , aut biliosum , aut cruentum , aut peioris odoris , quam ex consuetudine. Malum est etiam , quod post febres longas sincerum est. 55, 33.

5 C A P. V.

*De signis longæ valetudinis.*

P O S T hæc indicia , notum est longum morbum fieri: sic enim necesse est , nisi occidit. Neque ulla alia spes in magna est , quam ut impetum morbi trahendo aliquis effugiat , porrigaturque in id tempus , quod curationi locum præster. Protinus tamen signa quædam sunt , ex quibus colligere possumus , morbum , etsi non interemerit , longius tamen tempus habiturum. Ubi frigidus a sudor inter febres non acutas circa caput tantum , & cervices oritur ; aut ubi , febre non quiescente , corpus \* insudat ; aut ubi corpus modo b frigidum , modo calidum est , & color alius ex alio fit ; aut ubi , quod inter febres † aliqua parte abscessit , ad sanitatem non pervenit ; aut ubi æger pro spacio parum emacrescit. 48, 9. 25 Item , si urina modo liquida & c pura est , modo habet quædam subsidentia ; si lævia atque alba rubrave sunt , quæ in ea subsident ; aut si quædam quasi miculas repræsentat ; aut si bullulas excitat. 60, 31.

30 C A P. VI.

*De indiciis mortis.*

S E D inter hæc quidem , proposiro metu , spes tamen superest. Ad ultima vero

D 3 jam

† Aph. VII. 6. a Aph. IV. 37. Coac. Præn. IV. 8, 39, 40. De Jud. VI. 9. VIII. 2, 3, 4, 5. \* Aph. IV. 56. b Aph. VI. 60. † Aph. IV. 51. c De Jud. VI. 1, 2. Aph. VII. 31.



jam ventum esse testantur, a nares acutæ,  
 collapsa tempora, b oculi concavi, frigidæ  
 languidæque aures & imis partibus leni-  
 ter versæ, cutis circa frontem dura & in-  
 tenta, color aut niger aut perpallidus; mul- 5  
 toque magis, si ita hæc sunt, ut neque c vi-  
 gilia præcesserit, neque ventris resolutio,  
 neque inedia. Ex quibus causis interdum  
 hæc species oritur, sed uno die finitur. Ita-  
 que diutius durans, mortis index est. Si 10  
 vero in morbo vetere d jam triduo talis est,  
 in propinquo mors est: magisque, si præ-  
 ter hæc oculi quoque lumen e refugiunt, &  
 51, 15. illachrymant; quæque in iis alba esse de-  
 bent f rubescunt; atque in iisdem g venulæ 15  
 pallent; pituitaque in iis innatans, novissi-  
 me angulis h inhærescit; alterque ex his mi-  
 nor est; iique aut vehementer subsederunt,  
 aut facti tumidiores sunt; perque som-  
 num i palpebræ non committuntur, sed in- 20  
 72, 18. ter has ex albo oculorum aliquid apparet;  
 neque id fluens alvus expressit: eademque  
 palpebræ pallent, & idem k pallor labra &  
 nares decolorat: eademque labra, & nares,  
 oculique, & palpebræ, & supercilia, aliqua- 25  
 ve ex his pervertuntur; isque propter im-  
 becillitatem jam non audit, aut non videt.  
 50, 30. Eadem mors denunciatur, ubi æger su-  
 pinus l cubat, eique genua m contracta sunt:  
 ubi deorsum ad pedes subinde delabitur: 30  
 51, 14. ubi brachia & n crura nudat, & inæquali-  
 ter dispergit, neque iis calor subest: ubi  
 51, 7. hiat o: ubi assidue dormit: ubi is, qui men-  
 tis suæ non est, neque id facere sanus so-  
 a Præn. 11, 6. Coac. Præn. 1, 104. b Præn. 11, 7. c Præn.  
 11, 13. d Præn. 11, 17. Pl. VII, 51. e Pr. 11, 19, 20. f Pr.  
 11, 23. g Id. 11, 24. h Id. 11, 24. i Aphor. VI, 52. Præn.  
 111, 1, 2. k Aph. IV, 49. l Præn. 111, 8. m Id. 111, 14.  
 n Id. 111, 10. o Id. 111, 3. let,

let, dentibus p stridet: ubi ulcus, q quod aut 63, 22.  
ante, aut in ipso morbo natum est, aridum,  
& aut pallidum, aut lividum factum est.  
Illa quoque mortis indicia sunt, \* ungues, 66, 14.  
5 digitique pallidi; frigidus r spiritus: aut si  
manibus quis in febre, & acuto morbo,  
vel insania, pulmonisve dolore, vel capitis,  
in veste f floccos legit, fimbriasve diducit,  
vel in adjuncto pariete, si qua minuta e-  
10 minent, carpit. Dolores etiam circa coxas  
& inferiores partes orti, si ad viscera tran-  
sierunt, subitoque desierunt mortem sub-  
esse testantur; magisque, si alia quoque  
signa accesserunt. Neque is servari potest,  
15 qui sine ullo tumore febricitans, subito  
strangulatur, aut devorare salivam suam  
non potest: cuive in eodem febris corporis-  
que habitu cervix t invertitur, sic ut devo-  
rare æque nihil possit: aut cui simul & con-  
20 tinua febris & ultima corporis infirmitas 52, 6.  
est: aut cui, febre non quiescente, exte-  
rior pars v friget, interior sic calet, ut etiam 51, 25.  
sicim faciat: aut qui, febre æque non quies- 90, 23.  
cente, simul & w delirio & spirandi difficul-  
25 tate vexatur: aut qui, epoto x veratro, ex-  
ceptus distentione nervorum est: aut qui  
ebrius obmutuit. Is enim fere y nervorum  
distentione consumitur, nisi aut febris ac-  
cessit, aut eo tempore, quo ebrietas solvi  
30 debet, loqui cœpit. Mulier quoque gravi-  
da z acuto morbo facile consumitur: & is,  
cui somnus dolorem a auget: & cui protinus,  
in recenti morbo, bilis atra b vel infra vel  
supra se ostendit: cuive alterutro modo se

D 4

prom-

p Id. iv, 4. q Id. iv, 7, 8. \* Aph. vii, 12. r Id. iv, 9.  
f Id. iv, 14. t Aph. iv, 35. v Aph. iv, 48. w Aph. iv,  
50. x Aph. iv. 16. y, 1. Coac. iv, 24. y Aph. v, 5.  
z Aph. v, 30. a Aph. ii, 1. b Aph. iv, 22.

promsit, cum jam longo morbo corpus  
 51, 12. ejus esset extenuatum & confectum. Spu-  
 76, 32. tum etiam c biliosum, & purulentum, sive  
 71. 2. separatim ista, sive mixta proveniunt, in-  
 teritus periculum ostendunt. Ac, si circa 5  
 septimum diem tale esse cœpit, proximum  
 est, ut is circa quartumdecimum diem de-  
 cedat, nisi alia signa mitiora pejorave ac-  
 cesserint: quæ quo leviora graviorave  
 subsequuta sunt, eo vel seriore[m] mortem, 10  
 vel maturiorem denunciant. Sudor quo-  
 que d frigidus in acuta febre pestiferus est:  
 301, atque in omni morbo vomitus, qui e variis,  
 24. & multorum colorum est; præcipueque, si  
 52, 18. malus in hoc odor est. Ac sanguinem quo- 15  
 que in febre f vomuisse, pestiferum est. Urina  
 52, 21. vero g fulva & tenuis in magna cruditate esse  
 consuevit; & sæpe, antequam spacio matu-  
 rescat, hominem rapit. Itaque si talis diutius  
 permanet, periculum mortis ostendit. Pestifera 20  
 h tamen est, præcipueque mortifera,  
 nigra, crassa, mali odoris. Atque in viris  
 quidem & mulieribus talis deterrima est.  
 In i pueris vero, quæ tenuis & diluta est. Al-  
 vus quoque varia, pestifera est; & quæ 25  
 strigmentum, sanguinem, bilem, k viride  
 aliquid, modo diversis temporibus, modo  
 simul, & in mistura quadam, discreta ta-  
 men repræsentat. Sed hæc quidem potest  
 paulo diutius trahere. In præcipiti vero 30  
 jam esse denunciat, quæ liquida, eadem-  
 52, 34. que vel nigra l, vel pallida, vel pinguis est;  
 53, 2. utique, si magna fœditas m odoris accessit.

Illud interrogari me posse ab aliquo scio:  
 si cer-

c Aph. IV, 23. d Præn. V, 4. e Præn. XII, 11, 12,  
 13, 14. f Aph. VII, 37. g De Jud. VII, 5. h Præn.  
 XI, 14, 15. i Plin. XXVIII. 6. k Præn. X, 8, 9.  
 l Vict. Acut. XLVIII, 1. m Præn. X, 6.

si certa futuræ mortis indicia sunt, quomodo interdum deserti à medicis convalescant, quosdamque fama prodiderit in ipsis funeribus revixisse? Quinetiam vir 5 jure magni nominis Democritus, ne finitæ quidem vitæ satis certas notas esse, proposuit, quibus medici credidissent: adeo illud non reliquit, ut certa aliqua signa futuræ mortis essent. Adversus quod ne il- 10 lud quidem dicam, quod in vicino sæpe quædam notæ positæ, non bonos, sed imperitos medicos decipiunt (quod Asclepiades sciens, funeri obvius inclamavit, cum vivere, qui efferebatur:)\* nec protinus n cri- 15 men artis esse, si quod professoris sit. Illa tamen moderatius subjiciam. Conjecturam o artem esse medicinam, rationemque conjecturæ talem esse, ut cum sæpius aliquando responderit, interdum tamen fal- 20 lar. Non itaque, si quid vix p millesimo in corpore aliquem decipit, id fidem non habet, cum per innumerabiles homines respondeat. Idque non in his tantum, quæ pestifera sunt, dico: sed in his quoque, quæ 25 salutaria. Siquidem q etiam spes interdum frustratur, & moritur aliquis, de quo medicus securus primo fuit. Quæque medendi causa reperta sunt, nonnunquam in pejus 18, 13. aliquibus vertunt. Neque id evitare huma- 19, 18. na imbecillitas in tanta varietate corporum potest. Sed est tamen medicinæ fides, quæ multo sæpius, perq; multo † plures ægros prodest. Neq; tamen ignorare oportet, in r acutis morbis fallaces magis notas esse & salutis, & mortis.

D 5

C A P.

\* Soran Ephes. cap. 1v. n Hipp. de Arte xv, 6, 7. o Sext. Emp. adv. Math. l. I. c. 3. Macrob. Sat. vii, 15. p Cic. de N. D. 11, 4. q Quintil. Declam. vii, 11, p. 110. † Galen. M. Med. Lxi. r Aph. 11, 19.

## C A P. VII.

*De notis , quas aliquis in singulis morborum generibus habere possit.*

**S**ED cum proposuerim signa, quæ in omni adversa valetudine communia esse consueverunt; ad ea quoque transibo, ut, quas aliquis in singulis morborum generibus habere possit notas, indicem. Quædam autem sunt, quæ ante febres, quædam quæ inter eas, quid aut intus sit, aut venturum sit, ostendunt. Ante febres, si caput grave est, aut ex somno oculi caligant, aut frequentia sternutamenta sunt, circa caput aliquis pituitæ impetus timeri potest. Si sanguis, aut calor abundat, proximum est, ut aliqua parte profluvium sanguinis fiat. Si sine causa quis emacrescit, ne in malum habitum corpus ejus decidat, metus est. Si præcordia dolent, aut inflatio gravis est, aut toto die non concocta fertur urina, cruditatem esse manifestum est. Quibus diu color a sine morbo regio malus est, hi vel capitis doloribus conflitantur, vel terram edunt. Qui diu habent faciem pallidam & tumidam, aut capite, aut visceribus, aut alvo laborant. Si in continua febre puero venter nihil reddit, mutaturque ei color, nec somnus accedit, ploratque is assidue, metuenda nervorum distentio est. Frequens autem destillatio in corpore tenui longoque, tabem timendam esse testatur. Ubi pluribus diebus non descen-

a II. Præd. xxxix. 1, 2, 3. b II. Præd. xxix. 7, 8.  
c Aph. vii, 18.



descendit alvus, docet, aut subitam dejectionem, aut febriculam instare. Ubi pedes tument, & longæ dejectiones sunt, aut dolor in imo ventre & coxis est, aqua inter  
 5 cutem instat, sed hoc morbi genus ab ilibus oriri solet. Idem propositum periculum est his, quibus, cum voluntas desidendi est, venter nihil reddit, nisi & ægre & durum. Cum tumor in d pedibus est, idem  
 10 que modo dextra, modo sinistra parte ventris, invicem oritur atque finitur, à joci-  
 nore id malum proficisci videtur. Ejusdem morbi nota est, ubi circa e umbilicum  
 intestina torquentur (σερόρον Græci nomi-  
 15 nant) coxæque dolores manent, qui neque tempore, neque remediis solvuntur. Dolor autem articulorum, prout in pedibus, manibusve, aut alia qualibet parte sic est, ut eo loco nervi contrahantur; aut si id  
 20 membrum, ex levi causa fatigatum, æque frigido, calidoque offenditur, ποδάγραν χειράγρανve, vel ejus articuli, in quo id sentitur, morbum futurum esse denunciat. Quibus in pueritia sanguis ex naribus fluxit, dein fluere desit, hi vel capitis doloribus conflictentur necesse est, vel in articulis aliquas exulcerationes graves habeant, vel aliquo morbo etiam debilitentur. Quibus sceminis \* menstrua non proveniunt, necesse est capitis acerbissimi dolores  
 30 sint, vel quælibet alia pars morbo infestetur. Eademque his pericula sunt, quibus articulorum vitia, ut dolores, tumoresque, sine podagra similibusque morbis, oriuntur

tur, & definunt. Utique, si sæpe tempora  
 iisdem dolent, noctuque corpora insudant,  
 frons prurit, lippitudinis metus est. Si  
 mulier à partu vehementes dolores habet,  
 neque præterea signa mala sunt, circa vi- 5  
 gesimum diem aut sanguis per nares erum-  
 pet, aut in inferioribus aliquid abscedet.  
 Quicumque etiam dolorem ingentem cir-  
 ca tempora & frontem habebit, ei alterutra  
 ratione finiet: magisque, si juvenis erit, 10  
 per sanguinis profusionem; si senior, per  
 suppurationem. Febris autem, quæ subito  
 sine ratione, si bonis signis finita est, fe-  
 re revertitur. Cui fauces sanguine & in-  
 terdiu & noctu replentur, sic, ut neque 15  
 capitis dolores, neque præcordiorum, ne-  
 que tussis, neque vomitus, neque febricu-  
 la præcesserit, hujus aut in naribus, aut in  
 faucibus ulcus reperietur. Si mulieri ex  
 inguine febricula orta est, neque causa ap- 20  
 paret, ulcus in vulva est. f Urina autem  
 crassa, ex qua quod desidit, album est, si-  
 gnificat circa articulos, aut circa viscera  
 dolorem, metumque morbi esse. Eadem  
 viridis, aut viscerum dolorem, tumorem- 25  
 que cum aliquo periculo subesse, aut cor-  
 pus certe integrum non esse, testatur. At  
 si † sanguis aut pus g in urina est, vel vesica,  
 vel renes exulcerati sunt. Si hæc crassa  
 carunculas h quasdam exiguas aut quasi ca- 30  
 pillos habet, aut si i bullat, aut male k olet,  
 aut interdum quasi arenam, interdum  
 quasi sanguinem trahit, dolent autem coxæ,  
 quæque inter has superque pubem sunt, &  
 acce-

f Aph. iv, 74. Plin. xxviii. 6. † Aph. iv. 78. 81.  
 g Aph. iv, 75. h Aph. iv, 76. i Plin. xxviii. 6.  
 k Aphor. iv, 81.

accedunt frequentes ructus , interdum vo-  
 mitus biliosus extremæque partes frige-  
 scunt , urinæ crebra cupiditas , sed magna  
 difficultas est , & quod inde excretum est ,  
 5 aquæ simile , vel rufum , vel pallidum est ,  
 paulum tamen in eo levamenti est , alvus  
 vero cum multo spiritu redditur , utique  
 in renibus vitium est. At si paulatim destil-  
 lat , vel si sanguis per hanc editur , & in eo  
 10 quædam cruenta concreta sunt , idque ipsum  
 cum difficultate redditur , & circa pubem  
 interiores partes dolent , in eadem vesica  
 vitium est. Calculosi vero his indicis co-  
 gnoscuntur. Difficiliter urina redditur ;  
 15 paulatimque , interdum etiam sine volun-  
 tate , † destillat. Eadem arenosa l est. non-  
 nunquam aut sanguis , aut cruentum , aut  
 purulentum aliquid cum ea excernitur.  
 Eamque quidam promptius recti , quidam  
 20 resupinati , maximeque hi qui grandes  
 calculos habent , quidam etiam inclinati  
 reddunt , colemque extendendo , dolorem  
 levant. Gravitatis quoque cujusdam in ea  
 parte sensus est ; atque ea cursu , omnique  
 25 motu augetur. Quidam etiam , cum tor-  
 quentur , pedes inter se , subinde mutatis  
 vicibus , implicant. Fœminæ vero oras  
 naturalium suorum manibus admotis sca-  
 bere crebro coguntur. Nonnunquam , si  
 30 digitum admoverint , ubi vesicæ cervicem  
 is urget , calculum sentiunt. At , qui spuman-  
 tem sanguinem excreant , his in pulmone  
 vitium est. Mulieri gravidæ m sine modo fu-  
 sa alvus elidere partum potest. † Eidem si 73,34  
 lac

† Aph. v, 80. l Aph. iv, 79. m Aph. v, 34.

† Solet. Treverius.

lac<sup>n</sup> ex mammis profluit, imbecillum est,  
 quod intus gerit. Duræ mammæ, sanum  
 illud esse, testantur. Frequens o singultus, &  
 præter consuetudinem continuus, jecur  
 inflammatum esse, significat. Si p tumores 5  
 super ulcera subito esse desierunt, idque à  
 tergo incidit, vel distentio nervorum, vel  
 rigor timeri potest: at, si à priore parte id  
 evenit, vel lateris acutus dolor, vel insania  
 expectanda est. Interdum etiam hujusmo- 10  
 di casum, quæ tutissima inter hæc est,  
 profusio alvi sequitur. Si ora q venarum,  
 47, 14. sanguinem solita fundere, subito suppressa  
 401, sunt, aut aqua inter cutem, aut tabes sequi-  
 17. tur. Eadem tabes subit, si in lateris dolo- 15  
 67, 2. re orta suppuratio intra r quadraginta dies  
 purgari non potuit. At, si longa s tristitia  
 cum longo timore & vigilia est, atræ bilis  
 morbus subest. Quibus sæpe ex naribus  
 fluit sanguis, his aut lienis tumet aut ca- 20  
 pitis dolores sunt: quos sequitur, ut quædam  
 ante oculos tanquam imagines obversen-  
 tur. At, quibus magni lienes sunt, his t gingi-  
 væ malæ sunt, & os olet, aut sanguis aliqua  
 parte prorumpit. Quorum si nihil evenit, 25  
 215, 13. necesse est in cruribus mala ulcera, & ex  
 his nigræ cicatrices fiant. Quibus causa  
 doloris, neque sensus u ejus est, his mens la-  
 borat. Si in ventrem x sanguis confluit,  
 ibi in pus vertitur. Si à coxis, & ab infe- 30  
 rioribus partibus dolor in pectus transit,  
 neque ullum signum malum accessit, sup-  
 purationis eo loco periculum est. Quibus  
 sine febre aliqua parte dolor, aut prurigo,  
 cum

n Aph. v. 52. o Aph. vii. 17. p Aph. v. 65. q Aph.  
 vi. 12. r Aph. v. 15. s Aph. vi. 23. t De Int. Aff. xxxiv.  
 9, 10. Æg. de Re. Med. l. iii. c. 49. u Aph. ii. 6.  
 x Aph. vi, 20.

cum rubore & calore est, ibi aliquid suppurat. Urina quoque, quæ in homine parum sano liquida est, circa aures futuram aliquam suppurationem esse denunciat.

- 5 Hæc vero, cum sine febre quoque vel latentium, vel futurarum rerum notas habeant, multo certiora sunt, ubi febris accessit; atque etiam aliorum morborum tum signa nascuntur. Ergo protinus insania timenda est, ubi expeditior alicujus, quam sani fuit, sermo est, subitaque loquacitas orta est, & hæc ipsa solito audacior: aut ubi raro quis & vehementer spirat, venasque concitatas habet, præcordiis duris & tumentibus. Oculorum quoque frequens motus; & in capitis dolore offusæ oculis tenebræ: vel, nullo dolore substantive, somnus ereptus, continuataque nocte & die vigilia; vel prostratum contra consuetudinem corpus in ventrem, sic, ut ipsius alvi dolor id non coegerit; item, robusto adhuc corpore, insolitus dentium stridor, 55, 1. insanix signa sunt. Si quid etiam abscessit, & antequam sputum prodiret, manente adhuc in corpore solita febre, subsedit, periculum affert primum furoris, deinde interitus. Auris quoque dolor acutus, cum febre continua vehementique, sæpe mentem turbat: & ex eo casu juniores interdum intra septimum diem moriuntur; 30 seniores tardius: quoniam neque æque magnas febres experiuntur, neque æque insaniunt: ita sustinent, dum is affectus in pus vertatur. Suffusæ quoque b sanguine mulie-



mulieris mammæ, furorem venturum esse, testantur. Quibus autem longæ c febres sunt, his aut abscessus aliqui, aut articulorum dolores erunt. Quorum faucibus in febre illiditur spiritus, instat his nervorum distentio. Si angina subito d finita est, in pulmonem id malum transit; idque sæpe intra septimum diem occidit: quod nisi incidat, sequitur, ut aliqua parte suppuret. Denique, post alvi longam resolutionem e tormina: post hæc, intestinorum lævitas oritur. Post nimias destillationes, tabes f. Post lateris g dolorem, vitia pulmonum: post hæc, h insania. Post magnos i fervores corporis, nervorum rigor, aut distentio. Ubi caput k vulneratum est, delirium: ubi vigilia l torfit, nervorum distentio: ubi vehementer venæ m supra ulcera moventur, sanguinis profluvium erit.

Suppuratio vero pluribus modis excitatur. Nam si longæ febres sine dolore, sine manifesta causa remanent, in aliquam partem id malum incumbit, sed in junioribus tantum: nam in senioribus ex ejusmodi morbo quartana fere nascitur. Eadem suppuratio fit, si præcordia dura & dolentia ante n diem vigesimum hominem non sustulerunt, neque sanguis ex naribus fluxit, maximeque in adolescentibus; utique, si inter principia aut oculorum caligo, aut 30 capitis dolores fuerunt: sed tum in inferioribus partibus aliquid abscedit. At si præcordia tumorem o mollem habent, neque habere intra sexaginta dies desinunt,

c Aph. IV, 44. d Aph. V, 10. Act. Meth. Med. I, 17.  
e Aph. VII, 23, 75. f Del. in Hom. XXVII, 1. g Aph. VII, 11. h Aph. VII, 12. i Aph. VII, 13. k Aph. VII, 14.  
l Aph. VII, 18. m Aph. VII, 21. n Coac. Præn. II, 228. o Coac. II, 232. hæ-

hæretque per omne id tempus febris, tum  
 in superioribus partibus fit abscessus: ac,  
 si inter ipsa initia sanguis è naribus non  
 fluit, circa aures erumpit. Cumque o-  
 5 mnis longus tumor ad suppurationem fere  
 spectet, magis eo tendit is, qui in præcor-  
 diis, quam is, qui in ventre est: & is qui su-  
 pra umbilicum, quam is qui infra est. Si las-  
 titudinis etiam sensus in febre est, vel in  
 10 maxillis, vel in articulis aliquid abscedit. †  
 Interdum quoque urina tenuis & cruda sic  
 diu fertur, ut alia salutaria signa sint, ex-  
 que eo casu plerunque infra transversum  
 septum (quod *διάφραγμα* Græci vocant)  
 15 fit abscessus. Dolor pulmonis, si neque  
 per sputa, neque per cucurbitulas, neque  
 per sanguinis detractionem, neque per vi-  
 ctus rationem finitus est, vomicas aliquas  
 interdum excitat, aut circa vigesimum  
 20 diem, aut circa tricesimum, aut circa quadra-  
 gesimum, nonnunquam etiam circa sexage-  
 simum. Numerabimus autem ab eo die, quo  
 primum febricitavit aliquis, aut inhorruit,  
 aut gravitatem ejus partis sensit. Sed hæ  
 25 vomicæ modo à pulmone, modo à costa-  
 rum parte nascuntur. Quod suppurat, ea  
 parte, quam afficit, dolorem inflammatio-  
 nemque concitat, ipsumque calidius est:  
 &, si in partem sanam aliquis decubuit,  
 30 onerare eam ex pondere aliquo videtur.  
 Omnis etiam suppuratio, quæ nondum  
 oculis patet, sic deprehendi potest: si febris  
 non dimittit, eaque interdum levior est, no-  
 ctu increscit; p multus sudor oritur; cupidi-  
 E tas

† Aph. IV. 31. p De loc. in Hom. XXVII. 12.

tas tussendi est , & pene nihil in tussi ex-  
 creatur ; oculi cavi sunt ; malæ rubent ; ve-  
 næ sub lingua inalbescunt ; in manibus  
 fiunt adunci ungens ; digiti , maximeque  
 summi , calent ; in pedibus q tumores sunt ; 5  
 spiritus difficiliter trahitur ; cibi fastidium  
 est ; pustulæ toto corpore oriuntur. Quod  
 si protinus initio dolor & tussis fuit , & spi-  
 ritus difficultas , vomica vel ante vel circa  
 vigesimum diem erumpet. Si serius ista 10  
 cœperint , necesse est quidem increcant ,  
 sed quo minus cito adfuerint , eo tardius  
 solventur. Solent etiam in gravi morbo  
 55, 6. pedes cum digitis unguibusque nigrescere.  
 quod si non est mors consecuta , & reli- 15  
 quum corpus convaluit , pedes tamen de-  
 cidunt.

## C A P. VIII.

*Quæ notæ in quoque morbi genere vel spem 20  
 vel pericula ostendant.*

**S**EQUITUR, ut in quoque morbi ge-  
 nere proprias notas explicem , quæ vel  
 spem , vel periculum ostendant. Ex ve-  
 fica dolenti , si purulenta a urina processit , 25  
 inque eo læve & album subsedit , metum  
 detrahit. In pulmonis morbo , si sputo b ipso  
 levatur dolor , quamvis id purulentum est ,  
 tamen , si æger facile spirat , facile excreat ,  
 morbum ipsum non difficulter fert , potest 30  
 ei secunda valetudo contingere. Neque  
 inter initia terreri convenit , si protinus  
 sputum mistum est rufo quodam sangui-  
 ne , dummodo statim sedetur. Laterum c do-  
 lores ,

q De loc. in Hom. xxviii, 8. a Præn. xix, ii.  
 b Præn. xiii, 16. Præd. i, xi, 2. c Aph. v, 15.

lores, suppuratione facta, deinde intra  
 quadragesimum diem purgata, finiun-<sup>62, 15.</sup>  
 tur. Si in jecinore vomica est, & ex ea  
 fertur pus purum d & album, salus ei fa-<sup>71, 13.</sup>  
 5 cilis. Id enim malum in tunica est. Ex sup-  
 purationibus vero hæ tolerabiles sunt,  
 quæ in e exteriorem partem feruntur, &  
 acuuntur. At ex his, quæ intus f procedunt,  
 hæ leviores, quæ conclusæ cutem non af-  
 10 ficiunt, eamque & sine dolore & ejusdem  
 coloris, cujus reliquæ partes sunt, sinunt  
 esse. Pus g quoque, quacumque parte erum-  
 pit, si est læve, album & unius modi, sine<sup>410,</sup>  
 ullo metu est; &, quo effuso, febris proti-<sup>34.</sup>  
 15 nus conquievit, desieruntque urgere cibi  
 fastidium & potionis desiderium. Si quan-  
 do etiam suppuratio descendit in crura,  
 sputumque ejusdem factum pro rufo pu-  
 rulentum est, periculi minus est. At in ta-  
 20 be ejus, qui salvus futurus est, sputum  
 esse debet album, hæquale, totum, ejusdem-  
 que coloris, sine pituita: eique etiam si-  
 mile esse oportet, si quid in nares à capi-  
 te destillat. Longe optimum est, i febrem  
 25 omnino non esse: secundum est, tantillam  
 esse, ut neque tantulum cibum impediatur,  
 neque crebram sitim faciat. Alvus k in hac  
 valetudine ea tuta est, quæ quotidie co-  
 cta, eaque convenientia his, quæ assumun-  
 30 tur, reddit. Corpus id, quod minime tenue,  
 maximeque lati l pectoris atque setosi est,  
 cujusque cartilago exigua, & carnosâ est.  
 Super tabem si mulieri quoque suppressa  
 menstrua fuerunt, & circa pectus atque  
 E 2 scapu-

d Aph. VII, 45. e Præn. VII, 3. f Præn. VII, 5.  
 g Præn. VII, 6. h Prædict. II, XII, 2. i Præd. II,  
 XII, 4. k Præd. II, XII, 5. l Præd. II, XII, 7.

scapulas dolor mansit , subitoque in sanguis  
erupit , levare morbus solet : nam & tussis  
minuitur , & sitis atque febriculæ desinunt.  
Sed iisdem n̄ fere , nisi redit sanguis , vomica  
erumpit : quæ quo cruentior , eo melior est. 5  
161, 5. Aqua autem inter cutem minime terribi-  
lis est , quæ nullo antecedente morbo cœ-  
pit : deinde , quæ longo morbo supervenit ;  
utique , si firma o viscera sunt ; si spiritus fa-  
cilis ; si nullus dolor ; si sine calore corpus 10  
est ; æqualiterque in extremis partibus ma-  
crum est ; si venter mollis ; si nulla p̄ tussis ; nulla  
sitis ; si lingua , ne per somnum quidem , ina-  
rescit ; si cibi cupiditas est ; si venter medica-  
mentis moveretur ; si per se \* excernit mollia & 15  
figurata ; si non extenuatur ; si urina , & vini  
mutatione , & epotis aliquibus medicamen-  
tis mutatur ; si corpus sine lassitudine est , &  
motum facile sustinet : siquidem in quo om-  
nia hæc sunt , is ex toto tutus est : in quo plu- 20  
ra ex his sunt , is in bona spe est. Articulo-  
rum vero vitia , ut podagræ chiragræque , si  
73, 7. juvenes q̄ tentarunt , neque callum induxe-  
runt , solvi possunt : maximeque r̄ tormini-  
bus leniuntur , & si quocumque modo ven- 25  
73, 16. ter fluit. Item morbus f̄ comitialis ante pu-  
bertatem ortus , non ægre finitur. Et , in quo  
ab una parte corporis venientis accessionis  
sensus incipit , optimum est à manibus pe-  
dibusve initium fieri : deinde , à lateribus : 30  
peffimum inter hæc , à t̄ capite. Atque in his  
quoque ea maxime profunt , quæ per de-  
jectiones excernuntur. Ipsa autem deje-  
73, 25. ctio sine ulla noxa est , quæ sine febre est ;  
si ce-

m II. Præd. xiv, 3. n II. Præd. xiv, 6, 7.  
o II. Præd. xi, 6. p II. Præd. xi, 16. \* Aph. vii, 29.  
q II. Præd. xv, 6. 7. 8. r II. Præd. xv, 4. f II. Præd.  
xvi, 1. Aph. v, 7. t II. Præd. xvi, 7.



si celeteriter desinit ; si contrectato ventre nullus motus ejus sentitur ; si extremam alvum spiritus sequitur. Ac ne tormina quidem periculosa sunt, si sanguis & strigmenta descendunt, dum febris cæteræque accessiones hujus morbi absint : adeo ut etiam gravida v mulier, non solum conservari possit, sed etiam partum reservare. Prodestque in hoc morbo, si jam ætate aliquis processit. Contra, intestinorum x lævitas 226. facilius à teneris ætatibus depellitur : utique, si ferri urina, & ali cibo corpus incipit. Eadem ætas prodest & in coxæ dolore, & humerorum, & in omni resolutione nervorum. Ex quibus coxa, si sine torpore est, si leviter friget, quamvis magnos dolores habet, tamen & facile & mature sanatur : resolutumque membrum, si nihilo minus alitur, fieri sanum potest. Oris resolutio etiam, alvo circa finitur. Omnisque dejectio y lippienti prodest. At, varix z ortus 368, vel per ora venarum subita profusio sanguinis vel tormina, insaniam tollunt. Humerorum a dolores, qui ad scapulas vel manus tendunt, vomitu atræ bilis solvuntur. Et quisquis dolor deorsum tendit, sanabilior 76, 5. est. Singultus b sternutamento finitur. Longas dejectiones c supprimit vomitus. Mulier sanguinem vomens, d profusis menstruis, liberatur. Quæ menstruis e non purgatur, si 32, 19. sanguinem ex naribus fudit, omni periculo vacat. Quæ locis laborat, aut difficulter f partum edit, sternutamento levatur. Cui calor & g tremor est, saluti delirium est.

E 3

Lieno-

v II. Præd. xxx, 14. x II. Præd. xxxi, 12, 15, 16.  
 y Aph. vi, 17. z Aph. vi, 21. a II. Præd. xlii, 2.  
 b Aph. vi, 13. c Aph. vi, 15. d Aph. v, 32. e Aph.  
 v, 33. f Aph. v, 35. g Aph. vi, 26.

Lienosis bono<sup>h</sup> tormina sunt. Denique, ipsa febris, quod maxime mirum videri potest, sæpe præsidio est. Nam & i præcordiorum dolores, si sine inflammatione sunt, finit; & in jocinoris k dolore succurrit; & nervorum distentionem l rigoremque, si postea cœpit, ex toto tollit; & ex difficultate urinæ morbum tenuioris intestini ortum, si urinam per calorem movet, levat. At dolores capitis, quibus oculorum caligo, & rubor cum quadam frontis pruriginè accedunt, sanguinis m profusione, vel fortuita, vel etiam petita, summoventur. Si capitis, ac frontis n dolores ex vento, vel frigore, aut æstu sunt, gravedine & sternutamentis finiuntur. Febrem autem o ardentem, quam Græci *καυσώδη* vocant, subitus horror exolvit. Si in febre aures p obtusæ sunt, si sanguis è naribus fluxit, aut venter resolutus est, illud malum desinit ex toto. Nihil plus adversus q surditatem, quam biliosa alvus potest. Quibus in fistula r urinæ minuti abscessus, quos *φύματα* Græci vocant esse cœperunt; iis, ubi pus ea parte profluxit, sanitas redditur. Ex quibus cum pleuraque per se proveniant, scire licet, inter ea, quæ ars adhibet, naturam plurimum posse. Contra, si caput in febre continenti dolet, neque quicquam remittit, malum atque mortiferum est: maximeque id periculum est pueris, à septimo anno ad quartumdecimum. In pulmonis morbo, si sputum primis diebus non fuit, deinde à septimo die cœpit, & ultra septimum mansit,

pericu-

h Aph. VI, 48. i Aph. VI, 40. k Aph. VII, 52. l Aph. IV, 57. m Aph. VI, 10. II. præd. XXXVI, 5. n II. præd. XXXVI, 8. o Aph. IV, 58. p Aph. IV, 60. q Aph. IV, 28. r Aph. IV, 82.

periculosum est: quantoque magis mixtos, <sup>56, 4.</sup>  
 neque inter se diductos colores habet, tan-  
 to deterius. Et tamen nihil pejus est, quam  
 sincerum id edi, siue rufum est, siue cruen-  
 5 tum, siue salbum, siue glutinosum, siue pal-  
 lidum, siue spumans: nigrum <sup>t</sup> tamen pes-  
 simum est. In eodem morbo periculosa  
 sunt, tussis, destillatio; etiam, quod alias  
 salutare habetur, v sternutamentum. Pericu-  
 10 losissimumque est, si hæc secuta subita x de- <sup>72, 3.</sup>  
 jectio est. Fere vero, quæ in pulmonis, ea-  
 dem in lateris doloribus, & mitiora signa,  
 & asperiora esse consuerunt. Ex jocinore <sup>67, 3.</sup>  
 si pusy cruentum exit, mortiferum est. At  
 15 ex suppurationibus hæc z pessimæ sunt, quæ  
 intus tendunt, sic ut exteriorem quoque  
 cutem decolorent: ex his deinde, quæ in  
 exteriorem partem prorumpit; tum quæ ma-  
 ximæ, quæque planissimæ sunt. Quod si, ne  
 20 rupta quidem vomica, vel pure extrinse-  
 cus emisso, febris quievit, aut quamvis  
 quieverit, tamen repetit; item; si sitis est,  
 si cibi fastidium, si venter liquidus, si pus  
 est lividum & pallidum, si nihil æger ex-  
 25 creat nisi pituitam spumantem, periculum  
 certum est. Atque ex his quidem suppura-  
 tionibus, quas pulmonum morbi concita-  
 runt, fere senes moriuntur: ex cæteris ju-  
 niores. At in tæbe sputum mixtum puru-  
 30 lentum, febris assidua, quæ & cibi tempora  
 eripit, & siti affligit, in corpore tenui pe-  
 riculum subesse testatur. Si quis etiam in  
 eo morbo diutius traxit, ubi capilli <sup>a</sup> fluunt;  
 ubi urina quædam <sup>b</sup> araneis similia superfi-

E 4

dentia

f Præn. XIII, 6. t Præn. XIII, 8. v Aph. VI. 16.  
 Coac. Præn. III, 174. Præn. XIII, 10. x Aph. V, 12.  
 y Aph. VII, 45. z Præn. VII. a Aph. V, 11. b Præn.  
 XII, 1. Coac. Præn. V, 49.

168, 5. dentia ostendit ; atque in sputis odor e fœ-  
 dus est ; maximeque , ubi post hæc orta  
 71, 10. dejectio est , protinus moritur : utique , si  
 tempus d autumnii est : quo fere , qui cætera  
 parte anni traxerunt , resolvuntur. Item , 5  
 pus expulisse in hoc morbo , deinde ex toto  
 spuete e desuisse , mortiferum est. Solet etiam  
 in adolescentibus is morbus , ex vomica ,  
 fistulave oriri : qui non facile sanescunt ,  
 nisi si multa signa bonæ valetudinis subse- 10  
 cuta sunt. Ex reliquis f vero minime faci-  
 le sanantur virgines , aut eæ mulieres , qui-  
 bus supervenit tabes , quod menstrua sup-  
 pressa sint. Cui vero sano g subitus dolor ca-  
 pitis ortus est , dein somnus oppressit , sicut 15  
 stertat , neque expergiscatur , intra septi-  
 mum diem pereundum est : magis si , cum  
 54, 20. alvus citâ non antecesserit , palpebræ dor-  
 mientis non coeunt , sed album oculorum  
 apparet. Quos tamen † ita mors sequitur , si 20  
 id malum non est febre discussum. At hæc aqua  
 inter cutem , si ex acuto morbo cœpit , ad  
 sanitatem raro perducitur : utique , si con-  
 traria his , quæ supra posita sunt , subse-  
 quuntur. Æque in ea quoque tussis i spem 25  
 tollit : item , si sanguis sursum k deorsumve  
 erupit , & aqua medium corpus implevit.  
 Quibusdam etiam in hoc morbo l tumo-  
 res oriuntur , deinde desinunt , deinde rur-  
 sus assurgunt. Hi quidem tutiores sunt , 30  
 quam qui supra comprehensi sunt , si atten-  
 dunt : sed fere fiducia secundæ valetudinis  
 opprimuntur. Illud jure aliquis mirabi-  
 tur , quomodo quædam simul & affligant  
 nostra

c Aph. v, 11. d Aph. 111, 10. e Aph. VII, 16, 78.  
 f II. Præd. XIII, 5. g Aph. VI, 51. † cita vel certa,  
 lego. h Præn. VIII, 1. i Aph. VI, 35. VII, 47.  
 k II. Præd. XI, 30 l II. Præd. XI, 33.

nostra corpora , & parte aliqua tueantur. Nam , sive aqua inter cutem quem implevit , sive in magno abscessu in multum puris coit , simul id omne effudisse , æque mortiferum est , ac si quis sani corporis vulnere factus exanguis est. Articuli vero cui si dolent , ut super eos ex callo quædam tubercula 68,23. innata sint , nunquam liberantur : quæque eorum vitia vel in senectute cœperunt , vel in senectutem ab adolescentia pervenerunt , ut aliquando leniri possunt , sic nunquam ex toto finiuntur. Morbus quoque comitialis post annum quintum & vigesimum ortus ægre curatur : multoque ægrius 68, 27. is : qui post quadragesimum annum cœpit ; adeo ut in ea ætate \* aliquid in natura 68,26. spei , vix quidquam in medicina sit. In eodem morbo , si simul totum corpus afficitur , neque ante in partibus aliquis venientis mali sensus est , sed homo ex improvise 172,9. concidit , cujuscumque is ætatis est , vix sanescit : si vero aut mens læsa est , aut nervorum facta resolutio , medicinæ locus non est. Dejectionibus quoque si febris accessit ; 68, 34. si inflammatio jecinoris , aut præcordiorum ; aut ventris ; si immodica sitis ; si longius tempus ; si alvus varia ; si cum dolore est , etiam mortis periculum subest : maximeque , si inter hæc tormina vetera esse cœperunt. Isque morbus maxime quæ pueros absumit usque ad annum decimum : cæteræ ætates facilius sustinent. Mulier quoque gravida ejusmodi casu rapi potest : atque , etiamsi ipsa convaluit , partum tamen perdit. 61, 34.

E §

m Aph. v, 1, 27. n II. Præd. xv, 2. \* Aph. i, 1, 45. o II. Præd. xv, 1, 4. p II. Præd. xxx, 3, 4. q II. Præd. xxx, 10. r II. Præd. xxx, 14.



dit. Quin etiam tormina † ab atra bile orsa  
 mortifera sunt : aut si sub his , extenuato  
 jam corpore , subito nigra alvus profluxit.  
 At intestinorum † lævitas periculosior est,  
 si frequens dejectio est ; si venter omnibus 5  
 horis & cum sono & sine hoc profluit ; si si-  
 militer noctu & interdiu ; si , quod excerni-  
 tur , aut crudum est , aut nigrum , & , præter  
 id , etiam læve , & mali odoris , si sitis urget ;  
 si post potionem urina non redditur ( quod 10  
 evenit , quia tunc liquor omnis non in ve-  
 sicam , sed in intestina descendit ; ) si os exul-  
 ceratur ; si rubet facies , & quasi maculis  
 quibusdam colorum omnium distinguitur ;  
 si venter est quasi fermentatus ; pinguis at- 15  
 que rugosus ; si & cibi cupiditas non est.  
 Inter quæ cum evidens mors sit , multo  
 evidentior est , si jam in longinquum quo-  
 que id vitium est : maxime etiam , si in cor-  
 pore senili est. Si vero in tenuiore intesti- 20  
 no morbus est , † vomitus , singultus , nervo-  
 22,29, rum distentio , delirium , mala sunt. At in  
 morbo arquato v durum fieri jecur , pernicio-  
 sissimum est. Quos lienes x male habent , si tor-  
 mina prehenderunt , deinde conversa sunt 25  
 vel in aquam inter cutem , vel in intestino-  
 rum lævitatem , vix ulla medicina pericu-  
 70. 7. lo subtrahit. Morbus intestini tenuioris  
 ex urinæ y difficultate , nisi febre resolutus  
 est , intra septimum diem occidit. Mulier z 30  
 ex partu , si cum febre vehementibus etiam  
 & assiduis capitis doloribus premitur , in  
 periculo mortis est. Si dolor atque inflam-  
 matio est in his partibus , quibus viscera  
 con-

† Aph. iv. 24. † II. Præd. xxxi, 2, 3, 4. † Aph.  
 vii. 10. v Aph. vi. 42. x Aph. vi. 43. y Aph. vi.  
 44. z Aph. v, 55.

continentur , frequenter spirare , signum  
 malum est. Si sine causa longus dolor capi-  
 tis est , & in cervices ac scapulas transit ,  
 rursusque in caput revertitur , aut à capite  
 5 ad cervices scapulasque pervenit , pernici-  
 osus est : nisi vomitam aliquam excitat , sic ,  
 ut pus \* extussiat ; aut nisi sanguis ex ali-  
 qua parte prorumpit ; aut nisi in capite multa  
 porrigo , totove corpore pustulæ ortæ sunt.  
 10 Æque magnum malum est , ubi torpor a at-  
 que prurigo pervagantur , modo per totum  
 caput , modo in parte ; aut sensus alicujus ibi  
 quasi frigoris est , eaque ad summam quoque  
 linguam perveniunt. Et , cum in iisdem ex  
 15 abscessibus auxilium sit , eo tamen difficilior  
 sanitas est , quo minus sæpe sub his malis illi  
 subsequuntur. In coxæ<sup>b</sup> vero doloribus , si  
 vehemens torpor est , frigescitque crus &  
 coxa , alvusque nisi coacta non reddit , id-  
 20 que , quod excernitur , muscosum est , jam-  
 que ætas ejus hominis quadragesimum an-  
 num excessit , is morbus erit longissimus ,  
 minimumque annuus ; neque finiri poterit ,  
 nisi aut vere , aut † autumno. Difficilis æque  
 25 curatio est , in eadem ætate , ubi humerorum  
 dolor<sup>c</sup> vel ad manus pervenit , vel ad scapu-  
 las tendit , torporemque & dolorem creat ,  
 neque bilis vomitu levata est. Quacunque  
 vero parte corporis membrum aliquod re-  
 30 solutum est , si neque<sup>d</sup> movetur , & emacre-  
 scit , in pristinum habitum non revertitur ;  
 eoque minus , quo vetustius<sup>e</sup> id vitium  
 est , & quo magis in corpore senili est. O-  
 mnique resolutioni nervorum ad medicinam 39,24.  
 non

\* Cael. Aurelian. Acut. Morb. II. 16. a II. Præd.  
 xxxvii. b II. Præd. xlv. 2. ad 8. † ex Hippocratz.  
 c II. Præd. xlv. 1, 2. d II. Præd. xlii. 8.  
 e II. Præd. xliii. 2, 3.

178, 32. non idonea tempora sunt hiems <sup>f</sup> & autumnus : aliquid sperari potest vere & æstate. Isque morbus mediocris † vix \* sanatur, vehemens sanari non potest. Omnis etiam doctor minus medicinæ paret, qui sursum <sup>g</sup> pro- 5  
 69, 26. cedit. Mulieri <sup>h</sup> gravidæ si subito mammæ emacuerunt, abortus periculum est. Quæ neque <sup>i</sup> peperit, neque gravidæ est, si lac ha-  
 147, 7. bet, à menstruis defecta est. Quartana <sup>k</sup> æstiva, brevis, autumnalis fere longa est; 10  
 maximeque, quæ cœpit hieme appropinquante. Si sanguis <sup>l</sup> profluxit, deinde secuta est dementia cum distentione nervorum, periculum mortis est. Itemque, si medicamentis <sup>m</sup> purgatum & adhuc inanem, 15  
 nervorum distentio oppressit: aut si in magno dolore, extremæ partes frigent. Neque is ad vitam <sup>n</sup> redit, qui ex suspendio, spumante ore, detractus est. Alvus <sup>o</sup> nigra, sanguini atro similis, repentina, sive cum 20  
 febre, sive etiam sine hac est, perniciosa est.

## C A P. IX.

*De Morborum curationibus.*

C O G N I T I S indiciis, quæ nos vel spe 25  
 consolentur, vel metu terreant, ad curationes morborum transeundum est. Ex his quædam communes sunt, quædam propriæ. Communes, quæ pluribus morbis opitulantur. Propriæ, quæ singulis. 30  
 Ante de communibus dicam. Ex quibus tamen quædam non ægros solum, sed sanos quoque sustinent, quædam in adversa tantum valetudine adhibentur.

Omne

<sup>f</sup> II. Præd. XLIII, 4. † Aph. II, 42. Aretæus de Morb. diurn. I, 7. <sup>g</sup> II. Præd. XLVI, 9. <sup>h</sup> Aph. v, 37. <sup>i</sup> Aph. v, 39. <sup>k</sup> Aph. II, 25. <sup>l</sup> Aphor. v, 3. <sup>m</sup> Aph. v, 4. <sup>n</sup> Aph. II, 43. <sup>o</sup> Aph. IV, 21.

Omne vero auxilium corporis, aut demit aliquam materiam, aut adjicit, aut evocat, aut reprimit, aut refrigerat, aut calefacit, simulque aut durat, aut mollit.

- 5 Quædam non uno modo tantum, sed etiam duobus inter se non contrariis adjuvant. Demitur materia, sanguinis detractione, cucurbitula, dejectione, vomitu, frictione, gestatione, omnique exercitatione corporis, abstinentia, sudore. De quibus protinus dicam.

C A P. X.

*De Sanguinis detractione per venas. a*

- 15 **S** ANGUINEM, incisa vena, mitti novum non est: sed nullum pene morbum esse, in quo non mittatur, novum est. Item, mitti junioribus, & scæminis uterum non gerentibus, vetus est. In pueris<sup>b</sup> vero idem  
 20 experiri, & in senioribus, & in gravidis quoque mulieribus, vetus non est. Siquidem antiqui, primam ultimamque ætatem sustinere non posse hoc auxilii genus judicabant; persuaserantque sibi, mulierem  
 25 gravidam, quæ ita curata esset, c abortum esse facturam. Postea vero usus ostendit, nihil ex his esse perpetuum, aliasque potius observationes adhibendas esse, ad quas dirigi curantis consilium debeat. Interest  
 30 enim, non quæ ætas sit, neque quid in corpore intus geratur, sed quæ vires sint. Ergo, si juvenis imbecillus est: aut si mulier, quæ gravida non est, parum valet, male sanguis mittitur, emoritur enim vis, si quæ supererat, hoc

a Actuar. M. M. III. 1. b Actuar. M. M. III. 8.  
 c Aph. v. 31.

hoc modo erepta. At firmus puer, & robustus senex, & gravida mulier valens, tuto sic curantur. Maxime tamen in his medicus imperitus falli potest: quia feminis roboris illis ætatibus subest. Mulierique prægnanti post curationem quoque viribus opus est, non tantum ad se, sed etiam ad partum sustinendum. Non quicquid aut intentionem animi, aut prudentiam exigit, protinus ejiciendum est: cum præcipua in hoc ars sit, quæ non annos numeret, neque conceptionem solam videat, sed vires dæstimet, & ex eo colligat, possit nec ne superesse, quod vel puerum, vel senem, vel in una muliere duo corpora simul sustineat. Interest etiam inter valens corpus, & obesum; inter tenue, & infirmum. Tenuioribus magis sanguis, plenioribus magis caro abundat. Facilius itaque illi detractionem ejusmodi sustinent: celeriusque eâ, qui nimium est pinguis, affligitur. Ideoque vis corporis melius ex venis, quam ex ipsa \* specie æstimatur.

Neque solum hæc consideranda sunt, sed etiam morbi genus quod sit: utrum superans, an deficiens materia læserit: corruptum corpus sit, an integrum. Nam si materia vel deest, vel integra est, istud alienum est. At si vel copia sui male habet, vel corrupta est, nullo modo melius succurritur. Ergo vehemens febris, ubi rubet corpus, plenæque venæ tument, sanguinis detractionem requirit: item viscerum morbi, † nervorumque resolutio, & rigor, & disten-

d Scran. Ephes. Isag. c. 23. \* Cicero in Oratore c. 2. † Patin. ad Celsum pag. 238.



distentio : quicquid denique fauces diffi- 196,  
cultate spiritus strangulat ; quicquid subito 21.  
supprimit vocem ; quisquis intolerabilis  
dolor est ; & quacumque de causa ruptum  
5 aliquid intus atque collisum est : item ma-  
lus corporis habitus ; omnesque acuti mor-  
bi , qui modo , ut supra dixi , non infirmita-  
te , sed onere nocent.

Fieri tamen potest , ut morbus quidem  
10 id desideret , corpus autem vix pati posse  
videatur : sed , si nullum tamen appareat  
aliud auxilium , periturusque sit , qui labo-  
rat , nisi temeraria quoque via fuerit adju-  
tus , in hoc statu boni medici est ostendere,  
15 quam nulla spes sine sanguinis detractione  
sit ; faterique , quantus in hac ipsa re metus  
sit : & tum demum , si exigatur , sanguinem  
mittere. De quo dubitare in eiusmodi re  
non oportet. satius est enim anceps auxi-  
20 lium experiri , quam nullum. Idque maxi-  
me fieri debet , ubi nervi resoluti sunt ; ubi 178,  
subito aliquis obmutuit ; ubi angina e stran- 19, 29.  
gulatur ; ubi prioris febris accessio pene 196,  
confecit , paremque subsequi verisimile est , 21.  
25 neque eam videntur sustinere ægri vires  
posse.

Cum sit autem minime crudo sanguis  
mittendus , tamen ne id quidem perpetuum  
est. neque enim semper concoctionem res  
30 expectat. Ergo , si ex superiore parte aliquis 203,  
decidit , si contusus est , si ex aliquo subito 20.  
casu sanguinem vomit , quamvis paulo ante 204, 9.  
sumpsit cibum , tamen protinus ei demen-  
da materia est , ne , si subsederit , corpus af-  
figat.

fligat. Idemque etiam in aliis casibus re-  
 pentinis, qui strangulabunt, dictum erit.  
 At, si morbi ratio patiatur, tum demum nul-  
 la cruditatis suspitione remanente id fiet.  
 Ideoque ei rei videtur aptissimus adversæ 5  
 valetudinis dies secundus, aut tertius. Sed  
 ut aliquando etiam primo die sanguinem  
 mittere necesse est, sic nunquam utile post  
 diem quartum est, cum jam spatio ipso  
 materia vel exhausta est, vel corpus cor- 10  
 ruptum; ut detractio imbecillum id facere  
 possit, non possit integrum. Quod si vehe-  
 mens febris urget, in ipso impetu ejus san-  
 guinem mittere, hominem jugulare est.  
 expectanda ergo intermissio est: si non de- 15  
 cedit, cum crescere desit: si neque re-  
 missio speratur, tunc quoque, quamvis pe-  
 jor, sola tamen occasio non omittenda est.

Fere etiam ista medicina, ubi necessaria  
 est, in biduum dividenda est. Satius est 20  
 enim, primum levare ægrum, deinde per-  
 purgare, quam simul omni vi effusa fortas-  
 se præcipitare. Quod si in cura quoque  
 aquæ quæ inter cutem est, ita respondet;  
 quanto magis necesse est in sanguine re- 25  
 spondeat?

Mitti vero is debet, si totius corporis  
 causa fit, ex brachio: si partis alicujus, ex  
 ea ipsa parte, aut certe quam proxima; quia  
 non ubique mitti potest, sed in temporibus, 30  
 in brachiis, juxta talos. Neque ignoro,  
 quosdam dicere, quam longissime sangui-  
 nem inde, ubi lædit, esse mittendum; sic  
 enim averti materiæ cursum; at illo modo  
 in

in id ipsum, quod gravatur, evocari. Sed id ipsum falsum est. proximum enim locum primo exhaurit: ex ulterioribus autem eatenus sanguis sequitur, quatenus emittitur: ubi is suppressus est, quia non trahitur, ne venit quidem. Videtur tamen usus ipse docuisse, si caput † fractum est, ex brachio potius sanguinem mittendum esse: si quod in humero \* vitium est, ex altero brachio. 10 credo, quia si quid parum cesserit, opportuniores hæ partes injuriæ sunt, quam quæ jam male habent. Avertitur quoque interdum sanguis, ubi alia parte prorumpens, alia emittitur. desinit enim fluere qua no- 15 lumus, inde objectis quæ prohibeant, alio dato itinere.

Mittere autem sanguinem cum sit expeditissimum, usum habenti; tamen ignato difficillimum est. Juncta enim est vena ar- 20 teriis, his nervi. Ita, si nervum scalpellus attingit, sequetur nervorum g distentio, ea- que hominem crudeliter consumit. At arteria h incisa neque coit, neque sanescit: in- 183, terdum etiam, ut sanguis vehementer 24. 25 erumpat, efficit. Ipsius quoque venæ, si forte præcisa est, capita comprimuntur, neque sanguinem emittunt. At si timide scalpellus demittitur, summam cutem lacerat, neque venam incidit. Nonnunquam 30 etiam ea later, neque facile reperitur. Ita multæ res id difficile incio faciunt, quod perito facillimum est.

Incidenda ad medium vena est. Ex qua cum sanguis erumpit, colorem ejus habi-  
F rumque

† quidam vir. doctus l. *tactum*. \* Aph. vi. 22. De Morb. 111, 32. h Aph. vi. 18. 19. I. de Morb. vii, 21.

289, 7. tumque oportet attendere. Nam si is cras-  
 sus & niger est, vitiosus est; ideoque utili-  
 ter effunditur: † si rubet & pellucet, integer  
 est; eaque missio sanguinis adeo non pro-  
 dest, ut etiam noceat, protinusque is sup- 5  
 primendus est. Sed id evenire non potest  
 sub eo medico, qui scit ex quali corpore  
 sanguis mittendus sit. Illud magis fieri so-  
 let, ut æque niger assidue primo die pro-  
 fluat. quod quamvis ita est, tamen si jam satis 10  
 fluxit, supprimendus est: semperque ante  
 finis faciendus est, quam \* anima deficiat.

Deligandumque brachium superimposi-  
 to expresso ex aqua frigida penicillo; &  
 postero die adverso medio digito vena fri- 15  
 canda, ut recens coitus ejus resolvatur,  
 iterumque sanguinem fundat. Sive autem  
 primo, sive secundo die sanguis, qui cras-  
 sus & niger initio fluxerat, & rubere, &  
 pellucere cœpit, satis materiæ detractum 20  
 est, atque quod superest, sincerum est: ideo-  
 que protinus brachium deligandum, ha-  
 bendumque ita est, donec valens cicatri-  
 cula sit; quæ celerrime in vena confirma-  
 tur. 25

### C A P. X I.

#### *De Sanguinis detractione per Cucurbitulas.*

**C**UCURBITULARUM a vero duo genera 30  
 sunt: æneum, & corneum. Ænea, al-  
 tera parte patet; altera, clausa est.  
 Cornea, altera parte æque patens, altera  
 foramen habet exiguum. In æneum lina-  
 men-

† Casaub. in Athenæ. Animadv. l. 1. c. 20. pag.  
 60. \* Soran. Ephesius Isagog. 1. cap. 22. a Prosp.  
 Alpin. de Medic. Ægypt. 11. 13.

mentum ardens conjicitur , ac si os ejus  
 corpori aptatur , imprimiturque , donec  
 inhæreat. Cornea , per se corpori imponi-  
 tur ; deinde , ubi ea parte , qua exiguum  
 5 foramen est , ore spiritus adductus est , su-  
 perque cera cavum id clausum est , æque  
 inhærescit. Utraque non ex his tantum  
 materiæ generibus , sed etiam ex quolibet  
 alio recte fit. Ac si cætera defecerunt , cali-  
 10 culus quoque aut pultarius , oris compres-  
 sioris , ei rei commode aptatur. Ubi inhæ-  
 sit , si concisa ante scalpello cutis est , san-  
 guinem extrahit : si integra est , spiritum.  
 Ergo ubi materia , quæ intus est , lædit ,  
 15 illo modo : ubi inflatio , hoc imponi solet.

Usus autem cucurbitulæ præcipuus est ,  
 ubi non in toto corpore , sed in parte aliqua  
 vitium est , quam exhauriri ad confirman-  
 dam valetudinem satis est. Idque ipsum re-  
 20 stimonium est , etiam scalpello sanguinem ,  
 ubi membro succurritur , ab ea potissimum  
 parte , quæ jam læsa est , esse mittendum :  
 quod nemo cucurbitulam diversæ parti <sup>233,</sup>  
 imponit , nisi cum profusionem sanguinis <sup>34.</sup>  
 25 eo avertit ; sed ei ipsi , quæ dolet , quæque  
 liberanda est.

Opus esse cucurbitula potest in morbis  
 longis ( quamvis & iis jam spacium aliquod  
 accessit ) sive corrupta materia , sive spiritu  
 30 male habente. In acutis quoque quibus-  
 dam , si & levare corpus debet , & ex vena  
 sanguinem mitti , vires non patiuntur. Id-  
 que auxilium ut minus vehemens , ita ma-  
 gis tutum ; neque unquam periculosum



est, etiamsi in medio febris impetu, etiamsi in cruditate adhibetur. Ideoque ubi sanguinem mitti opus est, si incisa vena præceps periculum est, aut nobili in parte corporis vitium est, etiam huc potius confugiendum est. cum eo tamen, ut sciamus, hic ut nullum periculum, ita levius præsidium esse; nec posse vehementi b malo, nisi æque vehemens auxilium succurrere.

232,  
I.

## C A P. XII.

10

*De Dejectione.*

**D**EJECTIONEM autem antiqui variis medicamentis, crebraque alvi ductione in omnibus fere morbis moriebantur: dabantque aut nigrum veratrum, aut filiculam, aut squamam æris, quam *λεπίδα χαλκοῦ* Græci vocant; aut lactucæ marinæ † lac, cujus gutta pani adjecta abunde purgat; aut lac vel asininum, vel bubulum, vel caprinum, eique salis paulum adjiciebant, decoquebantque id, & sublati his, quæ coierant, quod quasi serum supererat, bibere cogeant.

241,  
25. Sed medicamenta stomachum fere lædunt. Ideoque omnibus cathartici aloë miscenda est. Alvus si vehementius fluit, aut sæpius ducitur, hominem infirmit. Ergo nunquam in adversa valetudine medicamentum ejus rei causa recte datur, nisi ubi is morbus sine febre est. Ut cum veratrum nigrum, aut atra bile vexatis, aut cum a tristitia insanientibus, aut iis, quorum nervi parte aliqua resoluti sunt, datur. At, ubi

87, 13.  
177,  
33.

b De Arte XIII, 16. Erasmi. Adag. *malo nodo*. Chryf. ad Genes. cap. 1. Homil. VI. † Patin. pag. 248. a I. Diat. XXXIII, 10. De Insomn. VI, 5. de victu Acut. LVI.

ubi febres sunt, fatius est ejus rei causa cibos  
 potionesque assumere, qui simul & alant, &  
 ventrem molliant. Suntque valetudinis ge-  
 nera, quibus ex lacte purgatio convenit.

5 2. De Alvi ductione. b

Plerunque vero alvus lotionibus ducen-  
 da est. quod, ab Asclepiade c quoque sic vitu- 29, 7.  
 peratum, ut tamen servatum sit, video ple-  
 runque seculo nostro, præteriri. Est autem  
 10 ea moderatio, quam is secutus videtur,  
 aptissima, ut neque sæpe † medicina tentetur,  
 & tamen semel, vel summum bis, non  
 omittatur, si caput grave est; si oculi cali-  
 gant; si morbus majoris intestini est, quod  
 15 Græci κόλον nominant, si in imo ventre,  
 aut in coxa dolores sunt; si in stomachum  
 quædam biliosa concurrunt, vel etiam  
 pituita eo se, humorve aliquis aquæ simi-  
 lis confert; si spiritus difficilius redditur; si  
 20 nihil per se venter excernit; utique, si juxta  
 quoque stercus est, & intus remanet; aut si  
 stercoris odorem nihil dejiciens æger ex  
 spiritu suo sentit; aut si corruptum est, quod  
 excernitur; aut si prima inedia febrem non  
 25 sustulit; aut si sanguinem mitti, cum opus  
 sit, vires non patiuntur, tempusve ejus rei  
 præterit; aut si multum ante morbum ali-  
 quis potavit; aut si is, qui sæpe, vel sponte,  
 vel casu purgatus est, subito habet alvum  
 30 suppressam. Servanda vero illa sunt, ne  
 ante diem tertium ducatur: ne ulla crudi-  
 tate substantive: ne in corpore infirmo, diu-  
 que in adversa valetudine exhausto: neve  
 in eo, cui satis alvus reddit quotidie, qui-

b Plutarch. de tuend. Valet p. 232. c Plin. xxvi.  
 3. Craton. Consilia Med. ex ed. Scholzii.

ve eam liquidam habet: neve in ipso accés-  
 sionis impetu; quia, quod tum infusum est,  
 alvo continetur, regressumque in caput,  
 multo gravius periculum efficit. Pridie  
 vero abstinere debet æger, ut aptus tali cu- 5  
 rationi sit. Eodem die ante, aliquot horis, a-  
 quam calidam bibere, ut superiores ejus par-  
 tes madescant: tum immittenda in alvum  
 est, si levi medicina contenti sumus, pura  
 aqua; si paulo valentiori, mulsa; si leni, 10  
 aqua, in qua scenum græcum, vel ptisana,  
 vel malva decocta sit: si reprimendi causa, ex  
 † verbenis. Acris autem est marina aqua, vel  
 alia sale adjecto: at utraque decocta com-  
 modior est. Acrior fit, adjecto vel oleo, 15  
 vel nitro, vel melle quoque. Si acrior est,  
 eo plus extrahit, sed minus facile sustine-  
 tur. Id quod infunditur, neque frigidum  
 esse oportet, neque calidum; ne alterutro  
 modo lædat. Cum infusum est, quantum 20  
 fieri potest, continere se in lectulo debet  
 æger nec primæ cupiditati dejectionis pro-  
 tinus cedere: ubi necesse est, tum demum  
 desiderare. Fereque eo modo dempra mate-  
 ria, superioribus partibus levatis, mor- 25  
 bum ipsum mollit. Cum vero, quotiens  
 res coegit, desidendo aliquis se exhaustus,  
 paulisper debet conquiescere; & ne vires  
 deficient, utique eo die cibum assumere.  
 qui plenior, an exiguus sit dandus, ex ra- 30  
 tione ejus accessionis; quæ expectabitur,  
 aut in metu non erit, æstimari oportebit.

## C A P.

† pro quavis herba, sic Plin. xxvi. c. 10. *Saty-  
 rii* nomine quasvis herbas venerem excitantes no-  
 minat.

## C A P. XIII.

*Dé Vomitu. a*

29, 21.

**A**T vomitus, ut in secunda quoque va-  
 letudine sæpe necessarius biliosis est;  
 sic etiam in his morbis, quos bilis  
 concitavit. Ergo omnibus, qui ante febres  
 horrore & tremore vexantur: omnibus, qui  
 cholera laborant: omnibus etiam cum qua-  
 10 dam hilaritate insanientibus; & comitiali 183, 10.  
 quoque morbo oppressis necessarius est.  
 Sed, si acutus morbus est, sicut in cholera;  
 si febris est, inter rigores, asperioribus me-  
 dicamentis opus non est; sicut in dejectio-  
 15 nibus quoque supra dictum est. Satisque 84. 31.  
 est, ea vomitus causa sumi, quæ sanis quo-  
 que sumenda esse proposui. At ubi longi  
 valentesque morbi sine febre sunt, ut comi- 92, 4.  
 tialis aut insania, veratro quoque albo  
 20 utendum est. Id neque hieme, neque æsta-  
 te recte datur: optime, vere: tolerabiliter  
 autumno. Quisquis daturus erit, id agere  
 ante debet, ut accepturi corpus b humidius  
 sit. Illud scire oportet, omne ejusmodi me-  
 25 dicamentum, quod † potui datur, non sem-  
 per ægris prodesse, semper c sanis nocere.

## C A P. XIV.

*De Frictione. a*

30 **D**E frictione vero & gestatione adeo  
 multa Asclepiades, tanquam inventor  
 ejus, b posuit in eo volumine; quod  
 Communium auxiliorum inscripsit, ut,  
 cum trium tantum faceret mentionem,

F 4

hujus

a Hippocrat. T. I. pag. 651. III. De Diæt. IV.  
 b Aph. IV, 13. † Vomitu. c Aph. II, 36. IV, 16.  
 a Oribas. Med. collect. v. 13, 16, 17, 18, &c. b Plin.  
 xxvi, 3. Mercur. de Arte Gymn. 1, 7.

hujus & vini & gestationis, tamen maximam partem in hoc consumpserit. Oportet autem neque recentiores viros in his fraudare, quæ vel reppererunt, vel recte secuti sunt; & tamen ea, quæ apud antiquiores aliquos posita sunt, authoribus suis reddere. Neque dubitari potest, quin latius quidem, & dilucidius, ubi & quomodo frictione utendum esset, Asclepiades præceperit; nihil tamen reperit, quod non à vetustissimo 10  
 348, mo authore Hippocrate paucis verbis com-  
 10. prehensum sit: qui dixit, Frictione, si ve-  
 549, hemens sit, c durari corpus: si lenis, molliri:  
 18. si multa, minui: si modica, impleri. Sequitur ergo, utrum utendum sit, cum aut ad- 15  
 stringendum corpus sit, quod fluens est: aut molliendum, quod induruit: aut dige-  
 rendum in eo, cui copia nocet: aut alendum id, quod tenue & infirmum est.

Quas tamen species, si quis curiosius 20  
 æstimet (quod jam ad medicum non pertinet) facile intelliget, omnes ex una causa pendere, quæ demit. Nam & adstringitur aliquid, eo dempto, quod interpositum, ut id laxaretur, effecerat: & mollitur, eo de- 25  
 tracto, quod duritiem creabat: & impletur, non ipsa frictione, sed eo cibo, qui postea usque ad cutem, digestionem quadam relaxatam, penetrat. Diversarum vero rerum in modo causa est. 30

Inter unctionem autem & frictionem multum interest. Ungi enim, leniterque pertractari corpus, etiam in acutis & recentibus morbis oportet; in remissione tamen,  
 &

c III. Diæt. XLII, 9, 10. Oribas. Synopf. I, 4.  
 Plin. XXVII, 1, 4.



& ante cibum. Longa vero frictione uti, neque in acutis morbis, neque increfcentibus convenit; præterquam cum phreneticis somnus ea quæritur. Amat autem hoc auxilium valetudo longa, & jam à primo impetu inclinata. Neque ignoro, quosdam dicere, omne auxilium necessarium esse increfcentibus morbis, non cum jam per se finiuntur. Quod non ita se habet. Potest enim morbus, etiam qui per se finem habiturus est, citius tamen adhibito auxilio tolli. quod duabus de causis necessarium est: & ut quam primum bona valetudo contingat; & ne morbus, qui remanet, iterum; quamvis levi de causa, exasperetur. Potest enim morbus minus gravis esse, quam fuerit; neque ideo tamen solvi; sed reliquiis quibusdam inhærere, quas admodum aliquod auxilium discutiat.

20 Sed ut, levata quoque adversa valetudine, recte frictio adhibetur; sic nunquam adhibenda est febre increfcente: verum, si fieri poterit, cum ex toto corpus ea vacabit; sin minus, certe cum ea remiserit. Eadem autem modo in totis corporibus esse debet, ut cum infirmus aliquis implendus: modo in partibus; aut quia ipsa ejus membri imbecillitas id requirit, aut quia alterius. Nam & capitis & longos dolores ipsius

30 frictio levat; non in impetu tamen doloris: & membrum aliquod resolutum ipsius frictione confirmatur. Longe tamen sæpius aliud perfricandum est, cum aliud dolet: maximeque cum à summis, aut à mediis

F 5 parti-

partibus corporis evocare materiam volumus; ideoque extremas partes perfricamus. Neque audiendi sunt, qui numero finiunt, quoties aliquis perfricandus sit. Id enim ex viribus hominis colligendam est. Ut si quis perinfirmus est, potest satis esse quinquagies: si robustior, potest ducenties esse faciendum. inter utrumque deinde, prout vires sunt. Quo fit, ut etiam minus sæpe in muliere, quam in viro: minus sæpe in puero, vel sene, quam in juvene, manus dimovendæ sint. Denique, si certa membra perfricantur, multa valentique fricatione opus est. Nam neque totum corpus infirmari cito per partem potest, & opus est quam plurimum materiæ digeri, sive ipsum membrum, sive per id aliud levamus. At, ubi totius corporis imbecillitas hanc curationem per totum id exigit, brevior esse debet & lenior; ut tantummodo summam cutem emolliat, quo facilius capax ex recenti cibo novæ materiæ fiat. In malis jam ægrum esse testatur, e ubi exterior pars corporis friget, interior cum siti calet, ut supra posui. Sed tunc quoque unicum in frictione præsidium est, quæ si calorem evocavit, potest alicui medicinæ locum facere.

## C A P. XV.

*De Gestatione.* a

30

**G**ESTATIO quoque longis & jam inclinatis morbis aptissima est. utilisque est & his corporibus, quæ jam  
ex

e Aph. iv, 48. a Oribas. Coll. Medic. vi, 23.

ex toto febre carent, sed adhuc exerceri per se non possunt; & his, quibus lentæ morborum reliquiæ remanent, neque aliter eliduntur. Asclepiades etiam in recenti  
 5 vehementique, præcipueque ardente febre, ad discutendam eam, gestatione dixit utendum. Sed id periculose fit; meliusque in quiete ejusmodi impetus sustinetur. Si quis tamen <sup>b</sup> experiri volet, sic experiatur, si  
 10 lingua non erit aspera, si nullus tumor, nulla durities, nullus dolor visceribus, aut capiti, aut præcordiis suberit. At ex toto, nunquam gestari corpus dolens debet, sive id in toto, sive in parte est; nisi tamen so-  
 15 lis nervis dolentibus; neque unquam in crescente febre, sed in remissione ejus.

Genera <sup>c</sup> autem gestationis plura sunt: quæ adhibenda sunt & pro viribus cujusque, & pro opibus; ne aut imbecillum ho-  
 20 minem nimis digerant, aut humili desint. Gestationum lenissima est navi, vel in portu, vel in flumine; vel lectica, aut scamno: acrior, vehiculo: vehementior, in alto mari † navi. Atque hæ ipsæ & intendi &  
 25 leniri possunt. Si nihil horum est, suspendi lectus debet, & moveri. Si ne id quidem est, at certe uni pedi lecti fulcimentum subjiciendum est, atque ita lectus huc & illuc manu impellendus. Et levia quidem ge-  
 30 nera exercitationis infirmissimis conveniunt: valentiora vero his, qui jam pluribus diebus febre liberati sunt; aut his, qui gravium morborum initia sic sentiunt, ut adhuc febre vacent (quod & in tabe, & in sto-  
 machi

<sup>b</sup> Oribas. Medic. Coll. vi, 25. <sup>c</sup> Oribas. Medic. Coll. vi, 23. † Gloss.

machi vitiis, & cum aqua cutem subiit, & interdum in morbo regio fit) aut ubi quidam morbi, qualis comitialis, qualis insania est, sine febre, quamvis diu, manent. In quibus affectibus ea quoque genera 5 exercitationum necessaria sunt, quæ comprehendimus eo loco †, quo, quemadmodum sani, neque firmi homines se gerere debent, præcepimus.

## C A P. XVI.

10

*De Abstinencia. a*

**A**BSTINENTIÆ vero duo genera sunt. Alterum, ubi nihil assumit æger: alterum, ubi non nisi quod oportet. 15 Initia morborum primum \* famem, sitimque desiderant: ipsi deinde morbi, moderationem, ut neque aliud quam expedit, neque ejus ipsius nimium sumatur. neque enim convenit juxta inediam protinus 20 satietatem esse. Quod si sanis quoque corporibus inutile est, ubi aliqua necessitas famem fecit; quanto inutilius est infirmo, nedum ægro? Neque ulla res b magis adjuvat laborantem, quam tempeſtiva abſtinentia. 25 Intemperantes homines apud nos, sibi cibi tempora, modum curantibus dant. Rurſus alii, tempora medicis pro dono remittunt, sibi ipsis modum vendicant. Liberaliter agere se credunt, qui cætera illorum 30 arbitrio relinquunt, in genere cibi liberi sunt, quasi quærat, quid medico liceat, non quid ægro ſalutare ſit. Cui vehementer nocet, quoties in ejus, quod assumitur, vel

† Lib. 1. c. 1, 2. a Soran. Ephes. Ifag. cap. x. Hipp. de Vet. M. T. xv. n. 10. b Plin. xxvi 11, 4.

Cap. 17.      M E D I C I N A.      93  
vel tempore , vel modo , vel genere peccatur.

C A P. XVII.

*De Sudore.*

5  
**S**UDOR duobus modis elicitur : aut sicco calore, aut balneo. Siccus calor est, & arenæ calidæ, a & laconici, & clibani, & quarundam naturalium sudationum, ubi  
10 à terra profusus calidus vapor ædificio includitur, sicut super b Batas in murtetis habemus. Præter hæc, sole quoque, & exercitatione is movetur. Utiliaque hæc genera sunt, quoties humor intus nocet, isque di-  
15 gerendus est. Ac nervorum quoque quædam vitia sic optime curantur. Et cætera infirmis possunt convenire : Sol, & exercitatio tantum robustioribus ; qui tamen sine febre, vel initio morbi, vel etiam non  
20 gravibus morbis tenentur. Cavendum autem est, ne quid horum vel in c febre, vel in cruditate tentetur.

At balnei duplex usus est. Nam modo, discussis febribus, initium cibi plenioris,  
25 vini que firmioris, valetudini facit ; modo febrem ipsam tollit. Fereque adhibetur, ubi summam cutem relaxari, evocari que corruptum humorem, & habitum corporis mutari expedit. Antiqui timidius eo ute-  
30 bantur : Asclepiades d audacius. Neque terere autem ea res, si tempestitiva est, debet ; at ante tempus nocet. Quisquis febre liberatus est, simulatque ea uno die non accessit, eo, qui proximus est post tempus accessio-

a Aetius Tetr. I. Serm. III, 9. b Alii *Baias*, Horat. Epist. xv, l. 1. Ovid. de A. A. l. I. Cassiodor. Var. l. ix, 6. c I. de Morb. Mul. LVIII. 14. d Plin. xxvi, 3.



cessionis, tuto lavari potest. At si circuitum habere ea febris solita est, sic ut tertio, quartove die revertatur, quodocunque non accessit, balneum tutum est. Manentibus vero adhuc febribus, si hæ sunt lentæ, 5 lienesque jamdiu male habent, recte medicina ista tentatur: cum eo tamen, ne præcordia dura sint, neve ea tumeant, neve lingua aspera sit, neve aut in medio corpore, aut in capite dolor ullus sit, neve tum 10 febris increseat. Et in his quidem febribus, quæ certum circuitum habent, duo balnei tempora sunt; alterum, ante horrorem; alterum, febre finita. In his vero, qui lentis — febriculis diu detinentur, cum aut ex to- 15 to recessit accessio; aut si id non solet, certe lenita est, jamque corpus tam integrum est, quam maxime esse in eo genere valetudinis solet.

Imbecillus homo, iturus in balneum, 20 vitare debet, ne ante frigus aliquod experiatur: ubi in balneum venit, paulisper resistere, experiri que, num tempora adstringantur, & an sudor aliquis oriatur: illud si incidit, hoc non secutum est, inutile eo 25 die balneum est: & perungendus est is leniter, & referendus, vitandumque omnimodo frigus, & abstinentia utendum. At si temporibus integris, primum ibi, deinde alibi sudor incipit, fovendum os aqua 30 calida; tum in folio desidendum est; atque ibi quoque videndum, num sub primo contractu aquæ calidæ summa cutis inhorrescat, quod vix tamen fieri potest, si priora recte

recte accesserunt : certum autem id signum inutilis balnei est.

Ante vero , quam in aquam calidam se demittat , an postea aliquis perungi debeat ,  
 5 ex ratione valetudinis suæ cognoscat. Fere tamen ( nisi ubi nominatim , ut postea fiat , id præcipietur ) moto sudore e leniter corpus perungendum ; deinde in aquam calidam demittendum est. Atque hic quoque  
 10 habenda virium ratio est ; neque committendum , ut per æstum anima deficiat ; sed maturius is auferendus , curiosèque vestimentis involvendus est , ut ne ad eum frigus aspiret : & ibi quoque , antequam ali-  
 15 quid assumat , insudet.

Fomenta quoque calida sunt , milium , sal , arena : quodlibet eorum calefactum , & in linteum coniectum ; etiam solum linteum , si minore vi opus est : at si majore ,  
 20 extincti titiones , involutique panniculis , & sic circumdati. Quinetiam calido oleo replentur f utriculi : & in vasa fictilia ( quas à similitudine lenticulas vocant ) aqua con-  
 25 jicitur ; & sal sacco lineo excipitur , demittiturque in aquam bene calidam , tum super id membrum , quod fovendum est , collocatur. Juxtaque ignem , ferramenta duo ignita sunt , capitibus paulo latioribus : alterum ex his demittitur in siccum salem , & aqua  
 30 super leviter aspergitur ; ubi frigere cœpit , ad ignem refertur : idem & in altero fit ; deinde invicem in utroque : intereaque descendit salsus & calidus succus , qui contractis aliquo morbo nervis opitulatur. His  
 omni-

e I. De Morb. Mul. LVIII, 13. f Diogen. Laert. l. v. vit. Aristot. pag. 117. ed. Lond. Valeriola observ. 1. observ. LI. in uxore partu difficili laborante.

omnibus commune est, digerere id, quod vel præcordia onerat, vel fauces strangulat, vel in aliquo membro nocet. Quando autem quoque urendum sit, in ipsis morborum generibus dicitur. 5

## C A P. XVIII.

*Qui cibi, potionesve, aut valentis, aut medicæ, aut imbecillæ materiæ sint.*

CUM de his dictum sit, quæ detrahendo juvant: ad ea veniendum est, quæ nos alunt, id est cibum, & potionem. Hæc autem non omnium tantum morborum, sed etiam secundæ valetudinis communia præsidia sunt. Pertinetque ad rem, 15 omnium proprietates nosse: primum, ut fani sciant, quomodo his utantur: deinde, 49, 4. 17, 30. ut exsequentibus nobis morborum curatio- 18, 12. nes, liceat species rerum, quæ assumendæ necessario erunt, subjicere: neque necesse 20 sit subinde singulas eas nominare.

Scire igitur oportet, omnia legumina, quæque ex frumentis panificia sunt, generis valentissimi esse (valentissimum voco, in quo plurimum alimenti est:) item omne 25 animal quadrupes domi natum; omnem grandem feram, quales sunt caprea, cervus, aper, onager; omnem grandem avem, quales sunt anser, & pavo, & grus; omnes belluas marinas, ex quibus cetus est, quæque 30 his pares sunt: item mel, & caseum. Quominus mirum est, opus pistorium valentissimum esse, quod ex frumento, adipe melle, caseo a constat. In mediâ vero ma-  
teria-

teria numerari ex oleribus debere ea, quorum radices, vel bulbos assumimus: ex quadrupedibus, leporem: aves omnes à minimis ad phœnicopterum: item pisces omnes, qui salem non patiuntur, solidive saliantur. Imbecillissimam vero materiam esse, omne olus, & quicquid in cauliculo \* nascitur, qualis est cucurbita, & cucumis, & capparitis, omnia † poma, oleas, cochleas, 10 itemque conchylia.

Sed quamvis hæc ita discreta sint, tamen etiam, quæ sub eadem specie sunt, magna discrimina recipiunt; aliaque res alia vel valentior est, vel infirmior. Siquidem plus 15 alimenti est in pane, quam in ullo alio. Firmius est <sup>b</sup> triticum, quam milium: id ipsum, quam hordeum: & ex tritico firmissima sili-go; deinde simila; deinde cui nihil ademptum est, quod <sup>c</sup> αὐτόπυρον Græci vocant: in- 20 firmior est, ex polline: infirmissimus, cibarius panis. Ex leguminibus vero valentior faba, vel lenticula, quam pisum. Ex <sup>d</sup> oleribus valentior rapa, napique, & omnes bulbi (in quibus cepam quoque, & allium numero) 25 quam pastinaca, vel quæ specialiter radice appellatur. Item firmior brassica, & beta, & porrum, quam lactuca, vel cucurbita, vel asparagus. At ex fructibus surculorum valentiores uvæ, ficus, nuces, palmu- 30 læ, quæque poma proprie nominantur. Atque ex his ipsis firmiora, quæ succosa, quam quæ fragilia sunt. Item ex his <sup>e</sup> avibus, quæ in media specie sunt, valentiores cæ, quæ pedibus, quam quæ volatu magis

G nitun-

\* Patin. p. 282, 283. & 287. † id. ibid. b II. De Diet. x, 1. Athen. Deipn. III. 30. p. 115. c Ath. Deipn. III. c. 28. d II. Diet. xxiv. e II. Diet. xvii.

nituntur: & ex his, quæ volatu fidunt, firmiores sunt grandiores aves, quam minutæ, ut ficedula & turdus. Atque eæ quoque, quæ in aqua degunt, leviozem cibum præstant, quam quæ natandi scientiam non 5 habent. Inter domesticas vero quadrupedes, levissima suilla est; gravissima, bubula. Itemque ex feris, quo majus quodque animal, eo robustior ex eo cibus est. f Pisciumque eorum, qui ex media materia 10 sunt, quamvis maxime utimur, tamen gravissimi sunt: tum ex quibus salsamenta quoque fieri possunt, qualis lacertus est; deinde hi, qui, quamvis teneriores, tamen 15 duri sunt, ut aurata, corvus, sparus, oculata; tum plani: post quos etiam leviores sunt, lupi, mullique; & post hos, omnes saxatiles.

Neque vero in generibus rerum tantummodo discrimen est, sed etiam in ipsis: 20 quod & ætate fit, & membro, & solo, & cælo, & habitu. Nam quadrupes vel omne animal si lactens est, minus alimenti præstat: itemque quo tenerior pullus cohortalis est. In piscibus quoque media ætas, quæ 25 que nondum summam magnitudinem implevit. Deinde ex eodem sue, unguæ, rostrum, aures, cerebellum. Ex agno, hædoque, cum petiolis totum g caput aliquanto, quam cætera membra, leviora sunt; adeo 30 ut in media materia poni possint. Ex avibus, colla, alæve recte infirmissimis annumerantur. Quod ad solum vero pertinet, frumentum quoque valentius est collinum, quam



quam campestre. Levior h piscis inter saxa editus, quam in arena; levior in arena, quam in limo. Quo fit, ut ex stagno, vel lacu, vel i flumine eadem genera graviora sint. Leviorque, qui in alto, quam qui in vado vivit. Omne etiam ferum k animal domestico levius; & quodcumque humido cœlo, quam quod sicco natum est. Deinde eadem omnia pingua, quam macra; re-  
 10 centia, quam salsa; nova, quam vetusta, plus alimenti habent. Tum res eadem magis alit jurulenta, quam assa; magis assa, quam frixa. Ovum durum valentissimæ materiæ est; molle, vel sorbibile, imbecillif-  
 15 simæ. Cumque panificia omnia firmissima sint, elora tamen quædam genera frumenti, ut alica, oryza, prifana, vel ex iisdem facta sorbitio, vel pulticula, & aqua quoque madens panis, imbecillissimis annumerari po-  
 20 test.

Ex potionibus vero, quæcunque ex frumento facta est, itemque lac, mulsum, defrutum, passum, vinum aut dulce, aut vehemens, aut mustum, aut magnæ vetustatis,  
 25 valentissimi generis est. At acerum, & id vinum quod † paucorum annorum, vel austerrum, vel pingue est, in media materia est. ideoque infirmis nunquam ejus generis dari debet. Aqua omnium imbecillissima est. Fir-  
 30 miorque ex frumento potio est, quo firmitus fuit ipsum frumentum: firmior ex eo vino, quod bono solo, quam quod tenui; quodque temperato cœlo, quam quod aut nimis humido, aut nimis sicco, nimiumque aut frigido,  
 G 2 aut

h II. Diæt. xlix. 9. Athenæus Deipn. vii, c. 15.  
 i II. Diæt. xix, 1. k II. Diæt. xx. † Patin. p. 299.

aut calido natum est. Mulsu, quo plus mel-  
 lis habet; defrutu, quo magis decoctum;  
 passu, quo ex sicciore uva est, eo valen-  
 tius est. † Aqua levissima<sup>1</sup> pluvialis est; de-  
 inde fontana, tum ex flumine, tum ex pu-  
 teo; posthæc ex nive, aut glacie; gravior  
 his, ex lacu; gravissima, ex palude. Facilis  
 etiam, & necessaria cognitio est naturam  
 ejus requirentibus. Nam levis, pondere ap-  
 paret; & ex his, quæ pondere pares sunt, 10  
 eo melior quæque est, quo celerius \* & cale-  
 fit & frigescit; quoque celerius ex ea legu-  
 mina percoquantur.

Fere vero sequitur, ut, quo valentior  
 quæque materia est, eo minus facile con- 15  
 coquatur; sed si concocta est, plus astat. Ita-  
 que utendum est materiæ genere pro viri-  
 bus; modusque omnibus pro genere su-  
 mendus. Ergo imbecillis hominibus, rebus  
 infirmis opus est: mediocriter firmos, 20  
 media materia optime sustinet: & robustis  
 apta validissima est. Plus deinde aliquis as-  
 sumere ex levioribus potest: in his magis,  
 quæ valentissima sunt, temperare sibi debet.

## C A P. XIX.

25

*Quæ natura ac proprietas cujusque rei  
 sit, qua vefcimus.*

**N**EQUE hæc sola discrimina sunt; sed  
 etiam aliæ res boni succi, aliæ mali 30  
 sunt; quæ εὐχυμα, & κακόχυμα Græ-  
 ci vocant: aliæ lenes, aliæ acres: aliæ  
 crassio rem pituitam in nobis faciunt, aliæ  
 tenuiorem: aliæ idoneæ sunt stomacho,  
 aliæ

† Aquæ bonæ malæve signa enumerantur a Ca-  
 saubono in *Athenæum Animadv.* L. II. c. 7. † Pal-  
 lad. R. R. I. 17. Colum. de R. R. I. 5. \* Aph. v. 26.

aliæ alienæ: Itemque aliæ inflant, aliæ ab hoc absunt: aliæ calefaciunt, aliæ refrigerant: aliæ facile in stomacho acefcunt, aliæ non facile intus corrumpuntur: aliæ movent alvum, aliæ supprimunt: aliæ citant urinam, aliæ tardant: quædam somnum movent, quædam sensus excitant. Quæ omnia ideo noscenda sunt, quoniam aliud alii, vel corpori, vel valetudini, convenit.

10                      C A P. XX.

*De his, quæ boni succi sunt.*

**B** O N I succi sunt, triticum, filigo, alica, oryza, amyllum, tragum, prifana, a lac, caseus mollis, omnis venatio, omnes aves, quæ ex media materia sunt: ex majoribus quoque hæ, quas supra nominavimus: medii inter teneros durosque pisces, ut mullus, & lupus: olera, lactuca, urtica, malva, cucumis, cucurbita, portulæa, cochleæ, palmulæ: ex pomis quodcumque neque acerbum, neque acidum est: vinum dulce, vel lene, passum, defrutum, oleæ, quæve ex his duobus in alterutro servatæ sunt: † vulvæ, rostra, \* trunculique suum, omnis pinguis caro, omnis glutinosa, omne jecur, ovum sorbile.

C A P. XXI.

30                      *De his, quæ mali succi sunt.*

**M** A L I vero succi sunt, milium, panicum, hordeum, legumina, caro domestica permacra, omnisque caro falsa, omne a falsamentum, garum, vetus caseus,

a Varro R. R. II. 11. † Plin. Ep. I. 1. Ep. 15.  
\* in Tyron. notis occurrit vox Trunculus pag. 167.  
a Athen. Deipn. III. c. 31. pag. 116.

seus, sifer, radícula, rapa; napi, bulbi, brassica, magisque etiam cyma ejus, asparagus, beta, cucumis, porrum, eruca, nasturtium, thymum, nepeta, satureia, hyssopum, ruta, anethum, feniculum, cuminum, anisum, lapa: hum, sinapi, allium, cepa, lienes, renes, intestina, pomum quodcumque acidum vel acerbum est, acetum, omnia acria, acida, acerba, oleum, \* pisces quoque saxatiles, omnesque, qui ex tenerri-  
mo genere sunt, aut hi, qui rursus nimium duri virosique sunt, ut fere quos stagna, lacus, limosive rivi ferunt, quive in nimiam magnitudinem excesserunt.

## C A P. XXII.

15

*Quæ res lenes, quæve acres sint.*

**L**ENES autem sunt, sorbitio, pulticula, laganum, amyllum, pitana, pinguis caro, & quæcunque glutinosa est: quod  
fere quidem in omni, quæ domestica, fit, præcipue tamen in unguis, trunculisque suum, in petiolis capitulisque hœdorum & vitulorum & agnorum, omnibusque cerebellis. Item lac, & quæ proprie dulcia nominantur, defrutum, passum; nuclei pinei. Acria sunt, omnia nimis austera, omnia acida, omnia salsa; & mel quidem, quo melius est, eo magis. Item allium, cepa, eruca, ruta, nasturtium, cucumis, beta, brassica, asparagus, sinapi, radícula, intubus, ocimum, lactuca, maximaque olerum pars.

C A P.

\* Refutat Celsum Nonn. de Re Cibar. l. 3. c. 13. p. 319.

## C A P. XXIII.

*De his, quæ crassiores, quæve tenuiores  
pituitam faciunt.*

5 **C**RASSIOREM autem pituitam faciunt,  
ova sorbilia, alica, oryza, amyllum,  
ptisana, lac, bulbi, omniaque fere  
glutinosa. Extenuant eandem, omnia sal-  
sa, atque, acria, & acida.

10

## C A P. XXIV.

*De his, quæ stomacho idonea sunt.*

**S**TOMACHO autem apta sunt, quæcunque  
15 **S**austera sunt, & quæ acida, quæque con-  
tracta sale modico sunt. Item panis sine  
fermento, & elota alica, vel oryza, vel pi-  
sana; omnis avis, omnis venatio; atque  
utraque vel assa, vel elixa: ex domesticis  
animalibus bubula: si quid ex cæteris sumi-  
20 tur, macrum potius, quam pingue: ex suc-  
culis, rostra, aures, vulvæque steriles:  
ex oleribus, intuba, lactuca, pastinaca, cu-  
cubita elixa, fiser: ex pomis, cerasum,  
morum, sorbum, pirum fragile, quale cru-  
25 stiumum vel nævianum est: item pira,  
quæ ponuntur, Tarentina, atque Signina;  
malum orbiculatum, aut Scandianum, vel  
Amerinum, vel cotoneum, vel Punicum,  
apsinthium, murices, purpuræ, cochleæ,  
30 uvæ ex olla, molle ovum, palmulæ, nuclei  
pinei, a oleæ albæ ex b dura muria, eadem ace-  
to intinctæ, vel nigræ, quæ in arbore bene  
permaturuerunt, vel quæ in passo, defruto-  
ve versatæ sunt: vinum austerum, licet

G 4

jam

a Mercurial. Var. Lect. 1, 3. b Mercurial. Var.  
Lect. 11, 26. sed refutatur a L. Nonnio de Re Cibar.  
l. 3. c. 45. pag. 421.



jam asperum fit, item refinatum: duri ex media materia pisces, ostrea, pectines, murices, purpuræ, cochleæ: cibi, potionefque frigidæ, vel fervidæ.

## C A P. XXV.

*Quæ res alienæ stomacho sint.*

**A**L I E N A vero stomacho sunt, omnia tepida, omnia salsa, omnia jurulenta, omnia<sup>a</sup> prædulcia, omnia pingua, 10 sorbitio, panis fermentatus, idemque vel ex milio, vel ex hordeo, oleum, radices olerum, & quodcunque olus ex oleo garove estur, mel, mulsu, defrutu, passu, lac, omnis caseus, uva recens, ficus & viridis 15 & arida, legumina omnia, quæque inflare consueverunt: item thymu, nepeta, satureia, hyssopu, nasturtiu, lapathu, lampfana, juglandes. Ex his autem intelligi potest, non, quicquid boni succi est, pro- 20 tinus stomacho convenire; neque quicquid stomacho convenit, protinus boni succi esse.

## C A P. XXVI.

*De his, quæ inflant.*

25

**I**N F L A N T autem, omnia fere legumina, omnia pingua, omnia prædulcia, omnia jurulenta, mustu, atque etiam id vinu, cui nihil adhuc ætatis accessit: ex 30 oleribus, alliu, cepa, brassica, omnesque radices, excepto sisere & pastinaca, bulbi, ficus etiam aridæ, sed magis virides, uvæ recentes, nuces omnes, exceptis nucleis pineis,

<sup>a</sup> Calvis. apud Charif. Sosip. Instit. Gram. l. 1.

pincis, lac, omnisque<sup>b</sup> caseus, quicquid denique subcrudum aliquis assumpfit.

*De his, quæ minime inflant.*

Minima inflatio fit ex venatione, aucupio, piscibus, pomis, oleis, conchiliis, ovis vel mollibus vel sorbilibus, vino vetere. Feniculum vero, & anethum, inflationes etiam levant.

C A P. XXVII.

10 *De his, quæ calefaciunt, aut refrigerant.* p. 31.

**A**T calefaciunt, piper, sal, caro omnis jurulenta, allium, cepa, ficus arida, falsamentum, vinum, & quo meracius  
15 est, eo magis.

Refrigerant, olera, quorum crudi caules assumuntur, ut intubus, & lactuca: itemque coriandrum, cucumis, elixa cucurbita, beta, mora, cerasa, mala austera, pira  
20 fragilia, caro elixa, præcipueque acerum, sive cibus ex eo, sive potio assumitur.

C A P. XXVIII.

*De his, quæ intus facile corrumpuntur.*

25 **F**A C I L E autem intus corrumpuntur, panis fermentatus, & quisquis alius quam ex tritico est, & omne pistorium opus, lac, mel; itemque lactentia atque teneri pisces, ostrea, olera, caseus & recens & vetus,  
30 crassa vel tenera caro, vinum dulce, mulsum, defrutum, passum; quicquid denique vel jurulentum est, vel nimis dulce, vel nimis tenue.

G 5

De

b De Viſt. Acut. LIX, 5.

*De his , quæ intus minime vitiantur.*

At minime intus vitiantur , panis sine fermento , aves , & eæ potius duriores , duri pisces , neque solum aurata puta , aut scarus , sed etiam lolligo , locusta , polypus : 5 item bubula , omnisque dura caro ; eademque aptior est , si macra , si salsa est ; omniaque salsamenta : cochleæ , murices , purpuræ : vinum austerum , vel resinatam.

## C A P. XXIX.

10

*De his , quæ alvum movent.*

32, 9.

**A**T alvum movent , panis fermentatus , magisque si a cibarius vel hordeaceus est ; brassica , si subcæda est , lactuca , anethum , nasturtium , ocimum , 15 urtica , portulaca , radicola , capparitis , allium , cepa , malva , lapathum , beta , asparagus , cucurbita , cerasa , mora , poma omnia miria , ficus etiam arida , sed magis viridis , uvæ 20 recentes pingues , minutæ aves , cochleæ , garum , salsamentum , ostrea , pelorides , echini , musculi , & omnes fere conchulæ , maximeque jus earum ; saxatiles , & omnes teneri pisces , sepiarum atramentum ; si 25 qua caro assumitur pinguis , eadem vel jurulenta , vel elixa ; aves , quæ natant ; mel crudum , lac , lactentia omnia , mullum , vinum dulce vel salsum , aqua , omnia tenera , tepida , b dulcia , pingua , elixa , jurulenta , 30 salsa , diluta.

## C A P.

a Victor. Variar. Lect. I. 22. b Athen. Deipn. III. 33.

## C A P. XXV.

*De his, quæ alvum adstringunt.*

32, 9.

**C**ONTRA adstringunt, panis ex filigine,  
 5 vel ex simila; magis, si sine fermento  
 est; magis etiam si tostus est; in-  
 tenditurque vis ejus etiam, si bis coquitur:  
 pulticula vel ex alica, vel ex panico, vel ex  
 milio; itemque ex iisdem sorbitio; & ma-  
 10 gis, si hæc ante fricta sunt: lenticula cui vel  
 beta, vel intubus, vel ambubeia, vel plan-  
 tago adjecta est; magisque etiam, si illa  
 ante fricta est: per se etiam intubus, vel ex  
 plantagine, vel \* ambubeia fricta; minuta  
 15 olera, brassica bis decocta; dura ova; magis-  
 que si assa sunt: minutæ aves, merula, pa-  
 lumbes; magisque, si in posca decocta est:  
 grus, omnesque aves, quæ magis currunt,  
 quam volant; lepus, caprea; jecur ex his,  
 20 quæ sebum habent, maximeque hubulum,  
 ac sebum ipsum: a caseus, qui vehementior  
 vetustate fit, vel ea mutatione, quam in eo  
 transmarino videmus; aut si recens est, ex  
 melle, mulsove decoctus: item mel co-  
 25 ctum, pira immatura, sorba, magisque ea,  
 quæ torminalia vocantur, mala cotonea,  
 & punica, oleæ vel albæ vel præmaturæ,  
 myrta, palmulæ, purpuræ, murices, vinum  
 resinatum vel asperum, item meracum,  
 30 acetum, mulsum quod inferbuit, as-  
 perum item defrutum, passum, aqua vel  
 tepida vel præfrigida, dura, id est, ea quæ  
 tarde † putescit, ideoque pluviatilis potissi-  
 mum, omnia dura, macra, austerâ, aspe-  
 ra,

\* Salm. Exerc. Plin. pag. 583. a F. ed. Ultraj.  
 a De Vict. Acut. 418, 5. † l. putrescit.

108 A. CORN. CELSI Lib. 2.  
ra, tosta, & in eadem carne, assa potius,  
quam elixa.

C A P. XXXI.

*De his, quæ urinam movent.*

**U**RINAM autem movent, quæcunque  
in horto nascentia boni odoris sunt,  
ut apium, ruta, anethum, ocimum,  
mentha, hyssopum, anisum, coriandrum,  
nasturtium, cruca, feniculum. præter hæc, 10  
asparagus, capparitis, nepeta, thymum, satureia,  
lampsana, pastinaca, magisque agre-  
stis, radícula, fiser, cepa. Ex venatione,  
maxime lepus, vinum tenue, piper & ro-  
tundum & longum, sinapi, apsinthium, 15  
nuclei pinci.

C A P. XXXII.

*De his, quæ ad somnum apta sunt.*

**S**OMNO vero aptum est papaver, lactu- 20  
ca, maximeque æstiva, cujus caulicu-  
lus jam lacte repletus est, morum, por-  
rum.

*De his, quæ sensum excitant.*

Sensus vero excitant, nepeta, thymum, 25  
satureia, hyssopum, præcipueque pule-  
gium, ruta, & cepa.

C A P. XXXIII.

*De his, quæ materiam evocant.*

**E**VOCARE vero materiam multa admo- 30  
dum possunt: sed ea, cum ex peregri-  
nis medicamentis maxime constent,  
aliisque magis, quam quibus ratione victus  
succur-



succurritur, opitulentur, in præsentia differam: ponam vero ea, quæ prompta, & his morbis, de quibus protinus dicturus sum, apta, corpus erodunt, & sic ex eo, 5 quidquid mali est, extrahunt. Habent autem hanc facultatem, semina crucæ, nasturtii, radiculae; præcipue tamen omnium, sinapis. Salis quoque & fici eadem vis est.

10 *De his, quæ reprimunt.*

Leniter vero simul & reprimunt & molliunt, lana succida, ex aceto vel vino, cui oleum adjectum est; contritæ palmulae, 15 furfures in salsa aqua vel aceto decocti.

At simul reprimunt & refrigerant, herba muralis (parthenium vel perdicium appellant) serpillum, pulegium, ocimum, herba sanguinalis (quam Græci πολύγονον vocant) portulaca, papaveris folia, capreo-

20 lique vitium, coriandri folia, hyoscyamum, muscus, fiser, apium, solanum (quam σρόχνον Græci vocant) brassicæ folia, intubus, plantago, feniculi semen, contrita pira vel mala, præcipueque coronea, lenti-

25 cula, aqua frigida, maximeque pluviatilis, 290, vinum, acetum, & ex horum aliquo ma- 18. dens vel panis, vel farina, vel spongia, vel 204, lacinia, vel lana succida, vel etiam liuteo- 15. lum, creta cimolia, gypsum, melinum,

30 myrteum, a rosa, acerbum oleum, verbena- rum contusa cum teneris caulibus folia; cujus generis sunt olea, cupressus, myrtus, lentiscus, tamarix, ligustrum, rosa, rubus, laurus, hedera, punicum malum.

Sine

Sine frigore autem reprimunt, cocta cotonea, malicorium, aqua calida, in qua verbenæ coctæ sunt, quas supra proposui, pulvis vel ex fece vini, vel ex myrti foliis, amaræ nuces. 5

31, 20.  
105,  
11.

*De his, quæ calefaciunt.*

Calefacit vero, ex qualibet farina cataplasma, sive ex tritici, sive ex farris, sive hordei, sive ervi, vel lolii, vel milii, vel panici, vel lenticulæ, vel fabæ, vel lupini, 10 vel lini, vel fœni græci, ubi ea deferbuit, calidaque imposita est. Valentior tamen ad id omnis farina est ex mulso, quam ex aqua cocta. Præterea cyprinum, irinum, medulla, adeps ex fele juncta oleo, magisque, si vetus est, sal, nitrum, git, piper. 15 quinque folium.

*De his, quæ durant, aut emolliunt.*

Fereque, quæ vehementer & reprimunt & refrigerant, durant: quæ autem calefaciunt & digerunt, ea emolliunt: præcipueque ad emolliendum potest cataplasma ex lini vel fœni græci semine. 20

His autem omnibus, & simplicibus, & permixtis, varie medici utuntur; ut magis, 25 quid quisque persuaserit sibi, appareat, quam quid evidenter compererit.

## LIBER TERTIUS.

## CAP. I.

5 *De morborum generibus.*

**P**RÆVISIS omnibus, quæ per-  
 10 tinent ad universa genera mor-  
 borum, ad singulorum curatio-  
 nes veniam. Hos autem in duas  
 species Græci diviserunt; aliosque ex his  
 acutos, alios longos esse dixerunt. Ideo-  
 que, quoniam non semper eodem modo  
 respondebant, eosdem alii inter acutos, alii  
 15 inter longos retulerunt. Ex quo, plura eo-  
 rum genera esse, manifestum est. Quidam  
 enim breves acutique sunt, qui cito vel tol-  
 lunt hominem, vel ipsi cito finiuntur. Qui-  
 dam longi, sub quibus neque sanitas in pro-  
 20 pinquo, neque exitium est. Tertiumque  
 genus eorum est, qui modo acuti, modo  
 longi sunt. idque non in febribus tantum-  
 modo, in quibus frequentissimum est; sed  
 in aliis quoque fit. Atque etiam, præter hos,  
 25 quartum est; quod neque acutum dici po-  
 test, quia non perimit; neque utique lon-  
 gum, quia, si occurritur, facile sanatur.  
 Ego, cum de singulis dicam, cujus quisque  
 generis sit, indicabo.  
 30 Dividam autem omnes in eos, qui in to-  
 tis corporibus consistere videntur, & eos,  
 qui oriuntur in partibus. Incipiam à prio-  
 ribus, pauca de omnibus præfatus. In nul-  
 405,  
 lo quidem morbo plus fortuna sibi vendi- 16.  
 care

care quam ars: ars, quam natura, potest: utpote cum, repugnante a natura, nihil medicina proficiat. Magis tamen ignoscendum medico est parum proficienti in acutis morbis, quam in longis. Hic enim breves spacium est, intra quod, si quod auxilium non profuit, æger extinguitur: ibi & deliberationi, & mutationi remediorum tempus patet; adeo ut raro, si inter initia medicus accessit, obsequens æger sine illius IO vitio pereat. Longus tamen morbus cum penitus insedit, quod ad difficultatem pertinet, acuto par est. Et acutus quidem, quo vetustior est; longus autem, quo recentior, eo facilius curatur. 15

18, 13. Alterum illud ignorari non oportet, quod non omnibus ægris eadem auxilia conveniunt. Ex quo incidit, ut alia atque alia summi authores, quasi sola, venditaverint, prout cuique cesserant. Opor-20 tet itaque, ubi aliquid non respondet, non tanti putare authorem, quanti ægrum, & experiri \* aliud atque aliud. Sic tamen, ut in acutis morbis cito mutetur, quod nihil prodest: in longis, quos tempus, ut facit, sic 25 etiam solvit, non b statim condemnerur, si quid non statim profuit: minus vero removeatur, si quid paulum saltem juvat; quia profectus tempore expletur.

30

## C A P.

a Hippocrat. Lex. T. II. 10. Seneca de Tranq. An. c. vi. † Hipp. de A. T. xx. 6. \* Philo Judæus de Josepho pag. 531. ed. 1631. b Coel. Aurelian. Tard. pass. IV, 3. pag. 454.

## CAP. II.

*Quomodo morbi cognoscantur, & an increſcant, an minuantur, & qua ratione ab initio, qui languere incipit, curari debeat.*

**P**ROTINUS autem inter initia ſcire facile eſt, quis acutus morbus, quis longus ſit: non in his ſolum, in quibus ſemper ita ſe habet; ſed in his quoque, in quibus variat. Nam ubi ſine intermiſſionibus acceſſiones & dolores graves urgent, acutus morbus eſt. Ubi lenti dolores, lentæve febres ſunt, & ſpatia inter acceſſiones porriguntur, acceduntque ea ſigna, quæ in priore a volumine expoſita ſunt, longum hunc futurum eſſe, manifeſtum eſt.

Videndum etiam eſt, morbus an increſcat, an conſiſtat, an minuatur: quia quædam remedia increſcentibus morbis, plura inclinatis conveniunt. Eaque, quæ creſcentibus apta ſunt, ubi acutus increſcens urget, in remiſſionibus potius experienda ſunt. Increſcit autem morbus, dum graviores dolores, acceſſionesque veniunt; hæque & ante, quam proximæ, revertuntur, & poſtea deſinunt. Atque in longis quoque morbis, etiam tales notas non habentibus, ſcire licet, increſcere, ſi ſomnus incertus eſt, ſi deterior concoctio, ſi foetidiores dejectiones, ſi tardior ſenſus, ſi pigrior mens, ſi percurrit corpus frigus aut calor, ſi id magis pallet. Ea vero, quæ contraria his ſunt, decedentis ejus notæ ſunt.

H

Præ-



Præter hæc, in acutis b morbis serius æger  
 alendus est, nec nisi jam inclinatis; ut ine-  
 dia, dempra materia, impetum frangat. In  
 longis maturius, ut sustinere spatium affe-  
 cturi mali possit. At, si quando is non in to- 5  
 to corpore, sed in parte est; magis tamen  
 ad rem pertinet, vim totius corporis mo-  
 liri, quam partis; cum per eam partes ægræ  
 sanentur. Multum etiam interest, ab ini-  
 tio quis recte curatus sit, an perperam: 10  
 quia curatio minus his prodest, in quibus  
 assidue frustra fuit. Si quis temere habitus,  
 adhuc integris viribus vivit, admota cura-  
 tione momento restituitur.

Sed cum ab his cœperim, quæ notas 15  
 quasdam futuræ adversæ valetudinis ex-  
 hibent, curationum quoque principium  
 ab animadversione ejusdem temporis fa-  
 ciam. Igitur, si quid ex his, quæ proposita  
 sunt, incidit, omnium optima sunt, † quies 20  
 & abstinentia: si quid bibendum, aqua;  
 idque interdum uno die fieri satis est; in-  
 298,  
 15.  
 348,  
 21.  
 terdum, si terrentia manent, biduo: pro-  
 ximeque abstinentiam sumendus est ci-  
 bus exiguus, bibenda aqua, postero die 25  
 etiam vinum, deinde invicem alternis die-  
 bus, modo aqua, modo vinum, donec o-  
 mnis causa merus finiatur. per hæc enim  
 sæpe instans gravis morbus discutitur. Plu-  
 rimique falluntur, dum se primo die pro- 30  
 tinus sublaturus languorem, aut exercita-  
 tione, aut balneo, aut coacta dejectione,  
 aut vomitu, aut sudationibus, aut vino  
 sperant. non quod non interdum id inci-  
 dat,

b Aph. I. 4. & 10. † Liv. 22. c. 18.

dat, aut non decipiat, sed quod sæpius fallat; solaque abſtinentia ſine ullo periculo medeatur. Cum præſertim etiam pro modo terroris moderari liceat: &, ſi leviora indicia fuerunt, ſatis ſit à vino tantum abſtinere; quod ſubtractum plus, quam ſi cibo aliquid dematur, adjuvat: ſi paulo graviora, ſatis ſit, non aquam tantum bibere, ſed etiam cibo carnem ſubtrahere: interdum panis quoque minus, quam pro conſuetudine aſſumere, humidoque cibo eſſe contentum, & olere potiffimum. Satisque ſit, tum ex toto à cibo, à vino, ab omni motu corporis abſtinere, cum vehementes notæ terruerunt. Neque dubium eſt, quin vix quiſquam, qui non diſſimulavit, ſed per hæc mature morbo occurrit, ægrotet.

C A P. III.

*De Februm generibus.*

20

**A**TQUE hæc quidem ſanis facienda ſunt, tantum cauſam metuentibus. ſequitur vero curatio februm; quod & in toto corpore, & vulgare maxime morbi genus eſt. Ex his una quotidiana, altera tertiana, altera quartana eſt. Interdum etiam longiore circuitu quædam redeunt, ſed id raro evenit. In prioribus, & morbi ſunt, & medicina.

30 Ac quartanæ quidem b ſimpliciores ſunt. Incipiunt fere ab horrore; deinde calor erumpit; finitaque febre biduum integrum eſt. ita quarto die revertitur.

Tertianarum vero duo genera ſunt. Al-

H 2

terum

a I. Epidem. III, 14. &c. b I. Epidem. III, 17.

terum eodem modo, quo quartana, & incipiens, & desinens; illo tantum interposito discrimine, quod unum diem præstat integrum, tertio redit. Alterum longe perniciosius, quod tertio quidem die revertitur, ex octo autem & quadraginta horis fere sex & triginta per accessionem occupat (interdum etiam vel minus, vel plus) neque ex toto in † remissione desistit; sed tantum levius est. Id genus plerique medici *ἡμικριταίων* appellant.

Quotidianæ vero variæ sunt, & multiplices. Aliæ enim protinus à calore incipiunt, aliæ à frigore, aliæ ab horrore. Frigus voco, ubi extremæ partes membrorum inalgescunt: horrorem, ubi totum corpus intremat. Rursus aliæ sic desinunt, ut ex toto sequatur integritas: aliæ sic, ut aliquantum quidem minuatur ex febre, nihilominus tamen quædam reliquæ remaneant, donec altera accessio accedat: ac sæpe aliæ vix quicquam aut nihil remittunt, sed ita, ut cœpere, continuant. Deinde, aliæ fervorem ingentem habent, aliæ tolerabilem: aliæ quotidie pares sunt, aliæ impares; atque invicem altero die leniores, altero vehementiores: aliæ tempore eodem postridie revertuntur, aliæ vel ferius vel celerius: aliæ diem noctemque accessione & decessione implent, aliæ minus, aliæ plus: aliæ, cum decedunt, sudorem movent, aliæ non movent; atque aliàs per sudorem ad integritatem venit, aliàs corpus tantum imbecillius redditur. Accessio-

† Est proprium verbum medicorum, Gronov. ad Senec. Epist. 53.

cessiones etiam, modo singulæ singulis diebus fiunt, modo binæ pluresve concurrunt. Ex quo sæpe evenit, ut quotidie plures accessiones remissionesque sint; sic tamen, ut unaquæque alicui priori respondeat.

Interdum vero accessiones quoque confunduntur, sic ut notari neque tempora earum, neque spatia possint. Neque verum  
 10 est, quod dicitur à quibusdam, nullam febrem inordinatam esse, nisi aut ex vomica, aut ex inflammatione, aut ex ulcere. Facilius enim semper curatio foret, si hoc verum esset. nam, quod evidentes causæ faciunt, facere etiam abditæ possunt. Neque  
 15 de re, sed de verbo controversiam movent, qui, cum aliter aliterque in eodem morbo febres accedunt, non easdem inordinate redire, sed alias aliasque subinde oriri dicunt. Quod tamen ad curandi rationem  
 20 nihil pertineret, etiamsi vere diceretur. Tempora quoque remissionum modo liberalia, modo vix ulla sunt.

## C A P. I V.

25

*De Curationum diversis generibus.*

**E**T febrium quidem ratio maxime talis est. Curationum vero diversa genera sunt, prout authores aliquos habent. Asclepiades officium esse medici dicit, ut tuto, ut celeriter, ut jucunde curet. Id vorum est: sed fere periculosa esse nimia & festinatio & voluptas solet. Qua vero moderatione utendum sit, ut quan-

tum fieri potest, omnia ista contingant, prima semper habita salute, in ipsis partibus curationum considerandum erit.

Et ante omnia quæritur, primis diebus æger qua ratione continendus sit. Antiqui, 5 medicamentis quibusdam datis, concoctionem moliebantur; eo quod a cruditatem maxime horrebant: deinde eam materiam, quæ lædere videbatur, ducendo sæpius alvum subtrahebant. Asclepiades medica- 10  
 29, 7. menta sustulit; alvum non toties, sed fe-  
 85, 7. re tamen in omni morbo, subduxit. Febre vero ipsa præcipue se ad remedium uti professus est. Convellendas etiam vires ægri putavit, luce, vigilia, siti ingenti; sic, ut 15  
 ne os quidem primis diebus elui sineret. Quo magis falluntur, qui per omnia jucundam ejus disciplinam esse concipiunt. Etenim ulterioribus quidem diebus cubantis etiam luxuriæ subscripsit, primis 20  
 vero tortoris vicem exhibuit.

Ego autem, medicamentorum dari portiones, & alvum duci non nisi raro debere, concedo. Et id non ideo tamen agendum, ut ægri vires convellantur, existimo: quo- 25  
 niam ex imbecillitate summum periculum est. Minui ergo tantum materiam superantem oportet; quæ naturaliter digeritur, ubi nihil novi accedit. Itaque abstinendus à cibo primis diebus est, & in luce habendus 30  
 æger (nisi infirmus) interdiu, quoniam corpus ista quoque digerit; isque cubare quam maximo conclavi debet.

Quod ad sitim vero somnumque pertinet,



net, moderandum est, ut interdiu vigilet; noctu, si fieri potest, conquiescat: ac neque potet, neque nimium siti crucietur. Os etiam ejus elui potest, ubi & siccum est, & ipsi foetet. quamvis id tempus aptum potioni non est. Commodeque Erasistratus dixit, sæpe, interiore parte humorem non requirente, os & fauces requirere; neque ad rem, male haberi ægrum, pertinere. Ac  
10 primo quidem sic tenendus est.

Optimum vero medicamentum est, oportune cibus datus, qui quando primum dari debeat, quæritur. Plerique ex antiquis tarde dabant, sæpe quinto die, sæpe sexto,  
15 & id fortasse vel in Asia, vel in Ægypto, 8, 22. cœli ratio patitur. Asclepiades, ubi ægrum triduo per omnia fatigaverat, quartum diem cibo destinabat. At Themison nuper, non, quando cœpisset febris, sed quando desisset,  
20 aut certe levata esset, considerabat, & ab illo tempore expectato die tertio, si non accesserat febris, statim: si accesserat, ubi ea vel desierat, vel, si assidue inhærebat, si certe se inclinaverat, cibum dabat.

25 Nihil autem horum utique perpetuum 17, 2. est. Nam potest primo die primus cibus dandus esse, potest secundo, potest tertio, potest non nisi quarto, aut quinto; potest post unam accessionem, potest post duas; po-  
30 test post plures. Refert enim, qualis morbus sit, quale corpus, quale cœlum, quæ ætas, quod tempus anni. Minimeque, in rebus 18, 33. multum inter se differentibus, perpetuum esse præceptum temporis potest. In mor-  
bo,

bo, qui plus virium aufert, celerius cibus dandus est: itemque eo b cælo, quo magis digerit. Ob quam causam in Aphrica nullo die æger abstinere recte videtur. Maturius etiam puero, quam juveni: æstate, 5 quam hieme, dari debet. c Unum illud, & semper, & ubique servandum est, ut ægri vires subinde assidens medicus inspiciat, & 78, 13. quamdiu supererunt, abstinentia pugnet; 131, si imbecillitatem vereri cœperit, cibo sub- 21. veniat. Id enim ejus officium est, ut ægrum, 295, neque supervacua materia oneret, neque 22. imbecilliozem fame perdat. Idque apud Erasistratum quoque invenio: qui, quamvis parum docuit, quando venter, quando cor- 15 pus ipsum exinaniretur, dicendo tamen, hæc esse videnda, & tum cibum dandum, cum corpori deberetur: satis ostendit, dum vires superessent, dari non oportere; ne deficerent, consulendum esse. 20

Ex his autem intelligi potest, ab uno medico multos non posse curari: eumque, si artifex est, idoneum esse, qui non multum ab ægro recedit. Sed, qui quæstui serviunt, quoniam is major ex populo est, libenter amplectuntur ea præcepta, quæ sedulitatem non exigunt; ut in hac ipsa re. Facile est enim dies vel accessiones numerare his quoque, qui ægrum raro vident: ille assideat necesse est, qui, quod solum 30 opus est, visurus est, quando nimis imbecillus futurus sit, nisi cibum acceperit. In pluribus tamen ad initium cibi dies quartus aptissimus esse consuevit.

Est

b Aph. 1, 15. c Aph. 1, 9.

Est autem alia etiam de diebus d ipsis du-  
bitatio, quoniam antiqui potissimum e im-  
pares sequebantur, eosque, tanquam tunc de  
ægris judicaretur, *κρισίμης* † nominabant. f Hi  
5 erant dies tertius, quintus, septimus, no-  
nus, undecimus, quartusdecimus, unus &  
vigésimus; ita ut summa potentia septimo,  
deinde quartodecimo, deinde uni & vige-  
simo daretur. Igitur sic ægros nutriebant, <sup>138, 9.</sup>  
10 ut dierum imparium accessiones expecta-  
rent: deinde postea cibum, quasi leviori-  
bus accessionibus instantibus, darent: adeo  
ut Hippocrates, g si alio die febris desisset,  
recidivam timere sit solitus.  
15 Id Asclepiades jure ut vanum repudia-  
vit; neque in ullo die, quia par imparve  
esset ægris vel majus vel minus periculum  
esse dixit. Interdum enim pejores dies pa-  
res fiunt; & opportunius post febrium ac-  
20 cessiones cibus datur. Nonnumquam etiam  
in ipso morbo, dierum ratio mutatur; fit-  
que gravior, qui remissior esse consueverat.  
Atque ipse quartusdecimus par est, in quo  
esse magnam vim antiqui fatebantur.  
25 Qui cum octavum primi naturam habere  
contenderent, ut ab eo secundus septena-  
rius inciperet, ipsi sibi repugnabant, non  
octavum, neque decimum, neque duode-  
30 cimum diem sumendo, quasi potentio-  
rem. Quod cum fecissent sine ulla probabili ra-  
tione, ab undecimo, non ad tertiumdeci-  
mum, sed ad quartumdecimum transibant.  
Est etiam apud Hippocratem, ei, quem sep-  
H 5 timus

d I. Epidem. III. de Partu septim. VII. VIII.  
e Julian. Imper. Epist. pag. 207. † Cæl. Aurel.  
Acut. Morb. I. 14. f Aph. II, 23, 24. g Aph. IV, 61.

timus dies liberaturus sit, quartum esse gravissimum. Ita, illo quoque authore, in die pari & gravior febris esse potest, & certa futuri nota. Atque idem alio loco quartum quemque diem, ut in utrunque efficacissimum apprehendit; id est, quartum, septimum, undecimum, quartumdecimum, decimumseptimum: in quo ab impari ad paris rationem transit. Et ne in hoc quidem propositum conservavit: cum à septimo die undecimus, non quartus, sed quintus sit. Adeo apparet, quacumque ratione ad numerum respexerimus, nihil rationis, sub illo quidem authore, reperiri. Verum in his quidem antiquos tunc celebres admodum Pythagorici numeri fefellerunt: cum hic quoque medicus non numerare dies debeat, sed ipsas accessiones intueri; & ex his conjectare, quando dandus cibus sit.

Illud autem magis ad rem pertinet, scire, cibumne oporteat dari, cum jam bene venæ conquieverunt, aut etiamnum manentibus reliquiis febris. Antiqui enim quam integerrimis corporibus alimentum offerrebant. Asclepiades, inclinata quidem febre, sed adhuc tamen inhærente. In quo vanam rationem secutus est: non quod non sit interdum maturius cibus dandus, si mature timetur altera accessio: sed quod scilicet non nisi quam sanissimo dari debeat. \* minus enim corrumpitur, quod integro corpori infertur. Neque tamen verum est, quod Themisoni videbatur, si duabus horis

\* Aph. I. 19.

ris integer futurus esset æger, satius esse tunc dare; ut ab integro corpore potissimum diduceretur. Nam si diduci tam celeriter posset, id esset optimum. Sed cum  
 5 hoc breve tempus non præstet, satius est, principia cibi à decedente febre, quam reliquias ab incipiente excipi. Ita, si longius tempus secuturum est, quam integerrimo dandus est: si etiam breve, antequam  
 10 ex toto integer fiat. Quo loco vero integritas est, eodem est remissio, quæ maxime in febre continua potest esse. At hoc quoque quæritur, utrum tot horæ expectandæ sint, quot febrem habuerunt: an  
 15 satis sit, primam partem earum præteriri, ut ægris jucundius insidat, quibus interdum non vacat. Tutissimum est autem, ante totius accessionis tempus præterire: quamvis, ubi longa febris fuit, potest in-  
 20 dulgeri ægro maturius, dum tamen ante minimum pars dimidia prætereatur. Idque non in ea sola febre, de qua proxime dictum est, sed in omnibus ita servandum est.

25

## C A P. V.

*De febrium speciebus, & singularum curationibus: & primo, quando cibus febricitantibus dandus sit.*

30 **H**Æc magis per omnia genera febrium perpetua sunt: nunc ad singulas earum species descendam. Igitur si semel tantum accessit, deinde desit, eaque vel ex \* inguine, vel ex lassitudine; vel ex æstu,

\* Malim. sanguine vel ingluvie, quomodo enim ex inguine posset oriri febris? dein enumerat causas externas, quas inter inguen censerit non potest.



æstu, aliave simili re fuit, sic, ut interior nulla causa metum fecerit, postero die, cum tempus accessionis ita transit, ut nihil moveret, cibus dari potest. At, si ex alto calor venit; & gravitas vel capitis vel præcordiorum secuta est; neque apparet, quid corpus confuderit; quamvis unam accessionem secuta integritas est: tamen, quia tertiana timeri potest, expectandus est dies tertius; & ubi accessionis tempus præteriit, cibus dandus est, sed exiguus; quia quartana quoque timeri potest. At die quarto demum, si corpus integrum est, eo cum fiducia utendum. Si vero postero, tertiove, aut quarto die secuta febris est; scire licet, morbum esse. Sed tertianarum, quartanarumque (quarum & certus circuitus, & finis integer, & liberaliter quieta tempora sunt) expeditior ratio est. de quibus suo loco dicam.

Nunc vero eas explicabo, quæ quotidie urgent. Igitur tertio quoque die cibus ægro commodissime datur; ut alter febrem minuat, alter viribus subveniat. Sed is dari debet, si quotidiana febris est, quæ ex toto desinat, simulatque corpus integrum factum est: sin, quamvis non accessiones, febres tamen junguntur, & quotidie quidem increscunt, sed sine integritate tamen remittunt, cum corpus ita se habet, ut major remissio non expectetur: si altero die gravior, altero levior accessio est, post graviolem. Fere vero graviolem accessionem levior a nox sequitur: quo fit, ut graviolem accessionem nox quoque tristior antecedit.

At,

At, si continuatur febris, neque levior unquam fit, & dari cibum necesse est, quando dari debeat, magna dissensio est. Quidam, quia fere \* remissius matutinum tempus ægris est, tunc putant dandum. Quod si respondet, non quia mane est, sed quia remissio est ægris, dari debet. Si vero ne tunc quidem ulla requies ægris est, quia hoc ipso pejus id tempus est, quod, cum sua natura melius esse debeat, morbi vitio non est, simulque insequitur tempus meridianum, à quo cum omnis æger fere pejor fiat, timeri potest, ne ille magis etiam, quam ex consuetudine, urgeatur. Igitur alii vespere tali ægro cibum dant. Sed, cum eo † tempore fere pessimi ‡ sint, qui ægrotant, verendum est, ne, si quid tunc moverimus, fiat aliquid asperius. Ob hæc alii differunt ad mediam noctem, decurso jam gravissimo tempore, eodemque longissime distante. Securius vero datur antelucanis horis; quibus omnes fere maxime dormiunt: deinde matutino tempore; quod natura sua levissimum est.

Si vero febres vagæ sunt: quia verendum est, ne cibum statim subsequantur; quandocunque quis ex accessione levatus est, tunc debet assumere. At, si plures accessiones eodem die veniunt, considerare oportet, pares ne per omnia sint (quod vix fieri potest) an impares. Si per omnia pares sunt: post eam potius accessionem cibus dari debet, quæ non inter meridiem & vesperem definit. Si impares sunt: con-

fideran-

\* Cæl. Aurel. Morb. Chronic. II. 14. p. 427.  
 Buxtorf. Lex. Chald. p. 540. † Cæl. Aurel. A.M.  
 I. 1. c. 15. p. 48. ‡ Achill. Tasius de Clitophont.  
 pag. 21.

fiderandum est, quo distent. Nam, si altera  
 gravior, altera levior est, post gravio-  
 rem dari debet: si altera longior, altera brevior,  
 post longiorem: si altera gravior, altera  
 longior est, considerandum est, utra magis  
 affligat, illa vi, an hæc tempore, & post  
 eam dandus est. Sed plane plurimum in-  
 terest, quantæ qualesque inter eas remissio-  
 nes sint. Nam, si post alteram febrem  
 motio manet, post alteram integrum cor-  
 pus est; integro corpore, cibo tempus a-  
 ptius est.

Si semper febricula manet; sed alterum  
 tamen longius tempus remissionis est; id  
 potius eligendum est: adeo ut, ubi acces-  
 siones continuantur, protinus, inclinata  
 priore, dandus cibus sit. Etenim perpetuum  
 est, ad quod omne consilium dirigi potest;  
 cibum quam maxime semper ab accessio-  
 ne futura reducere: & hoc salvo, dare quam  
 integerrimo corpore. Quod non inter  
 duas tantum, sed etiam inter plures acces-  
 siones servabitur. Sed, cum sit aptissimum,  
 tertio quoque die cibum dare; tamen, si  
 corpus infirmum est, quotidie dandus est:  
 multoque magis, si continentes febres  
 sine remissione sunt; quantoque magis cor-  
 pus affligunt; aut si duæ pluresve acces-  
 siones eodem die veniunt. Quæ res efficit,  
 ut & à primo die protinus cibus dari quo-  
 tidie debeat, si protinus venæ conciderunt:  
 & sæpius eodem die, si inter plures acces-  
 siones subinde vis corpori deest. Illud ta-  
 men in his servandum est; ut post eas fe-  
 bres

b Aph. 1, 17.

bres minus cibi detur, post quas, si per corpus liceret, omnino non daretur. Cum vero febris instet, incipiat, augeatur, consistat, decedat, deinde in decessione consistat, aut finiatur; scire licet, optimum cibo tempus esse febre finita: deinde, cum decessio ejus consistit: tertium, si necesse est, quandocumque decedit: cætera omnia periculosa esse. Si tamen propter infirmitatem necessitas urget, satius esse, consistente jam incremento febris, aliquid offerre, quam crescente: satius esse, instante, quam incipiente: cum eo tamen ut nullo tempore is, qui deficit, non sit sustinendus.

15 Neque hercule satis est, ipsas tantum febres medicum intueri, sed etiam totius corporis habitum, & ad eum dirigere curationem; seu supersunt vires, seu desunt, 120, 8.<sup>o</sup> seu quidam mali affectus interveniunt.

20 Cum vero semper ægros securos agere conveniat, ut corpore tantum, non etiam animo laborent: tum præcipue, ubi cibum sumpserunt. Itaque, si qua sunt, quæ exasperatura eorum animos sunt; optimum

25 est, ea, dum ægrotant, eorum notitiæ subtrahere: si id fieri non potest, sustinere tamen post cibum, postque somni tempus, & cum experrecti sunt, tum exponere. 358, ii.

## C A P. VI.

30

*Quando potiones febricitantibus dari expediat.*

**S**ED de cibo facilior quidem cum ægris ratio est: quoniam sæpe stomachus hunc

hunc respuit, etiamsi mens concupiscit. De potione vero ingens pugna est; coque magis, quo major febris est. Hæc enim sitim accendit, & tum maxime aquam exigat, cum illa periculosissima est. Sed descendus æger est, ubi febris conquieverit, protinus sitim quoque quieturam: longiorumque accessionem fore, si quod ei datum fuerit alimentum: ita celerius eum desinere sitire, qui non bibit. Necessè est tamen, quanto facilius etiam sani famem, quam sitim sustinent, tanto magis ægris in potione, quam in cibo indulgere. Sed primo quidem die nullus humor dari debet: nisi subito sic venæ conciderunt, ut cibus quoque dari debeat. Secundo vero, cæterisque etiam, quibus cibus non dabitur, tamen, si magna sitis urgebit, potio dari potest.

218,  
15. Ac ne illud quidem, ab Heraclide Tarentino dictum, ratione caret: ubi aut bilis ægrum, aut cruditas male habet, expedire quoque per modicas potiones misceri novam materiam corruptæ. Illud videndum est, ut, qualia tempora cibo leguntur, talia potioni quoque: ubi sine illo datur, deligantur, cum ægrum dormire cupimus: quod fere sitis prohibet. Satis autem convenit, cum omnibus a febricitantibus nimius humor alienus sit, tum præcipue esse fœminis, quæ ex partu in febres inciderunt.

Sed cum tempora cibo potionisque febris & remissionis ratio det, non est expedi-



peditissimum scire, quando æger febricitet, quando melior sit, quando deficiat: sine quibus dispensari illa non possunt. Venis enim maxime credimus, † fallacissimæ rei; quia sæpe istæ lentiores celerioresque sunt, & ætate, & sexu, & corporum natura. Et plerunque satis sano corpore, si stomachus infirmus est, nonnunquam etiam incipiente febre, subeunt & quiescunt: ut imbecillus is videri possit, cui facile laturo gravis instat accessio. Contra sæpe eas concitat & resolvit sol, & balneum, & exercitatio, & metus, & ira, & quilibet alius animi affectus. adeo ut, cum

15 primum medicus venit, sollicitudo ægri dubitantis, quomodo illi se habere videatur, eas moveat. Ob quam causam, a periti medici est, non protinus ut venit, apprehendere manu brachium: sed primum re-

20 sidere hilari vultu, percunctarique, quemadmodum se habeat; &, si quis ejus metus est, eum probabili sermone lenire; tum deinde ejus carpo manum admovere. Quas venas autem conspectus medici mo-

25 vet, quam facile mille res turbant! Altera res est, cui credimus, calor, æque fallax. Nam hic quoque excitatur æstu, labore, somno, metu, solitudine.

Igitur intueri quidem etiam ista oportet: sed his non omnia credere. Ac protinus quidem scire, non febricitare eum, cujus venæ naturaliter ordinatæ sunt, teporque talis est, qualis esse sanis solet: nec protinus etiam sub calore motuque febrem

I

fese

† Pancirolæ observ. iv. a De decent. ornatu T. ix. x. Pallad. Sophist. in l. v. Epidem. pag. m. 201. Actuæ. de M. M. II, 2.

se se concipere : sed ita , si summa quoque arida inæqualiter cutis est ; si calor & in fronte est , & ex intimis præcordiis oritur ; si spiritus ex naribus cum fervore prorumpit ; si color , aut rubore , aut pallore novo mutatus est ; si oculi graves , & aut perficci , aut subhumidi sunt ; si sudor , cum fit , inæqualis est ; si venæ non æquis interval-  
 5  
 10  
 15  
 20  
 25  
 30  
 35  
 40  
 45  
 50  
 55  
 60  
 65  
 70  
 75  
 80  
 85  
 90  
 95  
 100  
 105  
 110  
 115  
 120  
 125  
 130  
 135  
 140  
 145  
 150  
 155  
 160  
 165  
 170  
 175  
 180  
 185  
 190  
 195  
 200  
 205  
 210  
 215  
 220  
 225  
 230  
 235  
 240  
 245  
 250  
 255  
 260  
 265  
 270  
 275  
 280  
 285  
 290  
 295  
 300  
 305  
 310  
 315  
 320  
 325  
 330  
 335  
 340  
 345  
 350  
 355  
 360  
 365  
 370  
 375  
 380  
 385  
 390  
 395  
 400  
 405  
 410  
 415  
 420  
 425  
 430  
 435  
 440  
 445  
 450  
 455  
 460  
 465  
 470  
 475  
 480  
 485  
 490  
 495  
 500  
 505  
 510  
 515  
 520  
 525  
 530  
 535  
 540  
 545  
 550  
 555  
 560  
 565  
 570  
 575  
 580  
 585  
 590  
 595  
 600  
 605  
 610  
 615  
 620  
 625  
 630  
 635  
 640  
 645  
 650  
 655  
 660  
 665  
 670  
 675  
 680  
 685  
 690  
 695  
 700  
 705  
 710  
 715  
 720  
 725  
 730  
 735  
 740  
 745  
 750  
 755  
 760  
 765  
 770  
 775  
 780  
 785  
 790  
 795  
 800  
 805  
 810  
 815  
 820  
 825  
 830  
 835  
 840  
 845  
 850  
 855  
 860  
 865  
 870  
 875  
 880  
 885  
 890  
 895  
 900  
 905  
 910  
 915  
 920  
 925  
 930  
 935  
 940  
 945  
 950  
 955  
 960  
 965  
 970  
 975  
 980  
 985  
 990  
 995

Ubi vero febris fuit , atque decrevit , spectare oportet , num tempora , partesve corporis aliæ paulum madescant , quæ sudorem venturum esse testentur. Ac si qua ejus nota est , tunc demum dare potui calidam aquam , cujus salubris effectus est , si sudorem per omnia membra diffundit. Hujus  
 15  
 20  
 25  
 30  
 35  
 40  
 45  
 50  
 55  
 60  
 65  
 70  
 75  
 80  
 85  
 90  
 95  
 100  
 105  
 110  
 115  
 120  
 125  
 130  
 135  
 140  
 145  
 150  
 155  
 160  
 165  
 170  
 175  
 180  
 185  
 190  
 195  
 200  
 205  
 210  
 215  
 220  
 225  
 230  
 235  
 240  
 245  
 250  
 255  
 260  
 265  
 270  
 275  
 280  
 285  
 290  
 295  
 300  
 305  
 310  
 315  
 320  
 325  
 330  
 335  
 340  
 345  
 350  
 355  
 360  
 365  
 370  
 375  
 380  
 385  
 390  
 395  
 400  
 405  
 410  
 415  
 420  
 425  
 430  
 435  
 440  
 445  
 450  
 455  
 460  
 465  
 470  
 475  
 480  
 485  
 490  
 495  
 500  
 505  
 510  
 515  
 520  
 525  
 530  
 535  
 540  
 545  
 550  
 555  
 560  
 565  
 570  
 575  
 580  
 585  
 590  
 595  
 600  
 605  
 610  
 615  
 620  
 625  
 630  
 635  
 640  
 645  
 650  
 655  
 660  
 665  
 670  
 675  
 680  
 685  
 690  
 695  
 700  
 705  
 710  
 715  
 720  
 725  
 730  
 735  
 740  
 745  
 750  
 755  
 760  
 765  
 770  
 775  
 780  
 785  
 790  
 795  
 800  
 805  
 810  
 815  
 820  
 825  
 830  
 835  
 840  
 845  
 850  
 855  
 860  
 865  
 870  
 875  
 880  
 885  
 890  
 895  
 900  
 905  
 910  
 915  
 920  
 925  
 930  
 935  
 940  
 945  
 950  
 955  
 960  
 965  
 970  
 975  
 980  
 985  
 990  
 995

135,  
 21.

Cibus † autem febricitantibus humidus est aptissimus , aut humori certe quam  
 30  
 35  
 40  
 45  
 50  
 55  
 60  
 65  
 70  
 75  
 80  
 85  
 90  
 95  
 100  
 105  
 110  
 115  
 120  
 125  
 130  
 135  
 140  
 145  
 150  
 155  
 160  
 165  
 170  
 175  
 180  
 185  
 190  
 195  
 200  
 205  
 210  
 215  
 220  
 225  
 230  
 235  
 240  
 245  
 250  
 255  
 260  
 265  
 270  
 275  
 280  
 285  
 290  
 295  
 300  
 305  
 310  
 315  
 320  
 325  
 330  
 335  
 340  
 345  
 350  
 355  
 360  
 365  
 370  
 375  
 380  
 385  
 390  
 395  
 400  
 405  
 410  
 415  
 420  
 425  
 430  
 435  
 440  
 445  
 450  
 455  
 460  
 465  
 470  
 475  
 480  
 485  
 490  
 495  
 500  
 505  
 510  
 515  
 520  
 525  
 530  
 535  
 540  
 545  
 550  
 555  
 560  
 565  
 570  
 575  
 580  
 585  
 590  
 595  
 600  
 605  
 610  
 615  
 620  
 625  
 630  
 635  
 640  
 645  
 650  
 655  
 660  
 665  
 670  
 675  
 680  
 685  
 690  
 695  
 700  
 705  
 710  
 715  
 720  
 725  
 730  
 735  
 740  
 745  
 750  
 755  
 760  
 765  
 770  
 775  
 780  
 785  
 790  
 795  
 800  
 805  
 810  
 815  
 820  
 825  
 830  
 835  
 840  
 845  
 850  
 855  
 860  
 865  
 870  
 875  
 880  
 885  
 890  
 895  
 900  
 905  
 910  
 915  
 920  
 925  
 930  
 935  
 940  
 945  
 950  
 955  
 960  
 965  
 970  
 975  
 980  
 985  
 990  
 995

† 1 Aph. 16.

proximus : utique ex materia quam levissima ; maximeque † sorbitio : eaque , si magnæ febres fuerunt , quam tenuissima esse debet. Mel quoque despumatum huic recte  
 5 adjicitur , quo corpus magis nutriatur : sed id , si stomachum offendit , supervacuum est ; sicut ipsa quoque sorbitio. Dari vero in vicem ejus potest , vel intrita ex aqua calida , vel alica elota ; si firmus est stomachus , & compressa alvus , ex aqua mulsa ;  
 10 si vel ille languet , vel hæc profluit , ex posca. Et primo quidem cibo ita satis est : secundo vero aliquid adjici potest , ex eodem tamen genere materiæ , vel olus ,  
 15 vel conchylium , vel pomum. At , dum febres quidem increscunt , hic solus idoneus cibus est. Ubi vero aut desinunt , aut levantur , semper quidem incipiendum est ab aliquo ex materia levissima , adjiciendum  
 20 vero aliquid ex media , ratione habita subinde & virium hominis , & morbi. 78, 14.

Apponendi vero ægro varii cibi ( sicut Aesclepiades præcepit ) tum demum sunt , ubi fastidio urgetur , neque satis vires sufficiunt ;  
 25 ut paulum ex singulis degustando , famem vitet. At si neque vis , neque cupiditas deest , nulla varietate sollicitandus æger est ; ne plus assumat , quam concoquat. Neque verum est , quod ab eo dicitur , facilius  
 30 concoqui cibos varios ; eduntur quidem facilius : ad concoctionem autem materiæ genus & modus pertinent. Neque inter magnos dolores , neque increscente b morbo , tutum est , ægrum cibo impleri ; sed  
 I 2 ubi

† Hippocr. de Vet. M. XI. XII. b Aph. I, 7, 8.

ubi inclinata jam in melius valetudo est.

Sunt aliæ quoque observationes in fe-  
 bribus necessariæ ; atque id quidem viden-  
 dum est , quod quidam solum præcipiunt ,  
 an adstrictum corpus sit , an profluat. Quo- 5  
 rum alterum strangulat , alterum digerit.  
 Nam , si adstrictum est , ducenda alvus est ,  
 movenda urina , eliciendus omni modo  
 sudor. In hoc genere morborum sangui-  
 nem etiam misisse , concussisse vehementi- 10  
 bus gestationibus corpus , in lumine habuif-  
 se , imperasse famem , sitim , vigiliam pro-  
 dest. Utile est etiam ducere in balneum ,  
 prius demittere in solium , tum ungere , ite-  
 rum ad solium redire , multaue aqua fove- 15  
 re inguina ; interdum etiam oleum in solio  
 cum aqua calida miscere ; uti cibo rarius &  
 serius , tenui , simplici , molli , calido , exiguo ;  
 maximeque oleribus , qualia sunt , lapathum ,  
 urtica , malva ; vel jure etiam concharum , 20  
 muscutorumve , aut locustarum : neque  
 danda caro , nisi elixa , est. At potio esse de-  
 bet magis liberalis , & ante cibum , & post  
 hunc , & cum hoc , ultra quam sitis coget.  
 Poteritque à balneo etiam pingue jus , aut 25  
 dulcius dari vinum : poterit semel , aut bis  
 interponi Græcum salsum.

37, 7. Contra vero , si corpus profluat , sudor  
 147, coercendus , quies adhibenda erit ; tenebris ,  
 19. somnoque , quodcumque volet , uten- 30  
 dum ; non nisi levi gestatione corpus  
 agirandum , & pro genere mali subvenien-  
 dum. Nam , si venter fluit , aut si stomach-  
 us non continet , ubi febris decrevit , li-  
 bera-

beraliter oportet aquam tepidam potui dare, & vomere cogere; nisi aut fauces, aut præcordia, aut latus dolet, aut vetus morbus est.

5 Si vero sudor exercet, duranda cutis est, vel nitro, vel sale; quæ cum oleo miscentur. At, si levius id vitium est, oleo corpus ungendum est: si vehementius, rosa, vel melino, vel myrteo, cui vinum austerum sit adjectum.

10 Quisquis autem fluore æger est, cum venit in balneum; prius unendus, deinde in solium demittendus est. Si in cute vitium est, frigida quoque, quam calida aqua  
31 melius utetur. Ubi ad cibum ventum est, dari debet his valens, frigidus, siccus, simplex, qui quam minime corrumpi possit, panis tostus, caro assa, vinum austerum, vel certe subausterum; & si venter pro-  
20 fluit, calidum: si sudores nocent, vomitulse sunt, frigidum.

C A P. VII.

*Quomodo pestilentes febres curari debeant.*

25 **D**ESIDERAT etiam propriam animadversionem in febribus pestilentiae casus. In hac minime utile est, aut fame, aut medicamentis uti, aut ducere  
30 alvum. Si vires sinunt, sanguinem mittere optimum est; præcipueque, si cum ardore febris est. Si id parum tutum est, ubi febris aut tenuata est, aut levata, vomitu pectus purgare. Sed in hoc maturius, quam



in aliis morbis, ducere in balneum opus est; vinum calidum, & meracius dare, & omnia glutinosa: inter quæ quoque carnem, generis ejusdem. Nam quo celerius ejusmodi tempestates corripiunt, eo maturius auxilia, etiam cum quadam temeritate, rapienda sunt. Quod si puer est, qui laborat; neque tantum robur ejus est, ut sanguis mitti possit, cucurbitulis ei utendum est; ducenda alvus vel aqua vel pri-  
 sanæ cremore; tum demum is levibus cibus nutriendus. Et ex toto non sic pueri, ut viri, curari debent. Ergo, ut in alio quoque genere morborum, parcus in his agendum est: non facile sanguinem mitte-  
 re, non facile ducere alvum, non cruciare vigilia, fameve, aut nimia siti, non vino curare. Vomitus post febrem eliciendus est: deinde dandus cibus ex levissimis; tum is dormiat: postero die, si febris manet, 20  
 abstineat: tertio, ad similem cibum redeat. Dandaque opera est, quantum fieri potest, ut inter opportunam abstinentiam cibo opportuno, omissis cæteris, nutriatur.

2. *Curatio ardentis febris.*

Si vero ardens febris extorret, nulla 25  
 medicamenti danda potio est; sed in ipsis accessionibus oleo & aqua refrigerandus est: quæ miscenda manu sunt, donec albescant. Etiam amplo conclavi tenendus, 30  
 quo multum & purum aerem trahere possit; neque multis vestimentis strangulandus, sed admodum levibus tantum velandus est. Possunt etiam super stomachum im-  
 poni,

poni, folia vitis in aqua frigida tincta. Ac  
 ne siti quidem nimia vexandus est. Alendus  
 maturius est, id est à die tertio, & ante ci-  
 bum iisdem perungendus. Si pituita in  
 5 stomacho coit, inclinata jam accessione,  
 vomere cogendus est; & tunc dandum fri-  
 gidum olus, aut pomum, ex his, quæ sto-  
 macho conveniunt. Si siccus manet stoma-  
 chus, protinus vel ptisanæ, vel alicæ, vel  
 10 oryzæ cremor dandus est, cum quo recens  
 adeps cocta sit. Cum vero in summo incre-  
 mento morbus est, utique non ante diem  
 quartum, magna siti antecedente, frigida  
 aqua copiose præstanda est, ut bibat etiam  
 15 ultra satietatem; & cum jam venter &  
 præcordia ultra modum repleta, faucesque  
 refrigerata sunt, vomere debet. Quidam  
 ne vomitum quidem exigunt; sed ipsa  
 aqua frigida, tantum ad satietatem data,  
 20 pro medicamento utuntur. Ubi utrumli-  
 bet factum est, multa veste operiendus est, 131,  
 & collocandus, ut dormiat. Fereque post 21.  
 longam sitim & vigiliam, post multam sa-  
 tietatem, post infractum calorem, plenus  
 25 somnus venit; per quem ingens sudor ef-  
 funditur, idque præsentissimum auxilium  
 est: sed in his tantum, in quibus præter  
 ardorem, nulli dolores, nullus præcordio-  
 rum tumor; nihil prohibens, vel in pulmo-  
 30 ne, vel in faucibus; non ulcus, non defe-  
 ctio, non profluvium alvi fuit. Si quis au-  
 tem in huiusmodi febre leniter a tussit, is  
 neque vehementi siti conflictari, neque  
 bibere aquam frigidam debet; sed eo modo

I 4 curan-

136 A. CORN. CELSI Lib. 3.  
curandus est, quo in cæteris febribus præcipitur.

C A P. VIII.

*Curatio semitertianæ febris, quæ  
ἡμιτεταῖος dicitur.*

5

**A**T, ubi id genus tertianæ est, quod ἡμιτεταῖον Medici appellant, magna cura opus est, ne id fallat. Habet enim plerunque frequentiores accessiones decem-  
fionesque, ut aliud morbi gēnus videri possit; porrigiturque febris in horas viginti quatuor, & triginta sex; ut, quod idem est, non idem esse videatur. Et magnopere necessarium est, neque dari cibum, nisi in ea  
remissione, quæ vera est; &, ubi ea venit, protinus dari. Plurimique sub alterutro curantis errore subito moriuntur. Ac, nisi magnopere aliqua res prohibet, inter initia sanguis mitti debet; tum dari cibus, qui  
neque incitet febrem, & tamen longum ejus spatium sustineat.

15

20

C A P. IX.

*Curatio lentarum febrium.*

25

**N**ONNUNQUAM etiam lentæ febres sine ulla remissione corpus tenent; ac neque cibo, neque ulli remedio locus est. In hoc casu medici cura esse debet, ut morbum mutet: fortasse enim curationi  
opportunior fiet. Sæpe igitur ex aqua frigida, cui oleum sit adjectum, corpus ejus pertractandum est, quoniam interdum sic evenit, ut horror oriatur, & fiat initium  
quod-

30

quoddam novi motus; exque eo, cum magis corpus incaluit, sequatur etiam remissio. In his frictio quoque ex oleo & sale salubris videtur.

5 At, si diu frigus est, & torpor, & jactatio corporis, non alienum est, in ipsa febre dare  
\* mulsi tres aut quatuor cyathos, vel cum cibo  
vinum bene dilutum. Intenditur enim sæpe  
ex eo febris; & major ortus calor simul  
10 & priora mala tollit, & spem remissionis,  
inque ea curationis ostendit.

Neque hercule ista curatio nova est, qua nunc quidam traditos sibi ægros, qui sub cautiore medicis trahebantur, in-  
15 terdum † contrariis remediis sanant. Siqui- 19, 15.  
dem apud antiquos quoque ante Herophilum & Erasistratum, maximeque post Hippocratem fuit Petron quidam, qui febricitantem hominem, ubi acceperat, multis  
20 vestimentis operiebat, ut simul calorem 134,  
ingentem, sitimque excitaret. Deinde, ubi 34.  
paulum remitti cœperat febris, aquam frigidam potui dabat; ac, si moverat sudorem, explicuisse se ægrum judicabat: si non mo-  
25 verat, plus etiam aquæ frigidæ ingerebat,  
& tum vomere cogebat. Si alterutro modo febre liberaverat, protinus suillam as-  
sam, & vinum homini dabat. Si non liberaverat, decoquebat aquam sale adjecto,  
30 eamque bibere cogebat, ut vomendo ventrem purgaret.

Et intra hæc omnis ejus medicina erat. Eaque non minus grata fuit his, quos Hippocratis successores non refecerant; quam

I 5

nunc

\* *Mulsa* Rom. Leg. † Senec. de Clem. I. 9.

475,  
19. nunc est his, quos Herophili vel Erasistrati æmuli diu tractos non expedierunt. Neque ideo tamen non est temeraria ista medicina; quia plures, si protinus à principiis exceptit, interemit. Sed, cum eadem omnibus convenire non possint, fere, quos ratio non restituit, temeritas † adjuvat. Ideoque ejusmodi medici melius alienos ægros, quam suos nutriunt. Sed est circumspècti quoque hominis, & novare interdum, & 10 augere morbum, & febres accendere; quia curationem, ubi id, quod est, non recipit, potest recipere id, quod futurum est.

## C A P. X.

15  
*Remedia in febribus ad capitis dolorem, & præcordiorum inflammationem, & ariditatem, & scabritiem linguæ.*

C O N S I D E R A N D U M etiam est, febres ne solæ sint, an alia his quoque mala accedant; id est, num caput doleat, num lingua aspera, num præcordia intenta sint. Si capitis dolores sunt, rosam cum aceto miscere oportet, & id ingerere: deinde habere duo pitacia, quæ latitudinem frontis, longitudinemque æquent: ex his invicem alterum in aceto & rosa habere, alterum in fronte; aut intinctam iisdem lanam succidam imponere. Si acetum offendit, pura rosa utendum est. Si rosa ipsa lædit, oleo acerbo. Si ista parum juvant, 25 teri potest vel iris arida, vel nuces amaræ, vel quælibet herba ex refrigerantibus. Quorum quidlibet ex aceto impositum, 30 dolorem

† Exemp. vide apud Valleriolam lib. 3. obs. 4.



dolorem minuit ; sed magis aliud in alio. Juvat etiam panis cum papavere injectus, vel cum rosa, cerusa, spumave argenti. Olfacere quoque vel serpillum, vel anethum, 5 non lienum est.

At, si in præcordiis inflammatio & dolor est, primo superimponenda sunt cataplasmata reprimentia; ne, si calidiora fuerint, plus eo materiæ concurrat. Deinde, 10 ubi prima inflammatio se remisit, tunc demum ad calida & humida veniendum est; ut ea, quæ remanserunt, discutiant. Notæ vero inflammationis sunt quatuor, rubor, & tumor, cum calore, & dolore. Quo ma- 15 gis erravit Erasistratus, qui febrem nullam 5, 7. sine hac esse dixit.

Ergo, si sine inflammatione dolor est, nihil imponendum est. hunc enim statim ipsa febris solvet. At, si neque inflammatio, 70, 3. 20 neque febris, sed tantum præcordiorum dolor est; protinus calidis & siccis fomentis uti licet. Si vero lingua sicca est, & scabra, detergenda primum penicillo est ex aqua calida: deinde unguenda mixtis in- 25 ter se rosa & melle. Mel purgat, rosa reprimat, simulque siccescere non sinit. At si scabra non est, sed arida, ubi penicillo deterfa est, ungi rosa debet, cui ceræ sit paulum adjectum.

30

## C A P. XI.

*Remedia contra frigus, quod febrem  
præcedit.*

**S**OLET etiam ante febres esse frigus; <sup>5</sup>  
 idque vel molestissimum morbi genus  
 est. Ubi id expectatur, omni potione  
 prohibendus æger est: hæc enim paulo ante  
 data, multum malo adjicit. Item maturius <sup>10</sup>  
 veste multa tegendus est. Admovenda par-  
 tibus his, pro quibus metuimus, sicca &  
 calida fomenta: sic, ut ne statim vehemen-  
 tissimi calores incipiant, sed paulatim in-  
 crescant. Perfricandæ quoque eæ partes <sup>15</sup>  
 manibus unctis ex vetere oleo sunt, eique  
 adjiciendum aliquid ex calefacientibus.  
 Contentique medici quidam una frictione,  
 etiam ex quolibet oleo, sunt. In harum fe-  
 brium remissionibus nonnulli tres quatuor <sup>20</sup>  
 sorbitionis cyathos, etiamnum manente  
 febre, dant: deinde, ea bene finita, reficiunt  
 stomachum cibo frigido & levi. Ego tum  
 hoc puto tentandum, cum parum cibus, se-  
 mel & post febrem datus, prodest. <sup>25</sup>

Sed curiose prospiciendum est, ne tem-  
 pus remissionis decipiat. Sæpe enim in hoc  
 quoque genere valetudinis jam minui fe-  
 bris videtur, & rursus intenditur. Itaque  
 ei remissioni credendum est, quæ etiam im- <sup>30</sup>  
 moratur, & jactationem, fervoremque cor-  
 poris, quem ζέσιν Græci vocant, minuit. Il-  
 lud satis convenit, si quotidie pares accen-  
 siones sunt, quotidie parvum cibum dan-  
 dum:

dum: si impares, post graviolem, cibum; post leviolem, aquam mulfam.

C A P. XII.

*Curatio horroris in febribus.*

5 **H** O R R O R autem eas fere febres antecedit, quæ certum habent circuitum, & ex toto remittuntur; ideoque a tutiffimæ sunt, maximeque curationes admittunt. Nam ubi incerta tempora sunt, neque alvi ductio, neque balneum, neque vinum, neque medicamentum aliud recte datur. Incertum est enim, quando febris ventura fit: ita fieri potest, ut, si subito venerit, summa in eo pernicietas fit, quod auxilii causa fuit inventum. Nihilque aliud fieri potest, quam ut primis diebus bene abstineat æger: deinde, sub decessu febris ejus, quæ graviffima est, cibum sumat.

15 At ubi certus circuitus est, facilius omnia illa tentantur; quia facilius proponere nobis & accessionum & decessionum vices possumus. In his autem, cum b veteraverunt, utilis fames non est. Primis tantummodo diebus ea pugnandum est: deinde dividenda curatio est, & ante horror, tum febris discutienda. Igitur cum primum aliquis inhorruit, & ex horrore incaluit, dare ei oportet potui tepidam aquam

30 subsalsam, & vomere eum cogere: nam fere talis horror ab his oritur, quæ biliosa in stomacho resederunt. Idem faciendum est, si proximo quoque circuitu æque accessit: sæpe enim sic discutitur. Jamque

a Aph. IV, 43. b *In veteraverunt*, Rittershus. ad Phædr. 1. Fab. 2.

que , quod genus febris sit , scire licet.

Itaque sub expectatione proximæ accessionis , quæ instare tertia potest , deducendus in balneum est ; dandaque opera est , ut per tempus horroris in solio sit. Si ibi quoque tulerit , nihilominus idem sub expectatione accessionis quartæ faciat : siquidem eo quoque modo sæpe is discutitur. Si nec balneum quidem profuit , ante accessionem allium edat , aut bibat calidam aquam cum pipere : siquidem ea quoque assumpta calorem movent ; qui horrorem non admittit. Deinde eodem modo , quo in frigore præceptum est , antequam inhorrescere possit , operiatur. fomentisque protinus calidioribus totum corpus circumdare convenit , maximeque involutis extintis testis & titionibus.

Si nihilominus horror pertraherit , multo oleo calefacto inter ipsa vestimenta perfundatur ; cui æque ex calefacientibus aliquid sit adjectum : adhibeaturque frictio , quantam is sustinere poterit , maximeque in manibus & pedibus : & spiritum ipse contineat. Neque desistendum est , etiam si horror redit. sæpe enim pertinacia juvantis malum corporis vincit.

Si quid evomuit , danda aqua tepida , iterumque vomere cogendus est ; utendumque eisdem est , donec horror finiatur. Sed præter hæc ducenda alvus est , si tardius horror quiescet : siquidem id quoque exonerato corpore prodest. Ultima post hæc auxilia sunt , gestatio & ambulatio. Cibis autem

autem in ejusmodi morbis maxime dandus est, qui mollem alvum præstet, ac caro glutinosa. Vinum cum dabitur, austerum sit.

5                      C A P. XIII.

*Curatio quotidiana febris.*

**H**Æc ad omnes circuitus februm pertinent: discernendæ tamen singulæ  
10 sunt, sicut rationem habent dissimilem. Si quotidiana est, triduo primo magnopere abstinere oportet; tum cibus, altero quoque die uti. Si res inveteraverit, post febrem experiri balneum, & vinum;  
15 magisque, si, horrore sublato, hæc superest.

C A P. XIV.

*Curatio tertianæ febris.*

**S**I vero tertianæ, quæ ex toto intermittit, aut quartana est; mediis diebus, & ambulationibus uti oportet, aliisque  
20 exercitationibus, & unktionibus. Quidam ex antiquioribus medicis Cleophantus, in hoc genere morborum, multo ante accessionem, caput ægri multa<sup>a</sup> calida aqua perfundebat, deinde vinum dabat. Quod, quamvis pleraque ejus viri præcepta secutus est Asclepiades, recte tamen præteriit:  
25 est enim anceps.

Ipse, si tertiana febris est, tertio die post accessionem dicit alvum duci oportere: quinto, post horrorem vomitum elicere; deinde post febrem, sicut illi mos erat, adhuc

<sup>a</sup> Aph. VII, 42.



huc calidis dare cibum & vinum : sexto die, in lectulo detineri : sic enim fore, ne septimo die febris accedat. Id sæpe fieri posse, verisimile est. Tutius tamen est, hoc ipso ordine tria remedia, vomitus, alvi 5 ductionis, vini potus, per triduum, id est, die tertio, & quinto, & septimo tentare: nec vinum, nisi post accessionem, die septimo bibere.

Si vero primis diebus discussus morbus 10 non est, inciditque in vetustatem, quo die febris expectabitur, in lectulo se contineat; post febrem perfricetur: tum, cibo assumpto, bibat aquam; postero die, quo à cibo vacat, & ab exercitatione unctioque, aqua tan- 15 tum contentus, conquiescat. Et id quidem optimum est. Si vero imbecillitas urgebit, & post febrem vinum; & medio die paulum cibi debet assumere.

## C A P. XV.

20

*Curatio quartana febris.*

**E** A D E M in quartana facienda sunt. Sed cum hæc tarde a admodum finiatur, nisi primis diebus discussa est, diligen- 25 tius ab initio præcipiendum est, quid in ea debeat fieri. Igitur, si cui cum horrore febris accessit, eaque desit, eodem die & postero tertioque continere se debet, & aquam tantummodo calidam primo die 30 post febrem sumere; biduo proximo, quantum fieri potest, ne hanc quidem: quarto die, si cum horrore febris revertitur, vomere; sicut ante præceptum est: deinde post

a I. Epidem. III, 17. b De Affect. XIX, 2.

post febrem , modicum cibum sumere ,  
 vini quadrantem. Postero tertioque die  
 abstinere ; aqua tantummodo calida , si si-  
 tis est , assumpra. Septimo die balneo frigus  
 5 prævenire , abstinere , continere se debet , &  
 aqua tantummodo calida , si sitis est , uti : ac  
 tum ita nono die balneo frigus prævenire ,  
 & , si febris redierit , ducere alvum ; ubi ex  
 eo corpus conquieverit , inunctione vehe-  
 10 menter perfricari , eodem modo sumere  
 cibum , & vino biduo proximo se abstine-  
 re , frictione servata. Decimo tertio die  
 rursus balneum experiri ; & , si postea fe-  
 bris accessit , æque perfricari , vinum co-  
 15 piosius bibere. Ac sic proximum est , ut  
 quies tot dierum , & abstinencia cum cæte-  
 ris , quæ præcipiuntur , febrem tollant.

Si vero nihilominus remanet , aliud ex  
 toto sequendum est curationis genus ; id-  
 20 que agendum , ut , quod diu sustinendum  
 est , corpus facile sustineat. Quo minus  
 etiam curatio probari Heraclidis Tarenti-  
 ni debet , qui primis diebus ducendam  
 alvum , deinde abstinendum in septimum  
 25 diem dixit. Quod ut sustinere aliquis pos-  
 sit ; tamen etiam febre liberatus vix refe-  
 ctioni valebit. adeo , si febris sæpius accesse-  
 rit concider. Igitur , si tertio decimo die  
 morbus remanebit , balneum neque ante  
 30 febrem , neque post eam tentandum erit ;  
 nisi interdum jam horrore discusso. Hor-  
 rot ipse per eadem , quæ supra præscripta  
 sunt , expugnandus. Deinde post febrem  
 oportebit ungi , & vehementer perfricari ;  
 K cibum

cibum & validum, & fortiter assumere; vino uti, quanto libebit: postero die, cum satis quieverit, ambulare, exerceri, ungi, perfricari fortiter; cibum accipere sine vino: tertio die abstinere. 5

Quo die vero febrem expectabit, ante surgere, & c exerceri, dareque operam oportet, ut in ipsam exercitationem tempus febris incurrat: sic enim sæpe illa discutitur. At, si in opere occupavit, tum de- 10 mum se recipere. In ejusmodi valetudine, medicamenta sunt, oleum, frictio, exercitatio, cibum, vinum. Si venter adstrictus est, solvendus est.

Sed hæc facile validiores faciunt: si im- 15 becillitas occupavit, pro exercitatione gestatio est. Si ne hanc quidem sustinet, adhibenda tamen frictio est. Si hæc quoque vehemens onerat, intra quietem, & unctio- nem, & cibum consistendum est; danda- 20 que opera est, ne qua cruditas in quotidianam id malum vertat. Nam quartana neminem † jugulat: sed, si ex ea facta quotidiana est, in malis æger est: quod tamen, nisi culpa vel ægri d vel curantis, nunquam 25 fit.

## C A P. XVI.

### *Curatio duarum quartanarum.*

**A** T, si duæ quartanæ sunt, neque, quas 30 proposui, exercitationes adhiberi possunt: aut ex toto quiescere opus est, aut, si id difficile est, leniter ambulare, hinc confidere, diligenter involutis pedi- bus

c Aristot. Probl. Sect. II, 58. † Tulpius observ. l. 3. cap. 53. d Hippocr. I. Epidem. Sect. III, 4.

bus & capite. Quoties febris accessit & de-  
 fit, cibum modicum sumere, & vinum;  
 reliquo tempore, nisi imbecillitas urget,  
 abstinere. At, si duæ febres pene jungun-  
 5 tur, post utramque cibum sumere: deinde  
 vacuo tempore, & moveri aliquantum, &  
 post unctioem cibo uti. Cum vero vetus  
 quartana raro, nisi vere a solvatur; utique  
 eo tempore attendendum est, ne quid fiat,  
 10 quod valetudinem impediatur. Prodestque  
 in vetere quartana, mutare subinde vi-  
 ctus genus, à vino ad aquam, ab aqua ad  
 vinum, à lenibus cibis ad acres, ab acri-  
 bus ad lenes transire: esse radicem, deinde  
 15 vomere: jureve pulli gallinacei ventrem  
 resolvere: oleo ad frictiones adjicere cale-  
 facientia: ante accessionem sorbere, vel  
 aceti cyathos duos, vel unum sinapis, cum  
 tribus Græci vini falsi, vel mista paribus 37, 7.  
 20 portionibus; & in aqua diluta, piper, ca-<sup>132,</sup>  
 storeum, later, myrrham. Per hæc enim <sup>27.</sup>  
 similiaque corpus agitandum est, ut mo-  
 veatur ex eo statu, quo detinetur.

Si febris quievit, diu meminisse ejus  
 25 diei convenit: eoque vitare frigus, calo-  
 rem, cruditatem, lassitudinem. Facile enim  
 revertitur, nisi à sano quoque aliquandiu  
 timeatur.

C A P. XVII.

30 *Curatio quotidianæ febris, quæ ex  
 quartana facta sit.*

**A**T, si ex quartana, quotidiana facta  
 est: cum id initio inciderit, per bi-  
 K 2 du-

duum abstinere oportet, vespere frictione uti, & aquam tantummodo potui dare. tertio die sæpe fit, ne febris accedat. Sed si febris fuit, si non fuit, cibus post accessionis tempus est dandus: & si manet, per bi- 5 duum abstinentia, quanta maxima imperari corpori potest, & fricatione quotidie utendum est.

## C A P. XVIII.

De tribus insaniam generibus: & primo de 10  
ejus curatione, quæ à Græcis  
Φρενίτις dicitur.

**E**T febrium quidem curatio exposita est. Super sunt vero alii corporis affe- 15 ctus, qui huic superveniunt, ex quibus eos, qui certis partibus assignari possunt, protinus jungam. Incipiam ab insaniam, primamque hujus ipsius partem aggrediar, quæ & acuta, & in febre est. Græci 20 Φρενίτιν appellant.

Illud ante omnia scire oportet, interdum in accessione ægros desipere, & loqui aliena. Quod non quidem leve est; neque incidere potest, nisi in febre vehementi, 25 non tamen æque pestiferum est. nam plerumque breve esse consuevit; levatoque accessionis impetu, protinus mens redit. Neque id genus morbi remedium aliud desiderat, quam quod in curanda febre 30 præceptum est.

Phrenitis a vero tum demum est, cum continua dementia esse incipit; aut cum æger, quamvis adhuc sapiat, tamen quaf-  
dam

a Trallian. I. 13. Coel. Aurelian. Præf. Lib. 1. Acutor. Morb. pag. 7.



dam vanas imagines accipit : perfecta est ,  
 ubi mens illis imaginibus addicta est. Ejus  
 autem plura genera sunt : siquidem ex  
 phreniticis alii hilares , alii tristes sunt : alii  
 5 facilius continentur , & intra verba desi-  
 piunt ; alii insurgunt , & violenter quædam  
 manu faciunt : atque ex his ipsis , alii nihil  
 nisi impetu peccant , alii etiam artes adhi-  
 bent ; summamque speciem sanitatis in ca-  
 10 prandis malorum operum occasionibus  
 præbent ; sed exitu deprehenduntur.

Ex his autem eos , qui intra verba desi-  
 piunt , aut leviter etiam manu peccant ,  
 onerare asperioribus coercionibus su-  
 15 pervacuum est. Eos vero , qui violentius  
 se gerunt , vincire convenit ; ne vel sibi vel  
 alteri noceant. Neque credendum est , si  
 vinculus aliquis , dum levare vinculis cu-  
 pit , sanum jam se fingat ; quamvis pruden-  
 20 ter & miserabiliter loquatur , quoniam is  
 dolus insanientis est.

Fere vero antiqui tales ægros in tene-  
 bras habebant ; eo quod illis contrarium  
 esset , exterreri ; & ad quietem animi tene-  
 25 bras ipsas conferre aliquid judicabant. At  
 Asclepiades , tanquam ipsis tenebris terren-  
 tibus , † in lumine habendos eos dixit. Neu-  
 trum tamen perpetuum est. Alium enim  
 lux , alium tenebræ magis turbant. repe-  
 30 riunturque , in quibus nullum discrimen  
 deprehendi , vel hoc , vel illo modo possit.  
 Optimum itaque est , b utrumque experiri ;  
 & habere eum , qui tenebras horret , in lu-  
 ce ; eum , qui lucem , in tenebris. At ubi

K 3 nul-

† Cæl. Aurel. M. A. l. 1. c. 15. p. 40. b. Cæl.  
 Aurel. Acut. Morb. l. 9. Arethaus de Curat. Acut. l. 1.

nullum tale discrimen est, æger, si vires habet, loco lucido: si non habet, obscuro continendus est.

Remedia vero adhibere, ubi maxime furor urget, supervacuum est: simul enim; febris quoque increfcit. Tum itaque nihil nisi continendus æger est. Ubi vero res patitur, festinanter subveniendum est. Asclepiades perinde esse dixit, his sanguinem \* mitti, ac si et trucidentur: hanc rationem se- 10 cutus, quod neque insania esset, nisi cum febre intenta; neque sanguis, nisi in remissione ejus, recte mitteretur. Ipse in his somnum multa frictione quæsit. Sed cum & intentio febris somnum impediatur; & 15 frictio non, nisi in remissione ejus, utilis sit: hoc quoque auxilium debuit præterire. Quid igitur est? Multa in præcipiti d periculo recte fiunt, aliàs omittenda. Et continua quoque febris habet tempora, qui- 20 bus, etsi non remittit, non tamen crescit. Estque hoc, ut non optimum, sic satis tamen secundum remediis tempus. Quod si vires ægri patiuntur, sanguis quoque mitti debet. 25

Nec minus dubitari potest, an alvus ducenda sit. Tum, interposito die, convenit caput ad † cutem tondere: deinde aqua fovere, in qua verbenæ aliquæ decoctæ sint ex reprimentibus: aut prius fovere, deinde 30 tondere, & iterum fovere: ac novissime rosa caput naresque implere; offerre etiam naribus rutam, ex aceto contritam, & movere sternutamenta medicamentis ad id effi-

\* V. S. quando & qualis conveniat *Cœl. Aurel. Acut. Morb. I. c. 10.* c *Cœl. Aurelian. Acut. Morb. I, 25.* d *Valeriola Observ. I. lib. 1.* † *Cœl. Aurel. Acut. Morb. I, 10. & c. 15.*

efficacibus. Quæ tamen facienda sunt in his, quibus vires non defunt. Si vero imbecillitas est, rosa tantum caput, adjecto serpyllo, similive aliquo, madefaciendum est. Utiles etiam in quibuscumque viribus herbæ duæ sunt, solanum & muralis, si simul ex utraque, succo expresso, caput impleatur. Cum se febris remiserit, frictione utendum est: parcius tamen in his, qui nimis hilares, quam in his, qui nimis tristes sunt.

Adversus omnium autem sic insanientium animos gerere se pro cuiusque natura necessarium est. Quorundam enim vani metus levandi sunt: sicut in homine prædivite famem timente incidit; cui subinde falsæ hæreditates nunciabantur. Quorundam audacia coercenda est: sicut in his fit, in quibus continendis plangæ quoque adhibentur. Quorundam etiam intempestivus risus objurgatione & minis prohibendus est. Quorundam discutiendæ tristes cogitationes: ad quod symphonix, & cymbala, strepitusque proficiunt. Sæpius tamen assentiendum, quam repugnandum est: paulatimque, & non evidenter, ab his, quæ stulte dicuntur, ad meliora mens abducenda. Interdum etiam elicienda ipsius intentio: ut fit in hominibus studiosis literarum, quibus liber legitur, aut recte, si delectantur; aut perperam, si id ipsum eos offendit. Emendando enim advertere animum incipiunt. Quin etiam recitare, si qua meminerunt, cogendi

di sunt. Ad cibum quoque quosdam non desiderantes reduxerunt hi, qui inter epulantes eos collocaverunt.

Omni-  
bus vero sic affectis somnus & dif-  
ficilis, & præcipue necessarius est. sub hoc 5  
enim plerique d sanescunt. Prodest ad id,  
atque etiam ad mentem ipsam componen-  
dam, crocinum unguentum cum irino in  
caput datum. Si nihilominus vigilant, qui-  
dam somnum moliantur potui dando a- 10  
quam, in qua papaver aut hyoscyamus de-  
cocta sint: alii mandragoræ mala pulvino  
subjiciunt: alii vel amomum, vel sycamini  
lachrymam fronti inducunt. Hoc nomen  
apud Medicos reperio. Sed cur Græci mo- 15  
rum *συνόμινον* e appellant, cum mori nulla la-  
chryma sit? Sic vero significatur lachryma  
arboris in Ægypto nascentis, quam ibi  
*συνόμορον* appellant. Plurimi decoctis papa-  
veris corticibus, ex ea aqua cum spongia os 20  
& caput subinde fovant.

Asclepiades ea supervacua esse dixit:  
quoniam in lethargum sæpe convertunt.  
Præcepit autem, ut primo die, à cibo, po-  
tione, somno abstineretur: vespere ei dare- 25  
tur potui aqua: tum frictio admoveretur  
lenis, ita ut ne manum quidem, qui frica-  
ret, vehementer imprimeret: postero dein-  
de die, iisdem omnibus factis, vespere ei  
daretur sorbitio & aqua, rursusque frictio 30  
adhiberetur. Per hanc enim nos consecu-  
turos, ut somnus accedat. Id interdum fit,  
& quidem adeo, ut, illo confitente, nimia  
fricatio etiam lethargi periculum afferat.  
Sed

d Aph. II. 2, e Bodæus à Stapel ad Theophrast.  
Histor. Plant. IV, 2.

Sed si sic somnus non accessit, tum demum illis medicamentis arcessendus est: habita scilicet eadem moderatione, quæ hic quoque necessaria est; ne, quem obdormire volumus, excitare postea non possimus. Confert etiam aliquid ad somnum filanus juxta cadens; vel gestatio \* post cibum, & noctu; maximeque lecti suspensi motus.

Neque alienum est, si neque sanguis ante missus est, neque mens constat, neque somnus accedit, † occipitio inciso cucurbitulam admovere: quæ quia levat morbum, potest somnum facere. Moderatio autem in cibo quoque adhibenda est: nam neque æger est implendus, ne insaniat: neque jejuni utique vexandus est, ne imbecillitate in cardiacum incidat. Opus est autem cibo infirmo, maximeque sorbitionis, & potionis aquæ mulsæ, cujus ternos cyathos hieme, æstate vero quatuor dedisse satis est.

Alterum genus insanix est, quod spatium longius recipit; quia fere sine febre incipit, leves deinde febriculas excitat: & consistit in tristitia, quam videtur bilis fætra contrahere. In hac utilis detractio sanguine est. Si quid hanc prohibet, prima est abstinentia: secunda, per album veratrum vomitumque purgatio: post utrumlibet, adhibenda bis die frictio est. Si magis valeret, frequens etiam exercitatio; in jejuno vomitus; cibus, sine vino, dandus ex media materia est. Quam quoties posuero, scire licet, etiam ex infirmissima dari posse,

K 5 dum

\* Coel. Aurel. A.M. I. 15. p. 46. † Coel. Aurel. I. c. 11. p. 27. f Aretæus de Morb. Diut. 1, 6. Trallian. I, 16.



dum ne ea sola quis utatur : valentissimam tantummodo esse removendam. Præter hæc , servanda alvus est quam tenerrima : removendi terrores , & potius bona spes afferenda : quærenda delectatio ex fabulis , ludisque , quibus maxime capi sanus assueverat : laudanda , si qua sunt , ipsius opera , & ante oculos ejus ponenda : leviter objurganda vana tristitia : subinde admonendus , in his ipsis rebus , quæ sollicitant , cur non potius lætitiæ , quam sollicitudinis causa sit. Si febris quoque accessit , sicut aliæ febres curanda est.

Tertium insanix genus est ex his longissimum ; adeo ut vitam ipsam non impediat. quod robusti corporis esse consuevit. Hujus autem species duæ sunt. Nam quidam imaginibus , non mente fallunt ; qualem insanientem Ajacem vel Orestem poetarum fabulæ ferunt : quidam animo desipiunt. Si imagines fallunt , ante omnia videndum est , tristes , an hilares sint. In tristitia , nigrum veratrum dejectionis causa ; in hilaritate , album , ad vomitum excitandum , dari debet. Idque , si in potione non accipit , pani adjiciendum est , quo facilius fallat. Nam , si bene se purgaverit , ex magna parte morbum levabit. Ergo etiam , si semel datum veratrum parum profecerit , interposito tempore iterum dari debet. Neque ignorare oportet , leviolem esse morbum cum g risu , quam serio insanientium. Illud quoque perpetuum est in omnibus morbis , ubi ab inferiore parte purgandus aliquis

aliquid est, h ventrem ejus ante solvendum esse: ubi à superiore, comprimendum.

Si vero consilium insanientem fallit, tormentis quibusdam optime curatur. Ubi  
 5 perperam aliquid dixit, aut fecit, fame, vinculis, plagis coercendus est. Cogendus est & attendere, & ediscere aliquid, & meminisse. Sic enim fiet, ut paulatim metu cogatur considerare, quid faciat. Subito  
 10 etiam terreri, & expavescere, in hoc morbo prodest; & fere, quicquid animum vehementer perturbat. Potest enim quædam fieri mutatio, cum ab eo statu mens, in quo fuerat, abducta est. Interest etiam, si ipse sine  
 15 causa subinde rideat, an mæstus demissusque sit. Nam dementis hilaritas terroribus his, de quibus supra dixi, melius curatur. Si nimia tristitia est, prodest lenis, sed multa bis die frictio: item super caput aqua frigida infusa, demissumque corpus in aquam  
 20 & oleum.

Illa communia sunt: insanientes vehementer exerceri debere; multa frictione uti; neque pinguem carnem, neque vinum  
 25 assumere; cibis uti post purgationem, ex media materia, quam levissimis, non oportere esse vel solos, vel inter ignotos, vel inter eos, quos aut contemnant, aut negligant; mutare debere regiones, & si mens  
 30 redit, annua peregrinatione esse jactandos.

Raro, sed aliquando tamen, ex metu delirium nascitur. Quod genus insanientium, specie simile, similique victus genere curandum est: præterquam quod in  
 hoc

156 A. CORN. CELSI Lib. 3.  
hoc insanix genere solo recte vinum da-  
tur.

C A P. XIX.

a De Cardiacis.

5  
**H**IS morbis præcipue contrarium est  
id genus, quod καρδιακὸν à Græcis  
nominatur; quamvis sæpe ad eum  
phrenitici transeunt: siquidem mens in  
illis laborat, in hoc vero constat. Id au- 10  
tem nihil aliud est, quam nimia imbecil-  
litas corporis; quod, stomacho languente,  
immodico sudore digeritur. Licetque pro-  
tinus scire id esse, ubi venarum exigui im-  
becillique pulsus sunt; sudor autem supra 15  
consuetudinem, & modo, & tempore, ex  
toto thorace, & cervicibus, atque etiam  
ex capite prorumpit, pedibus tantummo-  
do, & cruribus siccioribus, atque frigidis.  
Acuti id morbi genus est. 20

Curatio prima est, supra præcordia im-  
ponere, quæ reprimunt, cataplasmata: se-  
cunda, sudorem cohibere. Id præstat acer-  
bum oleum, vel rosa, vel melinum, aut  
myrteum. Quorum aliquo corpus leniter 25  
perungendum; ceratumque ex aliquo ho-  
rum tum imponendum est.

Si sudor vincit, delinendus homo est  
vel gypso, vel argenti spuma, vel cimolia  
creta, vel subinde horum pulvere resper- 30  
gendus. Idem præstat pulvis ex contritis  
aridæ myrti vel rubi foliis, aut ex austeri  
& boni vini arida fece. Pluraque similia  
sunt, quæ si desunt, satis utilis est quilibet  
ex

a Cœl. Aurelian. Acnt. Morb. II, 30, 31. Tral-  
lian. VII, 9.

ex via pulvis injectus. Super hæc vero, quo minus corpus insudet, levi veste debet esse contactus, positusque loco non calido, fenestris patentibus, sic ut perflatus quoque aliquis accedat.

Tertium auxilium est, imbecillitati jacentis cibo vinoque succurrere. Cibus non multus quidem, sed sæpe tamen nocte ac die dandus est; ut nutriat, neque oneret. Is esse debet ex infirmissima materia, & stomacho aptus. Nisi autem necesse est, ad vinum festinare non oportet. Si verendum est, ne deficiat, tum & intrita ex hoc, & hoc ipsum austerum quidem, sed tamen tenue, meraculum, egelidum subinde & liberaliter dandum est; adjecta polenta, si modo is æger parum cibi assumit. Idque vinum esse debet, neque nullarum virium, neque ingentium: recteque tota die ac nocte, duas vel tres heminas æger bibet; si vastius corpus est, plus etiam: si cibum non accipit, perunctum ante perfundere aqua frigida convenit, & tum dare.

Quod si stomachus resolutus parum continet, & ante cibum, & post eum sponte vomere oportet; rursusque post vomitum cibum sumere. Si ne is quidem manserit, sorbere vini cyathum, interpositaque hora, sumere iterum. Si id quoque stomachus reddiderit, totum corpus bulbis contritis superillinendum est: qui, ubi inaruerunt, efficiunt, ut vinum in stomacho contineatur, exque eo toti corpori calor venisque vis redeat.

Ulti-

Ultimum auxilium est, in alvum ptisanæ vel alicæ cremorem ex inferioribus partibus indere, siquidem id quoque vires tuetur. Neque alienum est, naribus quoque æstuantis admovere, quod reficiat; ut est rosa & vinum: &, si qua in extremis partibus frigent, unctis & calidis manibus fovere. Per quæ si consequi potuimus, ut & sudoris impetus minuatur, & vita prorogetur, incipit jam tempus ipsum esse præsidio. Ubi esse in tuto videtur, verendum tamen est, ut ne in eandem imbecillitatem cito recidat. Itaque, vino tantum remoto, quotidie validiorem cibum debet assumere; donec satis virium corpori redeat. 15

## C A P. XX.

*De Lethargicis.*

**A**LTER quoque morbus est; aliter phrenitico † contrarius. In eo difficilior somnus, prompta ad omnem audaciam mens est: in hoc marcor, & inexpugnabilis pene dormiendi necessitas. λήθαργον Græci nominarunt. Id quoque genus acutum est, &, nisi succurritur, celeriter jugulat. 25

Proinde ex eo ægros quidam excitare nituntur, admotis his, per quæ sternutamenta evocantur, & his, quæ odore foedo movent, qualis est pix usta, lana succida, piper, veratrum, castoreum, acetum, allium, cepa. Juxta etiam galbanum incendunt, aut cornu cervinum: si non est, quodlibet aliud. Hæc enim cum comburuntur, odore foedo movent. Thar- 30

† Alex. Trall. l. 14. \* Coel. Aur, M. A. L. II. c. 1. a Trallian. l. 15. Aretæus de Morbor. Acut. Curat. l. 2.



Tharrias vero quidam , accessionis esse id malum , dixit , levatique , cum ea decessit. Iraque eos , qui subinde excitant , sine usu male habere. Interest autem , in decessione  
 5 expergiscatur æger , an , cum febris levatur , aut , levata quoque ea , somnus urgeat. Nam si expergiscitur , adhibere ei , ut sopito , supervacuum est. neque enim vigilando melior fit ; sed per se , si melior est , vigi-  
 10 lat. Si vero continens ei somnus est , utique excitandus est ; sed his temporibus , quibus febris levissima est , ut excernat aliquid , & sumat. Excitat autem validissime repente aqua frigida superinfusa. Post  
 15 remissionem itaque , perunctum oleo multo totum corpus , tribus aut quatuor amphoris totum per caput perfundendum est. Sed hoc utemur , si æqualis ægro spiritus erit , si mollia præcordia. Sin aliter  
 20 hæc erunt , ea potiora , quæ supra comprehensa sunt. Et , quod ad somnum quidem pertinet , commodissima hæc ratio est.

Medendi autem causa , caput radendum ; deinde posca fovendum est , in qua laurus ,  
 25 aut ruta decocta sit. Altera vero die imponendum castoreum , aut ruta ex aceto contrita , aut lauri baccæ , aut hedera cum rosa & aceto. Præcipueque proficit , & ad excitandum hominem , naribus admo-  
 30 tum ; & ad morbum ipsum depellendum , capiti frontivi impositum sinapi. Gestatio etiam in hoc morbo prodest : maximeque opporune cibus datus , id est , in remissione , quanta maxima inveniri poterit. Ap-  
 tissima

rissima autem sorbitio est, donec morbus decrefcere incipiat. Si autem quotidie gravis accessio est, hæc quotidie detur: si alternis, post graviozem, sorbitio; post leviozem, mulla aqua. Vinum quoque cum tempestivo cibo datum non mediocriter adjuvat.

Quod si post longas febres ejusmodi torpor accessit, cætera eadem servanda sunt. Ante accessionem autem, tribus quatuorve horis, si venter astrictus est, dandum est castoreum cum scammonia; si non est, per se ipsum castoreum cum aqua dandum est. Si præcordia mollia sunt, cibus utendum est plenioribus: si dura, in iisdem sorbitionibus subsistendum; imponendumque præcordiis, quod simul & reprimat & emolliat.

451.

## C A P. XXI.

20

## a De Hydropicis.

**S**ED hic quidem acutus est morbus. Longus vero fieri potest eorum, quos aqua inter cutem male habet: nisi enim primis diebus succurritur, in ὑδρωπα, quam Græci vocant, incidunt. Ejus tres species sunt. Nam modo, ventre vehementer intento, creber intus, ex motu spiritus, sonus est: modo corpus inæquale est, tumoribus aliter aliterque per totum id orientibus: modo intus in uterum aqua contrahitur; & moto corpore, ita movetur, ut impetus ejus conspici possit. Primum, τυμπαίτην: secundum, λευκοφλεγματίαν, vel

a Aretæus de Diuturn. Morb. II, 1.

vel ὑπὸ τὴν σάρκα ; tertium ἀσπίτην Græci nominarunt. Communis tamen omnium est humoris nimia abundantia : ob quam ne ulcera b quidem in his ægris facile sanescunt. Sæpe vero hoc malum per se incipit : 68, 7. sæpe alteri vetusto morbo , maximeque quartanæ , supervenit.

Facilius in servis , quam in liberis tollitur. quia , cum desideret famem , sitim , & 10 mille alia tædia , longamque patientiam , promptius iis succurritur , qui facile coguntur , quam quibus inutilis libertas est. Sed ne hi quidem , qui sub alio sunt , si ex toto sibi temperare non possunt , ad salutem 15 perducuntur. Ideoque non ignobilis medicus , Chryssippi discipulus , apud Antigonom regem , amicum quendam ejus , notæ intemperantiæ , mediocriter eo morbo implicitum , negavit posse sanari. Cum- 20 que alter medicus Epirotes Philippus se sanaturum polliceretur ; respondit , illum ad morbum ægri respicere ; se , ad animum. Neque eum res fefellit. Ille enim cum summa diligentia non medici tantum- 25 modo , sed etiam regis custodiretur , tamen malagmata sua devorando , bibendoque suam urinam , in exitium sese præcipitavit.

Inter initia tamen , non difficillima curatio est , si imperata sunt corpori , quies , 30 sitis , inedia. At si malum inveteravit , non sine magna mole discutitur. † Metrodorum tamen , Epicuri discipulum , referunt , cum hoc morbo tentaretur , neque æquo animo necessarium sitim sustineret , ubi diu

L ab-

b Aph. VI. 8. † ejus vitam describit Diogenes Laertius.

abstinuerat, solitum bibere, deinde evomere. Quod, si redditur, quicquid receptum est, multum tædio demit: si à stomacho retentum est, morbum auget. ideoque in quolibet tentandum non est.

5

Sed si febris quoque est, hæc in primis submovenda est per eas rationes, per quas huic succurri posse propositum est. Si sine febre æger est, tum demum ad ea veniendum est, quæ ipsi morbo mederi solent. 10  
Atque hic quoque, quæcumque species est, si nondum nimis occupavit, iisdem auxiliis opus est. Multum ambulandum, currendum aliquando, & superiores maxime partes sic perfricandæ, ut calorem in cutem evocet: inter quæ, spiritum ipse continet. Evocandus est sudor, non per exercitationem tantum, sed etiam in arena calida, vel laconico, vel clibano, similibusque aliis: maximeque utiles sunt natura 20  
les, & siccæ sudationes; quales super b Batas habemus in myrtetis. Balneum, atque 93, II. omnis humor alienus est. Jejuno recte carapotia dantur, facta ex duabus apsinthii, myrrhæ tertia parte.

25

Cibus esse debet ex media d quidem materia, sed tamen generis durioris. Potio non ultra danda est, quam ut vitam sustineat: optimaque est, quæ urinam movet. Alvum moliri cibo melius est, quam 30  
medicamento. Si tamen res coget, ex his aliquid, quæ id præstant, erit decoquendum, eaque aqua potui danda. Videntur autem hanc facultatem habere, iris, nardum,

dum, crocum, cinnamomum, cassia, myr-  
 rha, balsamum, galbanum, ladanum,  
 œnanthe, epanaces, cardamomum, hebe-  
 nus, cupressi semen, uva taminia, quam  
 5 *σαφίδα ἀγρία* Græci nominant, abrota-  
 num, rosæ folia, acorum, amaræ nuces,  
 tragoriganum, styrax, costum, junci qua-  
 drati & rotundi flos; illum *κύπειρον*, hunc  
*σχοῖνον* Græci vocant. quæ quoties posuero,  
 10 non quæ hic nascuntur, sed, quæ inter aro-  
 mata afferuntur, significabo. Primo tamen,  
 quæ lenissima ex his sunt, id est, rosæ fo-  
 lia, vel nardi spica, tentanda sunt. Vinum  
 quoque utile est austerum, sed quam te-  
 15 nuissimum.

Commodum est etiam, lino quotidie  
 ventrem metiri, & qua comprehendit al-  
 vum, notam imponere: postero quoque  
 die videre, plenius corpus sit, an extenuet-  
 20 tur. id enim, quod extenuatur, medicinam  
 sentit. Neque alienum est, metiri & po-  
 tionem ejus, & urinam. nam si plus hu-  
 moris excernitur, quam assumitur, ita de-  
 mum secundæ valetudinis spes est. Ascle-  
 25 piades in eo, qui ex quartana in hydro-  
 pa deciderat, se abstinentia bidui, & fri-  
 catione usum; tertio die, jam & febre, &  
 aqua liberato, cibum, & vinum dedisse,  
 memoriæ prodidit. Hactenus communi-  
 30 ter de omni specie præcipi potest: si ve-  
 hementius malum est, diducenda ratio cu-  
 randi est.

Ergo, si inflatio, & ex ea dolor creber  
 est, utilis quotidianus, aut altero quoque

L 2 die



die post cibum, vomitus est. Fomentis de-  
 inde siccis calidisque utendum est. Si per  
 hæc dolor non finitur, necessariæ sunt sine  
 ferro cucurbitulæ. Si ne per has quidem  
 tormentum tollitur, incidenda cutis est, &  
 tum his utendum. Ultimum auxilium est,  
 si cucurbitulæ nihil profuerunt, per alvum  
 infundere copiosam aquam calidam, eam-  
 que recipere. Quin etiam quotidie ter qua-  
 terve opus est uti fricatione vehementi,  
 cum oleo & quibusdam calefacientibus. Sed  
 in hac frictione à ventre abstinendum est.  
 Imponendum vero in eum crebrius sina-  
 pi, donec cutem erodat; ferramentisque  
 candentibus pluribus locis venter exulce-  
 randus est, & servanda ulcera diutius.  
 Utiliter etiam scilla cocta deligatur super  
 cutim. Sed diu post has inflationes absti-  
 nendum est ab omnibus inflationibus.

At, si id vitium est, cui λευκοφλεγματία  
 nomen est, eas partes, quæ tument, subji-  
 cere soli oportet; sed non nimium, ne febric-  
 ulam incendat: si is vehementior est, ca-  
 put velandum est, utendumque fricatione,  
 madefactis tantum manibus aqua, cui sal  
 & nitrum & olei paulum sit adjectum; sic,  
 ut aut puerilis aut muliebres manus adhi-  
 beantur, quo mollior earum tactus sit.  
 Idque si vires patiuntur, ante meridiem,  
 tota hora; post meridiem, semihora fieri  
 oportet. Utilia sunt etiam cataplasmata,  
 quæ reprimunt; maximeque, si corpora  
 teneriora sunt. Incidendum quoque super  
 talum, quatuor fere digitis, ex parte in-  
 teriore

teriore est ; quo per aliquot dies frequens humor feratur : atque ipsos tumores incidere altis plagis oportet : concutiendumque corpus est multa gestatione , atque , ubi inductæ vulneribus cicatrices sunt , adjiciendum exercitationibus & cibus , donec corpus ad pristinum statum revertatur. Cibus valens esse debet , & glutinosus , maximeque caro. Vinum , si per stomachum licet , dulcius. sed ita , ut invicem biduo tri-  
 10 duove , modo aqua , modo id bibatur. Prodest etiam lactucæ marinæ , quæ grandis juxta mare nascitur , semen , cum aqua potui datum. Quod si valens est , qui id  
 15 accipit , ei scilla cocta simul super ventrem deligatur. Authoresque multi sunt , inflatis vesicis pulsandos tumores esse.

Si vero id morbi genus est , quo in uterum multa aqua contrahitur , ambulare ,  
 20 sed magis modice oportet ; malagma , quod digerat , impositum habere ; idque ipsum superimposito triplici pannō , fascia , non nimium tamen vehementer , alstringere. quod à Tharria profectum , servatum esse  
 25 à pluribus video. Si jecur , aut lienem affectum esse , manifestum est , ficum pinguem contusam , adjecto melle , superponere. Si per talia auxilia venter non siccatur , sed humor nihilominus abundat , celeriori via  
 30 succurrere , ut is per ventrem ipsum emitatur. Neque ignoro , Erasistrato displicuisse hanc curandi viam. morbum enim hunc jecineris putavit : ideoque illud esse sanandum ; frustra que aquam emitti , quæ ,

vitiato illo , subinde renascantur. Sed primum , non hujus visceris unius hoc vitium est. Nam & splene affecto , & in totius corporis malo habitu fit. Deinde , ut inde cœperit , tamen aqua nisi emittitur , quæ contra naturam ibi substiterit , & jecinori , & cæteris interioribus partibus nocet. Convenitque , corpus nihilominus esse curandum. Neque enim sanat emissus humor , sed medicinæ locum facit , quam intus inclusus 10 impedit. Ac ne illud quidem in controversiam venit , quin non omnes in hoc morbo sic curari possint ; sed juvenes robusti , qui vel ex toto carent febre , vel certe satis liberales intermissiones habent. 15 Nam quorum stomachus corruptus est , quive ex atra bile huc deciderunt , quique malum corporis habitum habent , idonei huic curationi non sunt. Cibus autem , quo die primum humor emissus est , supervacuus est , nisi si vires desunt. In sequentibus diebus , & his vinum meracius quidem , sed non ita multum dari debet , paulatimque revocandus æger est ad exercitationes , fricationes , solem , sudationes , fati- 25 gationes , & idoneos cibos , donec ex toto convalescat. Balneum rarum res amat ; & frequentiore in jejuno vomitum. Si æstas est , in mari natare commodum est. Ubi convaleuit aliquis , diu tamen alienus ei verneris usus sit. 30

## C A P. XXII.

## De Tabæ, &amp; ejus speciebus.

**D**IUTIUS sæpe & periculofius tabes  
 5 eos male habet, quos invafit. Atque  
 hujus quoque plures † species funt.  
 Una eft, qua corpus non alitur, &, natura-  
 liter femper aliquibus decedentibus, nullis  
 vero in eorum locum fubeuntibus, fuma  
 10 macies oritur; &, nifi occurritur, tollit.  
 \* ἀργοφίαν hanc Græci nominant. Ea duabus  
 fere de caufis incidere confuevit. Aut enim  
 nimio timore aliquis minus, aut aviditate  
 nimia plus, quam debet, affumit: ita vel,  
 15 quod deeft, infirmit: vel, quod fuperat,  
 corrumpitur.

Altera fpecies eft, quam Græci καχεξίαν  
 appellant: ubi malus corporis habitus eft;  
 ideoque omnia alimenta corrumpuntur.  
 20 Quod fere fit, cum longo morbo vitiata  
 corpora, etiamfi illo vacant, refectionem  
 ramen non accipiunt; aut cum malis medi-  
 camentis corpus affectum eft; aut, cum diu  
 neceffaria defuerunt; aut, cum inufitatos &  
 25 inutiles cibos aliquis affumpfif, aliquidve  
 fimile incidit. Huic, præter tabem, illud  
 quoque nonnunquam accidere folet, ut per  
 affiduas pufiulas, aut ulcera, fuma cutis  
 exafperetur, vel aliqua corporis partes in-  
 30 tumefcant.

Tertia eft, longeque periculofiffima fpe-  
 cies, quam Græci φθίσιον nominaverunt.  
 Oritur fere à capite: inde in pulmonem di-  
 ftillat. Ex hoc exulceratio accidit, & febri-

L 4

cula

† Erant apud veteres qui tabem & longos morbos  
 inducere poterant, Philo Judæus de fpecialib. leg.  
 16. pag. 792. & 1691. \* Cœl. Aurel. Morb.  
 Chron. II. 14.

72, 1. cula lenis fit; quæ etiam, cum quievit, tamen repetit. In ea quoque frequens tussis est, & pus excreatur; interdum cruentum aliquid. Quicquid excreatum est, si in ignem a positum est, mali odoris est. Itaque, qui de morbo dubitant, hac nota utuntur.

b Cum hæc genera tabis sint, animadvertere primum oportet, quid sit in quo laboratur. Deinde, si tantum non ali corpus apparet, causam ejus attendere; &, si cibi minus assum sit aliquis quam debuit, adjicere oportet: sed paulatim, ne si corpus insuetum subita multitudine oneraverit, stomachus gravetur, & concoctionem impediat. Si vero plus justo quis assumere solitus est, abstinere uno die; deinde ab exiguo cibo incipere; quotidie adjicere, donec ad justum modum perveniat. Præter hæc convenit ambulare locis quam maxime frigidis, sole vitato: per manus quoque exerceri. Si infirmior est, gestari, ungi, perfricari, si potest, maxime per seipsum, sæpius eodem die, & ante cibum, & post eum, sic ut interdum oleo quædam adjiciantur calefacientia, donec insudet. Prodestque je- juno prehendere per multas partes cutem, & attrahere, ut relaxetur; aut, imposita resina, & abducta, subinde idem facere. Utile est etiam interdum balneum, sed post cibum exiguum. Atque in ipso solio recte cibi aliquid assumitur: aut si sine hoc fricatio fuit, post eam protinus. Cibi vero esse debent ex his, qui facile concoquuntur, maximeque alunt. Ergo vini quoque, sed au-

a Aphor. V, 11. Coel. Aurelian. Morbor. Chronic. II. 14. p. 421. Trallian. V, 2.



austeri, necessarius usus est, movendæ urinæ.

At si malus habitus corporis est, primum abstinendum est; deinde alvus ducenda; tum paulatim cibi dandi, adjectis exercitationibus, unktionibus, fricationibus. Utilius his frequens balneum est, sed jejunis; etiam usque ad sudorem. Cibis vero opus est copiosis, variis, boni succi, quique etiam minus facile corrumpantur, vino austero. Si nihil reliqua proficiunt, sanguis mittendus est; sed paulatim, quotidieque pluribus diebus, cum eo, ut cætera quoque eodem modo serventur.

Quod si mali plus est, & vera phthisis est, inter initia protinus occurrere necessarium est: neque facile enim hic morbus, cum inveteraverit, evincitur. Opus est, si vires patiuntur, longa navigatione, cæli mutatione sic, ut densius quam id est, ex quo discedit æger, petatur. Ideoque aptissime Alexandriam ex Italia itur. Fereque id posse inter principia corpus pati debet, cum hic morbus ætate firmissima maxime oriatur, id est ab anno duodevigesimo usque ad annum quintum & trigessimum. Si id imbecillitas non finit, nave tamen, sed non longe, vectari commodissimum est. Sin navigationem aliqua res prohibet, lectica, vel alio modo corpus movendum est: tum à negotiis abstinendum est, omnibusque rebus, quæ sollicitare animum possunt: somno indulgendum: cavendæ distillationes, ne, si quid cura levarit, exasperent; & ob id, vitanda cruditas,

L 5 ditas,

b Aretæus de Diurn. Curat. I, 8. Trallian. VII, 2. Plin. N. H. xxviii, 4. c Aphor. V, 9. VIII, 7.

ditas , simulque & sol , & frigus : os obte-  
 gendum , fauces velandæ , tussicula suis  
 remediis finienda : & , quamdiu quidem  
 febricula incurfat , huic interdum absti-  
 nentia , interdum etiam tempestivis cibis  
 medendum : eoque tempore bibenda aqua.  
 Lac d quoque , quod in capitis doloribus , &  
 in acutis febribus , & per eas facta nimia  
 fiti , ac , sive præcordia tument , sive bi-  
 liosa urina est , sive sanguis fluxit , pro ve- 10  
 neno est ; in † phthisi tamen , sicut in omni-  
 bus longis difficilibusque febriculis , recte  
 dari potest.

Quod si febris aut nondum incurfat , aut  
 jam remisit , decurrendum est ad modi- 15  
 cas exercitationes , maximeque ambula-  
 tiones , item lenes fricationes. Balneum  
 alienum est. Cibus esse debet primo acer ,  
 ut allium , porrum , idque ipsum ex aceto ,  
 vel ex eodem intubus , ocimum , lactuca : 20  
 deinde lenis sorbitio ex prisana , vel ex  
 alica , vel ex amylo , lacte adjecto. Oryza  
 quoque , & , si nihil aliud est , far idem præ-  
 stat. Tum invicem modo his cibis , modo  
 illis utendum est : adjiciendaque quædam 25  
 ex media materia , præcipue vero ex pri-  
 ma , cerebellum , vel pisciculus , & his si-  
 milia. Farina etiam cum sevo ovillo ca-  
 prinove mista , deinde incocta , pro medi-  
 camento est. Vinum assumi debet leve au- 30  
 sterum.

Hactenus non magna mole pugnatur.  
 Si vehementior noxa est , ac neque febricula ,  
 neque tussis quiescit , tenuarique cor-  
 pus

pus apparet, validioribus auxiliis opus est. Exulcerandus est ferro candenti, uno loco sub mento, altero in gutture, duobus ad mammam utramque; item sub imis ossibus scapularum, quas ἰμοπλατάς Græci vocant, sic, ne sanescere sinas ulcera, nisi tussis finita fuerit: cui per se quoque mendendum esse, manifestum est. Tunc ter quaterque die vehementer extremæ partes  
 10 perfricandæ sunt: thorax leni manu pertractandus; post cibum intermittenda hora & perfricanda crura, brachiaque. Interpositis denis diebus, demittendus æger in solium est, in quo sit aqua calida &  
 15 oleum. Cæteris diebus bibenda aqua: tum vinum, si tussis non est, potui frigidum dandum: si vero est, egelidum. Utile est etiam in remissionibus quotidie cibos dari: frictiones gestationesque similiter adhiberi:  
 20 quarto, aut quinto die sumere, interdum herbam sanguinalem ex aceto, vel plantaginem esse. Medicamentum est etiam vel plantaginis succus per se, vel e marrubii, si cum melle sit incoctus; ita ut illius cyathus sorbeatur, hujus cochleare plenum paulatim delingatur; vel inter se mista, & incocta resinæ terebinthinæ pars dimidia, butyri & mellis pars altera. Præcipua tamen ex his omnibus sunt victus, vehiculum, & navis, & sorbitio. Alvus cito utique vitanda est. Vomitus in hoc morbo frequens, perniciosus est, maximeque sanguinis. Qui meliusculus esse cœpit, ad-  
 30 jicere debet exercitationes, fricationes, ci-  
 bos: 91, 34.

e Trallian. v, 3. pag. 276. f Aph. v, 12, 14.  
 Trallian. 11, 2. p. 313,

205, 4. bos: deinde ipse se, suppresso spiritu, perfricare; diu abstinere à vino, † balneo, venere.

## C A P. XXIII.

a De Comitiali morbo.

5

73, 20. **I**NTER notissimos morbos est etiam is, qui \* comitialis, vel major nominatur. Homo subito concidit, ex ore spumæ moventur, deinde interposito tempore ad 10 se redit, & per seipsum consurgit. Id genus sæpius viros, quam fœminas occupat; ac solet quidem etiam longum esse, usque ad mortis diem, & vitæ non periculosum. Interdum tamen cum recens est, hominem 15 consumit; & sæpe eum, si remedia non sustulerunt, in b pueris veneris, in puellis menstruorum initium tollit. Modo cum distentione membrorum aut nervorum prolabitur aliquis; modo sine illa. 20

47, 4. Quidam hos quoque iisdem, quibus lethargicos, excitare conantur: quod admodum supervacuum est: &, quia ne lethargicus quidem his sanatur; &, quia, cum possit ille nunquam expergisci atque ita fame 25 terire, hic ad se utique revertitur.

173, 23, 87, 19. Ubi concidit aliquis, si nulla nervorum distentio accessit, utique † sanguis mitti debet: si accessit, non utique mittendus est, nisi alia quoque hortantur. Necessarium 30 autem est, ducere alvum, vel nigro veratro purgare, vel utrumque facere, si vires patiuntur: tunc caput tondere, oleoque & aceto perungere; cibum post diem tertium,

† Colum. 1. 6. a Aretæus de Diurn. M. 1. 1. c. 4. \* Vocatur: *lues deifica, morbus Sacer.* b Aph. II, 45. V, 7 † Valleriol. 1. 3. obs. 7.

tium, simul ac transit hora, qua concidit, dare. Neque sorbitiones his aut alioqui molles, & faciles cibi; neque caro, minimeque suilla convenit; sed mediæ materiæ: nam 26.  
 5 & viribus opus est, & c cruditates cavendæ sunt. Cum quibus fugere oportet solem, balneum, ignem, omniaque calefacientia: item, frigus, vinum, venerem, loci præcipitis conspectum, omniumque terrentium,  
 10 vomitum, lassitudinem, sollicitudines, negotia omnia: &, ubi tertio die cibus datus est, intermittere quartum, & invicem alterum quemque; eadem hora cibi servata, donec quatuordecim dies transeant. Quos  
 15 ubi morbus excessit, acuti vim deposuit: at si manet, curandus jam ut longus est.

Quod si non, quo die primum is incidit, medicus accessit; sed is, qui cadere consuevit, post ei traditus est; protinus eo genere  
 20 victus habito, qui supra comprehensus est, expectandus est dies, quo prolabatur; utendumque tum vel sanguinis d missione, vel ductione alvi, vel nigro veratro, sicut præ- 172.  
 ceptum est. In sequentibus deinde diebus, 30.  
 25 per eos cibos, quos proposui, viratis omnibus, quæ cavenda dixi, nutriendus est.

Si per hæc morbus finitus non fuerit, confugiendum erit ad album veratrum; ac 87, 19.  
 ter quoque aut quater eo utendum, non ita  
 30 multis interpositis diebus; sic tamen, ne iterum unquam sumat, nisi conciderit. Mediis autem diebus vires ejus erunt nutriendæ; quibusdam, præter ea, quæ supra scripta sunt, adjunctis. Ubi mane expectatus,



ctus est, corpus ejus leniter ex oleo vetere (cum capite, excepto ventre) permulceatur: tum ambulatione quam maxime longa & recta utatur: post ambulationem loco tepido vehementer & diu, ac non minus ducenties, nisi infirmus erit, perfricetur: deinde super caput multa aqua frigida perfundatur; paulum cibi assumat; conquiescat; rursus ante noctem ambulatione utatur; iterum vehementer perfricetur, sic ut neque venter, neque caput contingatur: post hæc cœnet, interpositisque tribus aut quatuor diebus, uno aut altero acria assumat.

Si ne per hæc quidem fuerit liberatus, caput radatur; ungetur oleo vetere, adjecto aceto & nitro; perfundatur aqua salsa; bibat jejunos ex aqua castoreum; nulla aqua, nisi decocta, potionis causa utatur. Quidam jugulati e gladiatoris calido sanguine potu tali morbo se liberarunt. Apud quos miserum auxilium tolerabile miserius malum fecit. Quod ad medicinam vero pertinet, ultimum est, juxta talum, ex utroque crure paulum sanguinis mittere: occipitium incidere, & cucurbitulas admove: ferro candente in occipitio quoque & infra, qua summa vertebra cum capite committitur, adurere duobus locis, ut per ea perniciosus humor evadat. Quibus si finitum malum non fuerit, prope est, ut perpetuum sit. Ad levandum id, tantummodo utendum erit exercitatione, cibisque his, qui supra comprehensi sunt: præcipue-

e Plin. xxviii, 1. Lang. Epist. 14. lib. 1. Minucius Felix. pag. 34. Vide duo exempla ejus nominis indicantia apud Tulpium *obs.* l. 4. c. 4.

Cap. 24.      M E D I C I N A.      175  
cipueque vitanda omnia , quæ ne fierent ,  
excepimus.

C A P. XXIV.

*De Regio morbo.*

5 **Æ**QUE notus est morbus , quem in-  
terdum arquatam , † interdum re-  
gium nominant. Quem Hippocra-  
tes ait , si post septimum diem a febricitante  
10 ægro supervenit , tutum esse , mollibus tan-  
tummodo præcordiis substantibus. Dio-  
cles ex toto , si potest febrim oritur , etiam  
prodelle ; si post hunc febris , occidere. Co- 52, 7.  
lor autem cum morbum detegit , maxime  
15 oculorum , in quibus , quod album esse de-  
bet , fit luteum. Soletque accedere & sitis ,  
& dolor capitis , & frequens singultus , &  
præcordiorum dextra parte durities ; &  
ubi corporis vehemens motus est , spiritus  
20 difficultas , membrorumque resolutio : at-  
que , ubi diutius manet morbus , totum cor-  
pus cum pallore quodam inalbescit.

Primo die abstinere ægrum oportet : se-  
cundo ducere alvum : tum , si febris est ,  
25 eam victus genere discutere : si non est ,  
scammoneam potui dare , vel cum aqua  
betam albam contritam , vel cum aqua  
mulsâ nuces amaras , apsinthium , anisum ,  
sic , ut pars hujus minima sit. Asclepiades  
30 aquam quoque salsam , & quidem per bi-  
dium , purgationis causa bibere cogebat , iis ,  
quæ urinam movent , rejectis. Quidam , su-  
perioribus omissis , per hæc , & per eos cibos ,  
qui extenuant , idem se consequi dicunt.

Ego

† Plin. H. N. 22. c. 24. a Aph. IV, 62.

Ego utique, si satis virium est, validiora; si parum, imbecilliora auxilia præfero. Si purgatio fuit, post eam triduo primo modice cibum oportet assumere ex media materia, & vinum bibere Græcum salsum, 5 ut solutio ventris remaneat: tum altero triduo validiores cibos, & carnis quoque aliquid esse, intraque aquam manere: deinde ad superius genus victus reverti, cum eo, ut magis satiatur; omisso Græco vino bi- 10 bere nigrum austerum; atque ita per hæc variare, ut interdum acres quoque cibos interponat, interdum ad salsum vinum redeat. Per omne vero tempus utendum est exercitatione, fricatione, &, si hiems est, 15 balneo; si æstas, frigidis natationibus: lecto etiam, & conclavi<sup>a</sup> cultiore, usu, loco, ludis, lascivia, aliis, per quæ mens exhilaretur: ob quæ regius morbus dictus videtur. Malagma quoque, quod digerat, super præ- 20 cordia datum prodest; vel arida ibi ficus imposita, si jecur aut lienis affectus est.

## C A P. XXV.

b D: Elephantia.

25

**I**GNOTUS autem pene in Italia, frequentissimus in quibusdam regionibus is morbus est, quem ἐλεφαντίασι Græci vocant; isque longis annumeratur. Quo totum corpus afficitur ita, ut ossa quoque 30 vitari dicantur. Summa pars corporis crebras maculas crebrosque tumores habet. Rubor earum paulatim in atrum colorem convertitur. Summa cutis inæquali-

a Seren. Sammon. de Regio morbo. b Mercurial. Variar. Lect. I, 2.

qualiter crassa, tenuis, dura, mollisque, quasi squamis quibusdam exasperatur, corpus emacrescit, os, suræ, pedes intumescunt. Ubi vetus morbus est, digiti in manibus pedibusque sub tumore conduntur; febricula oritur, quæ facile tot malis obrutum hominem consumit.

Protinus ergo inter initia sanguis per biduum mitti debet; aut nigro veratro venter solvi. Adhibenda triduum, quantum sustinere potest, inedia est: paulum deinde vires reficiendæ & ducenda alvus: post hæc, ubi corpus levatum est, utendum est exercitatione, præcipueque cursu: sudor primum labore ipsius corporis, deinde etiam siccis sudationibus evocandus: frictio adhibenda: moderandumque inter hæc, ut vires conserventur: balneum rarium esse debet: cibus sine pinguibus, sine glutinosis, sine inflantibus. Vinum, præterquam primis diebus, recte datur. Corpus contrita plantago & illita optime tueri videtur.

25 C A P. XXVI.

*De Attonitis.*

30 **A**TTONITOS quoque raro videmus, quorum & corpus & mens stupet. Fit interdum ictu fulminis, interdum morbo. hunc ἀποπληξίαν Græci appellant. His sanguis mittendus est. Veratro quoque albo, vel alvi ductione utendum. Tum adhibendæ fricationes; & ex  
M media-

media materia minime pingues cibi ; quidam etiam acres : & à vino abstinendum.

## C A P. XXVII.

*De Resolutione nervorum.*

5

**A**T resolutio nervorum frequens ubique morbus est. Sed interdum tota corpora , interdum partes infestat. Veteres authores illud a ἀποπληξίαν ; hoc παράλυσιν nominaverunt. nunc utrunque 10 παράλυσιν appellari video. Solent autem ; qui per omnia membra vehementer resoluti sunt , celeriter rapi. ac si correpti non sunt , diutius quidem vivunt ; sed raro tamen ad sanitatem perveniunt ; & plerun- 15 que miserum spiritum trahunt , memoria quoque amissa. In partibus vero nonnunquam acutus , sæpe longus , fere b insanabilis morbus est.

† Si omnia membra vehementer resoluta 20 sunt , sanguinis detractio vel occidit , vel liberat. Aliud curationis genus vix unquam sanitatem restituit ; sæpe mortem tantum differt ; vitam interim infestat. Post sanguinis missionem , si non redit & 25 motus & mens , nihil spei superest : si redit , sanitas quoque prospicitur.

At , ubi pars resoluta est , pro vi & malo corporis , vel sanguis mittendus est , vel alvus ducenda. Cætera eadem in utroque 30 casu facienda sunt. Siquidem vitare præcipue convenit frigus ; paulatimque ad exercitationes revertendum est , sic , ut ingrediatur ipse protinus , si potest. Si id crurum

a Cæl. Aurelian. Acut. Morb. III, 5. b Aretæus de Morb. Diuturn. I, 7. † De præservatione Crato apud Schol. consilio 35, 36.



rum imbecillitas prohibet, vel ~~gestetur~~, 91, 26.  
 vel motu lecti concutiatur: tum id mem-  
 brum, quod deficit, si potest, per se; sin mi-  
 nus, per alium moveatur, & vi quadam ad  
 5 consuetudinem suam redeat. Prodest etiam  
 torpentis membri summam cutem exaspe-  
 rasse, vel urticis cæsam, vel imposito sina-  
 pi, sic, ut ubi rubere cœperit corpus, hæc  
 removeantur. Scilla quoque contrita, bul-  
 10 bique contriti cum thure recte imponun-  
 tur. Neque alienum est, resina cutem ter-  
 tio quoque die diutius vellere, pluribus  
 etiam locis, aliquando sine ferro, cucurbi-  
 tulas admovere. Uctioni vero aptissimum  
 15 est vetus oleum, vel nitrum aceto & oleo  
 admixtum. Quinetiam fovere aqua calida  
 marina; vel, si ea non est, tamen salsa, ma-  
 gnopere necessarium est. Ac, si quo loco  
 vel naturales, vel etiam manufactæ tales  
 20 natationes sunt, iis potissimum utendum  
 est; præcipueque in his agitanda membra,  
 quæ maxime deficiunt. si id non est, bal-  
 neum tamen prodest. Cibus esse debet ex  
 media materia, maximeque ex venatione:  
 25 potio, sine vino, aquæ calidæ. Si tamen  
 vetus morbus est, interponi quarto vel  
 quinto die purgationis causa vinum Græ-  
 cum falsum potest. Post cœnam utilis vo-  
 mitus est.

30 2. De Dolore nervorum.

Interdum vero etiam nervorum dolor  
 oriri solet. In hoc casu non vomere, non  
 medicamentis urinam movere, non exerci-  
 tatione sudores, ut quidam præcipiunt, ex-  
 M 2 pedit.

pedit. Bibenda aqua est bis die. In lectulo  
 leniter satis diu corpus perfricandum est ;  
 deinde, retento spiritu, in ipsa, exercitatio-  
 ne potius superiores partes movendæ :  
 balneo raro utendum : mutandum subin- 5  
 de peregrinationibus cœlum. Si dolor est,  
 ea ipsa pars sine oleo, nitro ex aqua perun-  
 genda est; deinde involvenda, & subjicien-  
 da pruna lenis, & sulphur; atque ita id suf-  
 fumigandum; idque aliquandiu facien- 10  
 dum, sed jejuno, cum bene jam concoxe-  
 rit. Cucurbitulæ quoque sæpe dolenti par-  
 ti admovendæ sunt, pulsandusque leniter  
 inflaris vesicis bubulis is locus est. Utile est  
 etiam sebum miscere cum cumini & ur- 15  
 ticæ contritis seminibus, sic, ut omnium  
 par modus sit, idque imponere: fovere  
 aqua, in qua sulphur decoctum sit. Utricu-  
 li quoque recte imponuntur aqua calida  
 repleti, aut bitumen cum hordeacea farina 20  
 mixtum. Atque in ipso potissimum dolore,  
 utendum gestatione vehementi est. quod  
 in aliis doloribus pessimum est.

3. *De Tremore nervorum.*

Tremor autem nervorum æque vomitu 25  
 medicamentisque urinam moventibus in-  
 tenditur. Inimica etiam habet balnea, assa-  
 que sudationes. Bibenda aqua est: acri am-  
 bulatione utendum, item unctionibus, fri-  
 cationibusque, maxime per seipsum: pila, 30  
 similibusque superiores partes dimovendæ:  
 cibo quolibet utendum, dummodo con-  
 coctioni utique studeatur. Secundum ci-  
 bum, curis abstinendum: rarissima venere  
 uten-

utendum est. Si quando quis in eam prolapsus est, tum oleo leniter diuque in lectulo perfricari manibus puerilibus potius, quam virilibus, debet.

5 4. De Suppurationibus internis.

Suppurationes autem, quæ in aliqua interiori parte oriuntur, ubi ortæ fuerint, primum id agere oportet per ea cataplasmata, quæ reprimunt, ne coitus inutilis  
 10 materiæ fiat. deinde, si hæc victa sunt, ut per ea malagmata, quæ digerunt, dissipetur. 263.  
 Quod si consecuti non sumus, sequitur, ut evocetur: deinde, ut maturescat. omnis tum vomicæ finis est, ut rumpatur.  
 15 Indiciumque est, pus vel alvo vel ore redditum. Sed nihil facere oportet, quominus, quicquid est puris, exeat. Utendum maxime sorbitionibus est, & aqua calida. Ubi  
 20 pus ferri desit, transeundum ad faciles quidem, sed tamen validiores & frigidos cibos, frigidamque aquam sic, ut ab egelidis tamen initium fiat. primoque cum melle  
 quædam edenda, ut nuclei pinei, vel Græcæ nuces, vel avellanæ. Postea submoven-  
 25 dum id ipsum, quo maturius induci cicatrix possit. Medicamentum eo tempore ulceri est, succus assumptus vel porri vel marrubii, & omni cibo porrum ipsum adjectum. O-  
 30 portebit autem uti in his partibus, quæ non afficiuntur, frictionibus, item ambulationibus lenibus. Vitandumque erit, ne vel luctando, vel currendo, vel alia ratione sanescencia ulcera exasperentur. In hoc enim morbo perniciosus, ideoque omni modo cavendus sanguinis vomitus est.

## LIBER QUARTUS.

## CAP. I.

*De humani corporis interioribus sedibus.* 5

**H**ACTENUS reperiuntur ea genera morborum, quæ in totis corporibus ita sunt, ut iis certæ sedes assignari non possint: nunc de his dicam, quæ sunt in 10 partibus. Facilius autem omnium interiorum morbi † curationesque in notitiam venient, si prius eorum sedes breviter ostendero. 7, 2.

Caput igitur, eaque, quæ in ore sunt, non 15 lingua tantummodo palatoque terminantur, sed etiam, quatenus oculis nostris exposita sunt. In dextra sinistraque circa guttur venæ grandes, quæ σφαγιτιδες nominantur; itemque arteriæ (quas καρωτιδες 20 vocant) sursum procedentes ultra aures 46, 26. feruntur. Atque in ipsis cervicibus glandulæ positæ sunt, quæ interdum cum dolore intumescunt. Deinde duo itinera incipiunt: alterum, \* asperam arteriam nomi- 25 nant; alterum, stomachum. Arteria exterior ad pulmonem: stomachus interior ad ventriculum fertur. illa spiritum: hic cibum recipit. Quibus cum diversæ viæ sint, qua coeunt, exigua in arteria sub ipsis 30 faucibus lingula est: quæ, cum spiramus, attollitur; cum cibum potionemque assumimus, arteriam claudit. Ipsa autem arteria, dura & cartilaginosa, in gutture assurgit,

† Soran. Ephes. Isagog. cap. xii. \* i. e. Gulam. Mercurial, Var. Lect. I. c. 1.

git ; cæteris partibus residit. Constat ex  
 circulis quibusdam , compositis ad imagi-  
 nem earum vertebratum , quæ in spina  
 sunt . ita tamen , ut ex parte exteriori  
 5 aspera ; ex interiori , stomachi modo læ-  
 vis sit. eaque descendens ad præcordia  
 cum pulmone committitur. Is spongio-  
 sus , ideoque spiritus capax , & à tergo  
 spinæ ipsi junctus , in duas\* fibras , ungu-  
 10 bubulæ modo , dividitur. Huic cor an-  
 nexum est , natura musculosum , in pectore  
 sub sinisteriore mamma situm ; duosque  
 quasi ventriculos habet. At sub corde at-  
 que pulmone , transversum ex valida mem-  
 15 brana septum est , quod à præcordiis ute-  
 rum diducit , æque nervosum ; multis etiam  
 venis per id discurrentibus ; à superiore  
 parte , non solum intestina , sed jecur quo-  
 que lienemque discernit. Hæc viscera pro-  
 20 xime , sed infra tamen posita , dextra si-  
 nistraque sunt. Jecur à dextera parte sub  
 præcordiis ab ipso septo orsum , intrin-  
 secus cavum , extrinsecus gibberum est.  
 quod prominens leviter ventriculo infi-  
 25 det , & in quatuor fibras dividitur. Ex in-  
 feriore vero parte ei fel inhæret. At lien in  
 sinistra , non eidem septo , sed intestino  
 annexus est , natura mollis & rarus , lon-  
 gitudinis crassitudinisque modicæ ; isque  
 30 paulum à costarum regione in uterum ex-  
 cedens , ex maxima parte sub his condi-  
 tur. atque hæc quidem junctæ sunt. Renes  
 vero divisi : qui lumbis sub imis coxis in-  
 hærent , à parte earum resimi , ab altera ro-  
 rundi ;

M 4

rundi ;

\* Hippocr. Coac. Sent. 300. Van der Linden  
 Med. Physiol. c. IV. p. 239. a Hippocrat. de Cor-  
 de T. IV.



rundi ; qui & venosi sunt , & tunicis super  
 conteguntur. Ac viscerum quidem hæ se-  
 des sunt. Stomachus vero , qui intestino-  
 rum principium est , nervosus à septima  
 spinæ vertebra incipit , ac circa præcordia §  
 cum ventriculo committitur. Ventriculus  
 autem , qui receptaculum cibi est , constat  
 ex duobus tergoribus, isque inter lienem  
 & jecur positus est ; utroque ex his paulum  
 super eum ingrediente. Suntque etiam 10  
 membranulæ tenues , per quas inter se  
 tria ista connectuntur , jungunturque ei  
 septo, quod transversum esse , supra posui.  
 183, 19. Inde ima ventriculi pars paulum in dex-  
 teriorem partem conversa , in summum in- 15  
 testinum coarctatur. Hanc juncturam πυ-  
 λωρον Græci vocant , quoniam portæ mo-  
 do in inferiores partes ea , quæ excreturi  
 sumus , emittit. Ab ea jejunum intestinum  
 incipit , non ita implicitum. cui tale voca- 20  
 bulum est , quia nunquam , quod accepit ,  
 continet ; sed protinus in inferiores partes  
 transmittit. Inde tenuius intestinum est ,  
 in sinus vehementer implicitum : orbes  
 vero ejus per membranulas singuli cum 25  
 interioribus connectuntur ; qui in dexte-  
 rioris partem conversi , & è regione dex-  
 terioris coxæ finiti , superiores tamen par-  
 tes magis complent. Deinde id intestinum  
 cum crassiore altero transverso committi- 30  
 tur ; quod à dextra parte incipiens , in si-  
 nisteriorem pervium & longum est , in dex-  
 teriorem non est ; ideoque cæcum nomina-  
 tur. At id , quod pervium est , late fufum at-  
 que

que sinuatum, minusque quam superiora  
 intestina nervosum, ab utraque parte huc  
 atque illuc volutum, magis tamen siniste-  
 riores inferioresque partes tenens, contin-  
 5 git jecur atque ventriculum: deinde cum  
 quibusdam membranulis à sinistro rene  
 venientibus jungitur; atque hinc ad dex-  
 tra recurvatum in ima dirigitur, qua ex-  
 cernit; ideoque id ibi rectum intestinum  
 10 nominatur. Contegit vero universa hæc  
 omentum, ex inferiore parte læve & ad-  
 strictum, ex superiore mollius. Cui adeps  
 quoque innascitur; quæ sensu, sicut cere-  
 brum quoque & medulla, caret. At à re-  
 15 nibus singulæ venæ, colore albæ, ad vesi-  
 cam feruntur; *βεντήνας* Græci vocant, quod  
 per eas inde descendentem urinam in ve-  
 sicam distillare concipiunt. Vesica autem  
 in ipso sinu nervosa & duplex, cervice ple-  
 20 na atque carnosâ, jungitur per venas cum  
 intestino, eoque osse, quod pubi subest:  
 ipsa soluta atque liberior est; aliter in viris  
 atque in fœminis posita. Nam in viris jux-  
 ta rectum intestinum est, potius in sini-  
 25 stram partem inclinata: in fœminis super  
 genitale earum posita est, & superne lapsa,  
 ab ipsa vulva sustinetur. Tum in masculis  
 iter urinæ spatiosius & compressius à cer-  
 vice hujus descendit ad colem: in fœmi-  
 30 nis brevius & plenius, super vulvæ cervi-  
 cem se ostendit. Vulva autem in virginibus <sup>474,</sup>  
 quidem admodum exigua est: in mulieribus <sup>20</sup>  
 vero, nisi ubi gravidæ sunt, non multo <sup>48, 22.</sup>  
 major, quam ut manu comprehendatur.

Ēa , recta tenuataque cervice , quam canalem vocant , contra mediam alvum orsa , inde paulum ad dexteriorem coxam convertitur ; deinde super rectum intestinum progressa , iliis fœminæ latera sua innectit. 5  
Ipsa autem ilia inter coxas & pubem imo ventre posita sunt. A quibus ac pube abdomen sursum versus ad præcordia pervenit ; ab exteriori parte , evidenti cute ; ab interiori levi membrana inclusum ; quæ 10 omento jungitur ; περιτόναιος autem à Græcis nominatur.

## C A P. II.

*De curationibus morborum , qui nascuntur à capite.* 15

**H**IS veluti in conspectum quendam , quatenus scire curanti necessarium est , adductis , remedia singularum laborantium partium exequar , orsus à capite : sub quo nomine nunc significo eam partem , quæ capillitio tegitur : nam oculorum , aurium , dentium dolor , & si quis similis est , alias erit explicandus.

2. *De Capitis dolore.* 25

In capite autem interdum acutus & pestifer morbus est , quam κεφαλαίαν Græci vocant. Cujus notæ sunt , † horror validus , nervorum resolutio , oculorum caligo , mentis alienatio , vomitus , sic ut vox superprimatur ; vel sanguinis ex naribus cursus , sic ut corpus frigescat , anima deficiat. Præter hæc , dolor intolerabilis , maxime circa tempora , vel occipitium. Interdum autem in

† Soran. Ephes. I. Isag. c. 6.

in capite longa imbecillitas ; sed neque  
 gravis , neque periculosa , per hominis æta-  
 tem est. Interdum gravior dolor , sed bre-  
 vis , neque tamen mortiferus ; qui vel vino ,  
 5 vel cruditate , vel frigore , vel igne , aut  
 sole contrahitur. Hique omnes dolores  
 modo in febre , modo sine hac sunt ; modo  
 in toto capite , modo in parte ; interdum  
 sic , ut oris quoque proximam partem ex-  
 10 crucient. Præter hæc etiam invenitur ge-  
 nus , quod potest longum esse : ubi humor  
 cutem inflat , eaque intumescit , & premen-  
 ti digito cedit : ὑδροκέφαλον Græci appel-  
 lant.

15 Ex his id , quod secundo loco positum  
 est , dum leve est , qua sit ratione curan-  
 dum , dixi a , cum persequerer ea , quæ sani  
 homines in imbecillitate partis alicujus fa-  
 cere deberent. Quæ vero auxilia sint capi-  
 20 tis , ubi cum febre dolor est , eo loco expli-  
 citum est , quo febrium curatio exposita 17, 8.  
 est. nunc de cæteris dicendum est. 138,

Ex quibus id , quod acutum est , & id , 23.  
 quod supra consuetudinem intenditur , id-  
 25 que , quod ex subita causa , etsi non pesti-  
 ferum , tamen vehemens est , primam cu-  
 rationem habet , qua sanguis mittatur. Sed  
 id , nisi intolerabilis est dolor , superva-  
 cum est. Satiusque est , abstinere à cibo ;  
 30 si fieri potest , etiam à potione : si non po-  
 test , aquam bibere. Si postero die dolor  
 remanet , alvum ducere , sternutamenta  
 evocare , nihil assumere , nisi aquam. Sæpe  
 enim dies unus aut alter totum dolorem  
 hac

hac ratione discutit, utique, si ex vino vel cruditate origo est.

Si vero in his auxilii parum est, tonde-  
re oportet ad cutem: deinde consideran-  
dum est, quæ causa dolorem excitarit. Si 5  
calor, aqua frigida multa perfundere caput  
expedit; spongiam concavam imponere,  
subinde aqua frigida expressam; ungere  
rosâ & aceto, vel potius his tinctam lanam  
succidam imponere, aliave refrigerantia 10  
cataplasmata. At si frigus nocuit, caput  
oportet perfundere aqua calida marina,  
vel certe salsa, aut in qua laurus decocta  
sit; tum caput vehementer perfricare; de-  
inde calido oleo implere & veste velare. 15  
quidam etiam id devinciunt: alii cervica-  
libus vestimentisque onerant, & sic levantur:  
alios calida cataplasmata adjuvant.  
Ergo etiam, ubi causa incognita est, videre  
oportet, refrigerantia magis, an calefacien- 20  
tia leniant, & his uti, quæ experimentum  
approbarit.

At si parum causa discernitur, perfunde-  
re caput, primum aqua calida, sicut supra  
præceptum est, vel salsa, vel ex lauro de- 25  
cocta, tum frigida posca. Illa in omni ve-  
rusto capitis dolore communia sunt: ster-  
nutamenta excitare, inferiores partes ve-  
hementer perfricare, gargarizare † his, quæ  
salivam movent, cucurbitulas temporibus 30  
& occipitio admovere, sanguinem ex nari-  
bus detrahare, resina subinde tempora per-  
vellere, & imposito sinapi exulcerare ea,  
quæ male habent, ante linteolo subjecto,  
ne

† Soran. Ephes. Isag, c. 6.



ne vehementer erodat, caudentibus ferramentis, ubi dolor est, ulcera excitare, cibum semper modicum cum aqua sumere: ubi levatus est dolor, in balneum ire, ibi multa aqua prius calida, deinde frigida 35. 5. caput perfundi. Si discussus ex toto dolor est, etiam ad vinum reverti; sed postea semper, antequam quicquam aliud, aquam bibere.

- 10 Dissimile est id genus, quod humorem in caput contrahit. In hoc tonderi ad cutem necessarium est: deinde imponere sinapi, sic ut exulceret: si id parum profuit, scalpello utendum est. Illa cum hydropicis 160. 15 communia sunt, ut exerceatur, insudet, vehementer perfricetur, cibus potionibusque utatur urinam præcipue moventibus.

## 2.

- 20 *De morbo, qui circa faciem nascitur.*

**C**IRCA faciem vero morbus innascitur, quem Græci a κυνικὸν σπασμὸν nominant. Is cum acuta febre oritur. Os cum rictu quodam pervertitur, ideoque 25 nihil aliud est, quam distortio oris. Accedit crebra coloris in facie totoque corpore mutatio: somnus in promptu est.

In hoc sanguinem mittere optimum est. Si finitum eo malum non est, ducere 30 alvum. Si ne sic quidem discussum est, albo veratro vomitum movere. Præter hæc necessarium est vitare solem, lassitudinem, vinum. Sed si discussum his non est, utendum est cursu, & fricatione in eo, quod læsum

a Aretæus de Morb. Diuturn. I, 7. Cælius Aurelianus. Tard. pass. II, 2.

190 A. CORN. CELSI *Lib. 4.*  
sum est, leni & multa; in reliquis partibus  
breviore, sed vehementi. Prodest etiam  
movere sternutamenta, caput radere, id-  
que perfundere aqua calida, vel marina, vel  
certe salsa, sic ut ei quoque sulphur adji- 5  
ciatur: post perfusionem iterum perfricari,  
sinapi manducare; eodemque tempore af-  
fectis oris partibus ceratum, integris item  
sinapi, donec erodat, imponere. Cibus  
apertissimus ex media materia est. 10

3.

*De Resolutione linguæ.*

**A**T si lingua resoluta est, quod inter-  
dum per se, interdum ex morbo ali- 15  
quo fit, sic ut sermo hominis non  
explicetur; oportet gargarizare ex aqua, in  
qua vel thymum, vel hyssopum, vel nepe-  
ta decocta sit; aquam bibere; caput, & os,  
& ea, quæ sub mento sunt, & cervicem ve- 20  
hementer perfricare; lasere linguam ipsam  
linere; manducare, quæ sunt acerrima, id  
est sinapi, allium, cepam; magna vi luctari,  
ut verba exprimantur; exerceri retento  
spiritu, caput sæpe aqua frigida perfunde- 25  
re, nonnunquam multam esse radiculam,  
deinde vomere.

4.

*a De Distillatione ac gravedine.* 30

**D**ISTILLAT autem humor de capite  
interdum in nares, quod lenè est; in-  
terdum in fauces, quod peius est; in-  
terdum etiam in pulmonem, quod pessi-  
mum

*a Coel. Aurelian. Morbor. Chronic. II, 7.*

num est. Si in nares distillaverit, tenuis per has pituita profluit, caput leniter dolet, gravitas in eo sentitur, frequentia sternutamenta sunt. Si in fauces, has exasperat, 5 tussiculam movet. Si in pulmonem, præter sternutamenta & tussim, est etiam capitis gravitas, lassitudo, fitis, æstus, biliosa urina.

Aliud autem (quamvis non multum di- 10 stans) malum, gravedo est. Hæc nares claudit, vocem obtundit, tussim siccam movet. Sub eadem vero falsa est saliva, sonant aures, venæ moventur in capite, turbida urina est. Hæc omnia *κορυζας* Hippocrates no- 15 minat. Nunc video apud Græcos in gravedine hoc nomen servari: distillationes, *κατασαυμης* appellari. Hæc communia & brevia; sed si neglecta sunt, longa esse consuerunt. Nihil pestiferum est, nisi quod 20 pulmonem exulcerat.

Ubi aliquid ejusmodi sentimus, protinus abstinere à sole, à balneo, à venere debemus. Inter quæ unctio, & assueto cibo nihilominus uti licet. Ambu- 25 latione tantum non acri, sed recta utendum est, & post eam caput atque os supra quinquagies perfricandum. Raroque fit, ut si biduo, vel certe triduo nobis temperavimus, id vitium non levetur. Quo levato, 30 si in distillatione crassa facta pituita est, vel in gravedine, nares magis pallent, balneo utendum est, multaque aqua prius calida, post egeida, fovendum os, caputque; deinde cum cibo pleniore vinum bibendum.

dum. At, si æque tenuis die quarto pituita est, vel nares æque clausæ videntur, assumendum est vinum aminæum, austerum; deinde rursus biduo aqua, post quæ ad balneum, & ad consuetudinem revertendum est.

Neque tamen ipsis diebus, quibus aliqua omittenda sunt, expedit tamquam ægros agere: sed cætera omnia quasi sanis facienda sunt, præterquam si diutius aliquem, & 10 vehementius ista sollicitare consuerunt. huic enim quædam curiosior observatio necessaria est. Igitur huic, si in nares vel in fauces distillavit, præter ea, quæ supra retuli, protinus primis diebus multum am- 15 bulandum est, perfricandæ vehementer inferiores partes, levior fricatio adhibenda thoraci erit, levior capiti, demenda assueti cibo pars dimidia, sumenda ova, amy- lum, similiaque, quæ pituitam faciunt cras- 20 siorem, siti, quanta maxima sustineri potest, pugnandum est. Ubi per hæc idoneus aliquis balneo factus, eoque usus est, adjiciendus est cibo pisciculus, aut caro; fictamen, ne protinus justus modus cibi suma- 25 tur: vino meraco copiosius utendum est.

At, si in pulmonem quoque destillat, multo magis & ambulatione & frictione opus est, eademque adhibita ratione in cibis. Si non satis illi proficiunt, acrioribus 30 utendum est, magis somno indulgendum est, abstinendumque à negotiis omnibus, aliquando, sed serius, balneum tentandum.

In

In gravedine autem, primo die quiescere, neque esse, neque bibere, caput velare, fauces lana circumdare : postero die surgere, diu abstinere à potione, aut, si res coegerit, non ultra heminam aquæ assumere : tertio die panis non ita multum ex parte inferiore cum pisciculo, vel levi carne sumere, aquam bibere : si quis sibi temperare non potuerit, quo minus pleniore victu utatur, vomere : ubi in balneum ventum est, multa aqua calida caput & os fovere usque ad sudorem, tum ad vinum redire. Post quæ vix fieri potest, ut idem incommodum maneat. sed, si manserit utendum erit cibis frigidis, aridis, levibus, humore quam minimo, servatis frictionibus exercitationibusque, quæ in omni tali genere valetudinis necessariae sunt.

20

## C A P. III.

*De Cervicis morbis.*<sup>a</sup>

**A** C A P I T E transitus ad cervicem est, quæ gravibus admodum morbis obnoxia est. Neque tamen alius importunior <sup>b</sup> acutiorque morbus est, quam is, qui quodam rigore nervorum, modo caput scapulis, modo mentum pectori adnectit, modo rectam & immobilem cervicem intendit. Primum Græci *c* ὀπισθότονον, sequentem *ε* μπροσθότονον, ultimum *τ* έτανον <sup>d</sup> appellant : quamvis minus subtiliter quidam in discretis his nominibus utuntur. Ea sæpe intra quartum *e* diem tollunt : si hunc evaserunt, sine periculo sunt.

N

Eadem

<sup>a</sup> Galen. Introd. in Med. c. 13. <sup>b</sup> Aretæus de Morb. Acut. 1, 6. <sup>c</sup> Cæli. Aurelian. Morb. Acut. III, 6. <sup>d</sup> Suid. in ead. voce. <sup>e</sup> Aphor. v, 6.



78, 34. Eadem omnia ratione curantur; idque  
convenit. Asclepiades utique f mittendum  
sanguinem credidit. Id quidam utique vi-  
tandum esse dixerunt, eo quod maxime  
tuum corpus calore egeret;isque esset in 5  
sanguine venarum. Hoc quidem falsum est.  
neque enim natura sanguinis est, ut utique  
calet; sed ex his, quæ in homine sunt, is  
celerrime vel calescit, vel refrigescit. Mit-  
ti vero nec ne debeat, ex his intelligi po- 10  
test, quæ de sanguinis missione præcepta  
sunt. Utique autem recte datur † castoreum,  
& cum hoc piper, vel laser. Deinde opus  
est fomento humido & calido. Itaque ple-  
rique aqua calida multa cervices subinde 15  
perfundunt. id in præsentia allevat; sed  
opportuniore nervos frigori reddit. quod  
utique vitandum est.

95, 16. Utilius igitur est, cerato liquido pri-  
mum cervicem perungere; deinde admo- 20  
vere vesicas bubulas vel utriculos g oleo  
calido repletos, vel ex farina calidum ca-  
taplasma, vel piper cum ficu contusum.  
Utilissimum tamen est, humido sale ‡ fovere.  
quod quomodo fieri debeat, jam ostendi. 25  
Ubi eorum aliquid factum est, admovere ad  
ignem, vel si æstas est, in sole ægrum oportet;  
maximeque oleo vetere; si id non est h Sy-  
riaco; si ne id quidem est, adipe \* quam ve-  
tustissima, cervicem, & scapulas, & spinam 30  
perfricare.

Fricatio cum omnibus vertebrais homi-  
num utilis sit, tum iis præcipue, quæ in  
col-

f Cæl. Aurelian. Acut. Morb. III, 8. † Marcell. de  
Medic. c. XVIII, p. 320. g Cæl. Aurel. Acut. Morb.  
III, 8. ‡ Marcell. de Med. c. XVIII, p. 320. h Plin.  
N. H. XV, 7. \* Marcell. de Med. c. XVIII, p. 320.

collo sunt. Ergo die nocteque, interpositis  
 tamen quibusdam temporibus, hoc reme-  
 dio utendum est : dum intermittitur, im-  
 ponendum † malagma aliquod ex calefacien-  
 5 tibus. Cavendum vero & præcipue frigus.  
 ideoque in eo conclavi, quo curatur æger,  
 ignis continuus esse debet, maximeque  
 tempore antelucano, quo præcipue frigus  
 intenditur. Neque inutile erit, caput at-  
 10 tonsum habere, idque irino vel cyprino  
 calido madefacere, & superimposito pileo  
 velare. nonnunquam etiam in calidum  
 oleum totum descendere, vel in aquam ca-  
 lidam, in qua fœnum græcum decoctum  
 15 fit, & adjecta olei pars tertia. Alvus i quo-  
 que ducta sæpe superiores partes resolvit.

Si vero etiam vehementius dolor crevit,  
 admovendæ cervicibus cucurbitulæ sunt,  
 sic ut cutis incidatur. Eadem aut ferramen-  
 20 tis aut sinapi adurenda. Ubi levatus est do-  
 lor, moverique cervix cœpit, scire licet,  
 cedere remediis morbum. Sed diu vitan-  
 dus cibus, k quisquis mandendus est. Sor-  
 bitionibus utendum, itemque ovis forbi-  
 25 libus, aut è pullis mollibusve jus aliquod  
 assumendum. Id si bene processerit, jam-  
 que ex toto recte se habere cervices vide-  
 buntur, incipiendum erit à pulticula, vel  
 intrita bene madida. Celerius tamen etiam  
 30 panis mandendus, quam vinum gustan-  
 dum : siquidem hujus usus præcipue peri-  
 culosus ; ideoque in longius tempus diffe-  
 rendus est.

† Marcellus de Med: c. XVIII. p. 320.

i Aph. VII, 5. k Cælius Aurelian. Morb. Acut. III,  
 8.

## C A P. IV.

<sup>a</sup> De Faucium morbis: & primum de Angina.

U<sup>T</sup> hoc autem morbi genus circa totam  
cervicem; sic alterum, æque pestife-  
rum acutumque, in faucibus esse con- 5  
suevit. Nostri anginam vocant: apud  
Græcos nomen, prout species est. Inter-  
dum enim neque rubor, neque tumor ul-  
lus apparet; sed corpus aridum est, vix  
spiritus trahitur, membra solvuntur. id 10  
<sup>b</sup> *συνάγχη* vocant. Interdum lingua fauces-  
que cum rubore intumescunt, vox nihil  
significat, oculi vertuntur, facies pallet,  
singultusque est. *ὡς συνάγχη* vocatur. Illis  
communia sunt; æger non cibum devorare, 15  
non potionem potest; spiritus ejus inter-  
cluditur. Levius est, ubi † tumor tantum-  
modo & rubor est, cætera non sequuntur. id  
*παρασυνάγχη* appellant.

Quicquid est, si vires patiuntur, ‡ sanguis 20  
mittendus est, etsi non abundat: secundum  
est, ducere alvum. Cucurbitula quoque  
recte sub mento, & circa fauces admove-  
tur; ut id, quod strangulat, evocet. Opus  
est deinde fomentis humidis. nam sicca 25  
spiritum elidunt. Ergo admovere spon-  
gias oportet: quæ melius in calidum o-  
leum, quam in calidam aquam subinde di-  
mittuntur. Efficacissimumque est hic quo-  
que, salem calidis cum saccellis superpone- 30  
re. Tum commodum est, hyssopum, vel  
nepetam, vel thymum, vel apīnathium, vel  
etiam furfures, aut ficus aridas, cum mul-  
sa

<sup>a</sup> Aretæus de Morb. Acut. I, 7. <sup>b</sup> Cæl. Aurelian. Morb. Acut. III, c. 1, 2, 3, 4. Æginet. III, 27. D. Hieronym. in Job. cap. VII. † Aphorism. VI, 37.

‡ Marcell. de Med. c. XV. p. 303.

79, 1,  
22.

95, 25.

Cap. 4.                      MEDICINA.                      197  
sa decoquere, eaque gargarizare: post hæc  
palatum ungere vel felle taurino, vel eo  
medicamento, quod ex moris est. Polline  
etiam piperis recte respergitur.

5 Si per hæc parum proficitur, ultimum  
est, incidere satis altis plagis sub ipsis ma-  
xillis supra collum, & in palato circa uvam,  
vel eas venas, quæ sub † lingua sunt; ut per  
ea vulnera morbus erumpat. Quibus si  
10 non fuerit æger adjutus, scire licet, à malo  
victum esse. Si vero his morbus levatus est,  
jamque fauces cibum & potum capiunt, fa-  
cilis ad bonam valetudinem recursus est. At-  
que interdum natura c quoque adjuvat, si  
15 ex angustiore sede vitium transit in latio-  
rem. Itaque rubore & tumore in præcor-  
diis orto, scire licet fauces liberari.

Quicquid autem eas levarit, incipiendum  
est ab humidis, maximeque aqua mulsâ;  
20 deinde assumendi molles & non acres cibi  
sunt, donec fauces ad pristinum habi-  
tum revertantur. Vulgo audio ‡, si  
quis d pullum hirundinum ederit, angina  
toto anno non periclitari, Servatumque eum  
25 ex e fale, cum is morbus urget, comburi,  
carbonemque ejus contritum in aquam mul-  
sam, quæ potui detur, infriari, & prodesse.  
Id cum idoneos authores ex populo habeat,  
neque habere quicquam periculi possit, quam-  
30 vis in monumentis medicorum non legerim,  
tamen inferendum huic operi meo credidi.

N 3

De

† Marcell. de Med. c. XV, p. 305. c Aph. VI, 37.  
‡ Plin. Histor. N. X. c. 33. d Plin. H. N. XXX, 4.  
e Plinius H. N. XXX, 4.

## 2. De Difficultate spirandi.

EST etiam circa fauces malum, quod  
 apud Græcos aliud aliudque nomen  
 habet, prout se intendit. Omne in dif- 5  
 ficultate spirandi consistit: sed hæc dum mo-  
 dica est, neque ex toto strangulat, † *δυσπνοια*  
 appellatur: cum vehementior est, ut  
 spirare æger sine sono & anhelatione non  
 possit, † *ἀσπνοια*: cum accessit id quoque, ne 10  
 nisi recta cervice † spiritus trahatur, *ὀρθόπνοια*.  
 Ex quibus id, quod primum est, potest  
 diu aliquem trahere: duo insequentia acu-  
 ta esse consuerunt. His communia sunt;  
 quod propter angustias, per quas spiritus 15  
 evadit, g sibilum elidit; dolor in pectore  
 præcordiisque est, interdum etiam in sca-  
 pulis, isque modo decedit, modo reverti-  
 tur; adhæc tussicula accedit.

Auxilium vero est, nisi aliquid prohi- 20  
 bet, in sanguinis detractio. Neque id  
 satis est, sed lac caprinum calidum jejuno  
 dandum; & si non febrit, venter solvendus  
 est. Liquanda alvus, interdum etiam du- 25  
 cenda, quibus extenuatum corpus incipit  
 spiritum trahere commodius. Caput au-  
 tem etiam in lecto sublime habendum est:  
 thorax fomentis, cataplasmatisque calidis,  
 aut ficis, aut etiam humidis adjuvandus 30  
 est; & postea malagma superimponendum,  
 vel ceratum ex cyprino, vel irino unguen-  
 to. Sumenda deinde jejuno in potum mul-  
 sa, vel aqua, cum qua vel hyssopus cocta, vel  
 con-

f Cæl. Aurelian. Tard. Passion. III, 1. Aginet. III,  
 29 † Hieronym. in Job. cap. IX. † *Sublimis spiri-  
 tus* dicitur Horatio. Vide Not. Dan. Heinf. ad Horat.  
 I. 15. v. 31. g Trallian. I, 2.



contrita capparidis radix fit. Deligitur etiam  
 utiliter, aut nitrum, aut h nasturtium, allium-  
 ve frictum, deinde contritum & cum melle  
 5 mixtum: simulque coquantur mel, galba-  
 num, resina, terebinthina: ubi autem coie- 275, 33.  
 runt, ex his, quod fabæ magnitudinem ha-  
 bet, quotidie sub lingua liquatur: aut sul-  
 phuris ignem non experti P\*. & quadrans,  
 abrotani P\*. in vini cyatho teruntur, idque  
 10 tepefactum sorbetur. Est etiam non vana  
 opinio, vulpinum jecur i, ubi siccum & ari-  
 dum factum est, contundi oportere, polli-  
 nemque ex eo potioni aspergi; vel ejusdem  
 pulmonem quam recentissimum assum, sed si-  
 15 ne ferro coctum, edendum esse. Præter hæc,  
 sorbitionibus & lenibus cibis utendum est: in-  
 terdum vino tenui austero: nonnunquam vo-  
 mitu. Profunt etiam, quæcumque urinam  
 movent: sed nihil magis, quam ambulatio  
 20 lenta pene usque ad lassitudinem; fricatio  
 multa, præcipue inferiorum partium, vel  
 in sole, vel ad ignem, & per seipsum, &  
 per alios, usque ad sudorem.

25 3. De Faucium exulceratione

In interiore vero faucium parte inter-  
 dum exulceratio esse consuevit. In hac  
 plerique extrinsecus cataplasmatibus calidis,  
 fomentisque humidis utuntur. Volunt  
 30 etiam vaporem calidum ore recipi. per  
 quem molliores alii partes eas fieri dicunt,  
 opportunioreque vitio jam hærenti. Sed, si  
 bene sic vitari morbus potest, tuta illa  
 præsidia: si metus ejus est, supervacua sunt.

N 4

Uti-

h Cæl. Aurelian. Tard. Pass. III, 1. i Scribon. Larg.  
 c. 19. Comp. 76. Plin. H. N. XXVIII, 13.

Utique autem perfricare fauces periculosum est. exulcerat enim. Neque utilia sunt, quæ urinæ movendæ sunt apta : quia possunt, dum transeunt, ibi quoque pituitam extenuare; quam supprimi melius est.

Asclepiades multarum rerum, quas ipsi quoque secuti sumus, author bonus, acetum ait quam acerrimum esse sorbendum. hoc enim sine ulla noxa comprimi ulcera. Sed id supprimere sanguinem potest, ulcera ipsa sanare non potest. Melius huic rei licium est; quod idem quoque æque probat: vel porri, vel marrubii succus, vel nuces Græcæ k cum tragacantho contritæ & cum passo mixtæ, vel lini semen contritum & cum dulci vino mixtum. Exercitatio quoque ambulandi currendique necessaria est. Fricatio à pectore vehemens toti inferiori parti adhibenda.

Cibi vero esse debent, neque nimium acres, neque asperi; mel, lenticula, tragum, lac, ptisana, pinguis caro, præcipueque porrum, & quicquid cum hoc mixtum est. Potionis quam minimum esse convenit. Aqua dari potest, vel pura, vel in qua malum cotoneum, palmulæve decoctæ sunt. Gargarizationes quoque lenes : si hæ parum proficiunt, reprimentes utiles sunt.

Hoc genus neque acutum est, & potest esse non longum : curationem tamen maturam, ne vehementer & diu lædat, desiderat.

#### 4. De Tussi.

Tussis vero fere propter faucium exulcerationem

k *Amygdala*. Vide Rhodii Lexicon Scribonianum. Macrobius Satur. II, 14.

cerationem molesta est : quæ multis <sup>1</sup> modis contrahitur. Itaque, illis restitutis, ipsa finitur. Solet tamen interdum per se quoque male habere : & vix, cum vetus facta est, **f** eliditur. ac modo arida est, modo pituitam facit vel citat.

Oportet autem hyssopum altero quoque die bibere: spiritu retento currere, sed minime in pulvere: ac lectione uti vehementi; **10** quæ primo impeditur à tussi, post eam vincit: tum ambulare: deinde per manus quoque exerceri, & pectus diu perfricare. Post hæc quam pinguisimæ ficus uncias tres, super prunam incoctas, esse.

**15** Præter hæc, si humida est, profunt fricationes validæ, cum quibusdam calefacientibus, sic, ut caput quoque simul vehementer perfricetur: item cucurbitulæ pectori admotæ, sinapi ex parte exteriori **20** faucibus impositum, donec leviter exulceret; potio ex menta, nucibusque Græcis & amylo; primoque assumptus panis aridus, deinde aliquis cibus lenis.

At, si sicca tussis est, cum ea vehementissime **25** urget, adjuvat vini austeri cyathus assumptus; dum ne amplius id, interposito tempore aliquo, quam ter aut quater fiat: item laseris quam optimi paululum devorare opus est; porri vel marrubii succum **30** sumere; scillam delingere; acetum ex ea, vel certe acre forbere, aut cum spica allii contriti duos vini cyathos.

Utilis etiam in omni tussi est peregrinatio, navigatio longa, loca maritima, nata-  
**N 5** tiones.

tiones. Cibus interdum mollis, ut malva, ut urtica : interdum acer, ut lac cum allio coctum. Sorbitiones, quibus laser fit adjectum, aut in quibus porrum incoctum tabuerit. Ovum quoque forbile, sulphure adjecto, forbeatur. In potum vero primum aqua calida, deinde invicem aliis diebus hæc, aliis vero vinum.

m 5. *De Sanguinis sputo.*

Magis terreri potest aliquis, cum sanguinem expuit. sed id modo minus, modo plus periculi habet. Exit enim modo ex gingivis, modo ex ore. & quidem ex hoc interdum etiam copiose, sed sine tussi, sine ulcere, sine gingivarum ullo vitio; ita ut nihil excreetur. Verum ut ex naribus, sic ex ore aliquando prorumpit. Atque interdum sanguis profluit, interdum simile aquæ quiddam, in qua caro recens lota est. Nonnumquam autem is à summis faucibus fertur, modo exulcerata ea parte, modo non exulcerata; sed aut ore venæ alicujus adaperto, aut tuberculis quibusdam natis, ex hisque sanguine erumpente. Quod ubi incidit, neque lædit potio aut cibus, neque quicquam, ut ex ulcere, excreatur. Aliquando vero, gutture & arteriis exulceratis, frequens tussis sanguinem quoque extundit. Interdum etiam fieri solet, ut aut ex pulmone, aut ex pectore, aut ex latere, aut jocinore feratur. Sæpe foeminae, quibus sanguis per menstrua non respondet, hunc expuunt. Authoresque medici ferunt, vel exesa parte aliqua sanguinem exire,

m Aretæus de Morb. Acutis II, 2, Cæl. Aurelian. Morb. Chronic. Lib. II. c. 9.

exire, n vel rupta, vel ore alicujus venæ patefacto. Primam *διάβρωσιν*, secundam *ρήγμοχασμόν*, tertiam *αίναςόμωσιν* appellant. Ultima minime nocet; prima gravissime. Ac sæpe quidem evenit, uti sanguinem o pus sequatur.

Interdum autem, qui sanguinem ipsum suppressit, satis ad valetudinem profuit. Sed si secuta ulcera sunt, si pus, si tussis est, prout sedes ipsa est, ita varia & periculosa genera morborum fiunt. Si vero sanguis tantum fluit, expeditius & remedium & finis est. Neque ignorari oportet, eis, quibus fluere p sanguis solet, aut quibus spina dolet, coxæve, aut post cursum vehementem vel ambulationem, dum febris absit, non esse inutile sanguinis mediocre profluvium: idque per urinam redditum ipsam quoque lassitudinem solvere. Ac ne in eo quidem terribile esse, qui ex superiore loco decidit: si tamen in ejus urina nihil aliud † novabit. Neque vomitum hujus afferre periculum, etiam cum repetit, si ante confirmare & implere corpus licuit: & ex toto nullum nocere, qui in corpore robusto, neque nimius est, neque tussim aut calorem movet. Hæc pertinent ad univ-  
sum. nunc ad ea loca, quæ proposui, veniam.

30 Si ex gingivis exit, portulacam manducasse satis est. Si ex ore, continuasse eo merum vinum: si id parum proficit, acetum. Si inter hæc quoque graviter erumpit, quia consumere hominem potest, commo-

diffi-  
n Cæl. Aurelian. Tard. Pass. II, 9, 10. Aretæus Morb. Acutor. Curat. II, 2. Trallian. VII, 1. o Aph. VII, 78. p Aph. VII, 37. † *Notabit.*



diffimum est, impetum ejus, admota † occipitio cucurbitula, sic ut cutis quoque incidatur, avertere. Si id mulieri, cui menstrua non feruntur, evenit, eandem cucurbitulam, incisus inguinibus ejus, ad-  
5 movere.

At, si ex faucibus interioribusve partibus processit, & metus major est, & cura  
79, 32. major adhibenda. Sanguis mittendus est; &, si nihilominus ex ore processit, iterum 10 tertioque, & quotidie paulum aliquid: protinus autem debet sorbere vel acetum, vel etiam cum thure plantaginis aut porri succum; imponendaque extrinsecus supra id,  
290, 21. quod dolet, lana succida ex aceto est, & id 15 sponsia subinde refrigerandum. Erasistratus horum crura quoque & femora brachiaque pluribus locis deligabat. Id Asclepiades adeo non prodesse, ut etiam inimicum esset, proposuit. Sed id sæpe com-  
293, 21. mode respondere experimenta testantur. 20

Neque tamen pluribus locis deligari necesse est: sed sat est infra inguina, & super talos, summosque humeros, etiam brachia. Tum, si febris urget, danda est sorbitio; & 25 potui aqua, in qua aliquid ex his, quæ alvum adstringunt, decoctum sit. At, si abest febris, vel elota alica, vel panis ex aqua frigida, & molle quoque ovum dari potest potui, vel idem, quod supra scriptum est, 30 vel vinum dulce, vel aqua frigida. sed sic bibendum erit, ut sciamus, huic morbo sitim prodesse.

Præter hæc necessaria sunt quies, securitas,

† Marcell. de Med. c. X. pag. 288.

ritas, silentium. Caput hujus quoque cubantis sublime esse debet; recteque tondetur. Facies sæpe aqua frigida fovenda est.

At inimica sunt vinum, balneum, Venus, 172, 2.  
 5 in cibo oleum, acriora quæ omnia, item calida fomenta, conclave calidum & inclusum, multa vestimenta corpori injecta, etiam fricationes, nisi ubi bene sanguis conquievit. Tum vero incipiendum est à brachiis, 10  
 cruribusque; à thorace abstinendum. In hoc casu per hiemem, locis maritimis; per æstatem, mediterraneis opus est.

## C A P. V.

*De Stomachi morbis.*

15 **F**AUCIBUS subest stomachus; in quo plura à longa vitia incidere consueverunt. Nam modo ingens calor, modo inflatio hunc, modo inflammatio, modo exulceratio afficit. Interdum pituita, interdum 20  
 bilis adoritur. Frequentissimumque est ejus malum, quo resolvitur: neque ulla re magis aut afficitur, aut corpus afficit.

Ut diversa autem vitia ejus, sic etiam remedia sunt. Ubi exæstuat, aceto cum rosa 25  
 extrinsecus subinde fovendus est; imponendusque pulvis cum oleo; & ea cataplasmata, quæ simul & reprimunt, & molliunt. Potui, nisi quod obstat, gelida aqua 30  
 præstanda.

Si inflatio est, profunt admotæ † cucurbitulæ; neque incidere cutem necesse est: profunt sicca & calida fomenta, sed non vehementissima. Interponenda abstinencia est.

q Cæl. Aurelian. Acut. Morb. II, 24. a Cæl. Aurelian. Tard. Pass. III, 2. Trallian. VII, 3. † sub scapulis, uti duobus exemplis confirmat Aloisius Mundella Epist. 7. pag. 125. & seqq.

est. Utilis in jejuno potio est apsinthii, aut  
 hyssopi, aut rutæ. Exercitatio † primo levis,  
 deinde major adhibenda est; maximeque,  
 quæ superiores partes moveat. quod genus  
 in omnibus stomachi vitiis aptissimum est. 5  
 Post exercitationem opus est unctioe, fri-  
 catione; balneo quoque nonnunquam, sed  
 rarius; interdum alvi ductioe. Cibis dein-  
 de calidis, neque infantibus: eodemque mo-  
 do calidis potionibus, primo aquæ; post, ubi 10  
 refedit inflatio, vini austeri. Illud quoque  
 in omnibus stomachi vitiis præcipiendum est,  
 ut, quo modo se quisque æger refecerit, eo-  
 dem sanus utatur. nam redit huic imbecilli-  
 tas sua, nisi iisdem defenditur bona valetudo, 15  
 quibus reddita est.

At si inflammatio aliqua est, quam fere  
 tumor & dolor sequitur, prima sunt quies,  
 & abstinentia; lana sulphurata circumdata;  
 in jejuno apsinthium. Si ardor stomachum 20  
 urget, aceto cum rosâ subinde fovendus est:  
 deinde cibis quidem utendum est modicis;  
 imponenda vero extrinsecus quæ simul &  
 reprimunt & molliunt: deinde, his detractis,  
 utendum calidis ex farina cataplasmatibus, quæ 25  
 reliquias digerant: interdum alvus ducen-  
 da: adhibenda exercitatio, & cibus ple-  
 nior.

199. At, si exulceratio stomachum infestat, ea-  
 dem fere facienda sunt, quæ in faucibus 30  
 exulceratis præcepta sunt. Exercitatio,  
 fricatio inferiorum partium adhibenda. Ad-  
 hibendi lenes & glutinosi cibi, sed citra sa-  
 tietatem. Omnia acria atque acida remo-  
 venda.

† Equitatio. Plin. XXVIII. 4. in fine.

*Cap. 5. MEDICINA. 207*  
venda. Vino, si febris non est, dulci, aut, si id inflat, certe leni utendum: sed neque perfrigido, neque nimis calido.

Si vero pituita stomachus impletur, necessarius modo in jejuno, modo post cibum vomitus est. Utilis exercitatio, gestatio, navigatio, fricatio. Nihil edendum, bibendumque, nisi calidum; vitatis tantum his, quæ pituitam contrahere consueverunt.

10 Molestius est, si stomachus bile vitiosus est. Solent autem hi, qui sic tentantur, interpositis quibusdam diebus, hanc, & quidem, quod pessimum est, atram vomere. His recte alvus ducitur: potiones ex apsinthio  
15 dantur: necessaria gestatio, navigatio, & si fieri potest, ex nausea vomitus: vitanda cruditas: sumendi cibi faciles & stomacho non alieni, vinum austerum.

Vulgatissimum vero pessimumque stomachi vitium est resolutio, id est, cum cibi non tenax est, soletque desinere ali corpus, ac sic tabe consumi. Huic generi inutilissimum balneum est. Lectiones, exercitationesque superioris partis necessariae,  
25 item unctiones, fricationesque: hinc perfundi frigida, atque in eadem natare, canalibus ejusdem subicere etiam stomachum ipsum, & magis etiam à scapulis id quod contra stomachum est: consistere in  
30 frigidis, medicatisque fontibus, quales Cutiliarum Sumbruinarumque sunt, salutare est. Cibi quoque assumendi sunt frigidi, qui potius difficulter coquuntur, quam facile vitiantur. Ergo plerique, qui nihil aliud

b Aretæus de Morb. Diurn. II, 7. c Plin. II, 95. & XXXI, 2. Vitruvius VIII, 3. Cælius Aurelianus. Tard. Pass. V, 2. p. 518.

aliud concoquere possunt, bubulam co-  
quunt. Ex quo colligi potest, neque  
avem, neque venationem, neque piscem  
dari debere, nisi generis durioris. Potui  
quidem aptissimum est vinum frigidum, <sup>f</sup>  
vel certe bene calidum meracum, potissi-  
mum <sup>d</sup> Rheticum, vel Allobrogicum, aliud-  
ve, quod & austerum & resina conditum  
est: si id non est, quam asperrimum, ma-  
ximeque <sup>e</sup> Signinum. 10

Si cibus non continetur, danda aqua, &  
eliciendus plenior vomitus est; iterumque  
dandus cibus, & tum admovendæ duobus  
infra stomachum digitis cucurbitulæ, ibi-  
que duabus aut tribus horis continendæ 15  
sunt. Si simul & vomitus, & dolor est, im-  
ponenda supra stomachum est lana succi-  
da, vel spongia <sup>f</sup> ex aceto, vel cataplasma,  
quod refrigeret. Perfricanda vero non diu,  
sed vehementer brachia, & crura, & cale- 20  
facienda.

Si plus doloris est, infra præcordia qua-  
tuor digitis cucurbitula utendum est: pro-  
tinus dandus panis ex posca frigida. Si non  
continuit, post vomitum leve aliquid ex 25  
his, quæ non aliena stomacho sint. Si ne  
id quidem tenuit, singuli cyathi vini, sin-  
gulis interpositis horis, donec stomachus  
consistat. Valens etiam medicamentum  
est, radiculæ succus: valentius, acidi puni- 30  
ci mali, cum pari modo succi, qui ex dul-  
ci punico malo est, adjecto etiam intubi  
succo, & mentæ, sed hujus minima parte;  
quibus tantundem, quantum ex his omni-  
bus

<sup>d</sup> Serv. ad Virgil. II. Georg. 96. Sueton. in August.  
c. 77. Plin. XIV, 6. <sup>e</sup> Plin. XIV, 6. <sup>f</sup> Trallian. VII, 7.



bus est, aquæ frigidæ quam optime misce-  
tur. Id enim plus quam vinum ad compri-  
mendum stomachum potest. Supprimen-  
dus autem vomitus est, qui per se venit,  
5 etsi nausea est.

Sed si coacuit intus cibus, aut compu-  
truit, quorum utrumlibet ructus ostendit,  
ejiciendus est; protinusque, cibus assumptis  
iisdem, quos proxime posui, stomachus re-  
10 stituendus. Ubi sublatus est præfens metus,  
ad ea redeundum est, quæ supra præcepta  
sunt.

C A P. VI.

*De Laterum doloribus.*

15 S T O M A C H U S lateribus cingitur; atque  
in his quoque vehementes dolores esse  
confuerunt. Eorum initium vel ex fri-  
gore, vel ex ictu, vel ex nimio a cursu,  
20 vel ex morbo est. Sed interdum id ma-  
lum intra dolorem est: isque modo tarde,  
modo celeriter solvitur. interdum ad per-  
niciem quoque procedit; oriturque acutus  
morbus, qui *πλευριτικός*, à Græcis nomi-  
25 natur. Huic dolori lateris, febris b & tussis  
accedit: & per hanc excreatur, si tolerabilis  
morbus est, pituita; si gravis, sanguis. In-  
terdum etiam sicca tussis est, quæ nihil  
emolitur, idque vitio primo gravius, se-  
30 cundo tolerabilius est.

Remedium vero est magni & recentis do-  
loris, sanguis c missus. At, si levior, si  
vetustior casus est, vel supervacuum, vel  
serum id auxilium est; confugiendumque  
O ad

a Aretæus de Morb. Acut. I, 10. Trall. VI, 1. b Cæl. Aur.  
Acut. Morb. II, 13. c Cæl. Aurel. Acut. Morb. II, 18.

ad cucurbitulas est, ante summa cute incisa. Recte etiam sinapi ex aceto super pectus imponitur, donec ulcera pustulasque excitet; & tum medicamentum, quod humorem illuc citet. Præter hæc, circumdare

483, 3. primum oportet latus hapso lanæ sulphuratae: deinde, cum paululum inflammatio se remisit, siccis & calidis fomentis uti. Ab his transitus ad malagmata est.

250.

252.

Si vetustior dolor remanet, novissime resina imposita discutitur. Utendum cibis potionibusque calidis: vitandum frigus. Inter hæc tamen non alienum est extremas partes oleo & sulphure perfricare. Si levata tussis est, leni lectione uti: jamque & acres cibos, & vinum meracius assumere.

324, 18. Quæ ita à medicis præcipiuntur. Attamen sine his rusticos nostros epota ex aqua trixago satis adjuvare dicitur.

Hæc in omni lateris dolore communia sunt: plus negotii est, si acutus quoque morbus is factus est. In hoc, præter ea, quæ supra posita sunt, hæc animadvertenda sunt: ut cibus sit quam maxime tenuis & lenis, præcipueque sorbitio, eaque ex ptisana potissimum, aut jus in quo porrus cum pullo gallinaceo coctus sit: idque non nisi tertio die detur: si tamen per vires licebit: potui vero aqua mulsa, in quo hyssopum, aut ruta decocta sit. Quæ quibus temporibus danda sint, ex ratione vel adauctæ, vel levatæ febris apparebit, sic, ut in remissione quam maxima dentur: cum eo tamen, ut sciamus, non esse ejus generis tussi aridas fau-

fauces committendas. sæpe enim, ubi nihil est, quod excreetur, continuatur, & strangulat. Ob quam causam dixi etiam pejus id genus esse tussis, quod nihil, quam quod <sup>209, 3.</sup> pituitam moveret. Sed hic vinum forbere, ut supra præcepimus, morbus ipse non patitur: in vicem ejus, cremor ptisanæ sumendus est.

Ut his autem in ipso morbi fervore sustinendus æger est, sic, ubi paulum is remisit, alimenta pleniora, & vini quoque aliquid dari potest; dum nihil detur, quod aut refrigeret corpus, aut fauces asperet. Si in refectione vero manserit tussis, intermittere oportebit uno die; posteroque, cum cibo vini paulo plus assumere. At, invalescente quoque tussi, tum non erit alienum, ut supra quoque positum est, vini cyathos forbere. sed in hoc genere valetudinibus, dulce, vel certe lene commodius est. Si malum inveteravit, atletico victu corpus firmandum est.

C A P. VII.

25 *De Viscerum morbis: & primo, de Pulmone.*

**A**COMPAGINE corporis ad viscera transeundum est; & inprimis ad pulmonem veniendum. Ex quo vehemens & acutus morbus oritur, quem *πνεύμονιαν* Græci vocant. Ejus hæc conditio est. a Pulmo totus afficitur. hunc casum ejus subsequitur tussis, bilem vel pus trahens; præcordiorum totiusque pectoris gravitas, spiritus difficultas, magnæ febres,

O 2

con-

continua vigilia, cibi fastidium, tabes.  
 b Id genus morbi plus periculi quam doloris habet.

Oportet, si satis validæ vires sunt, sanguinem c mittere: sin minores, cucurbitulas sine ferro præcordiis admovere. Quod si satis valet, gestando ægrum, digerere: si parum, intra domum tantum dimovere. In potionem autem hyssopum dare, cum quo ficus arida sit incocta; aut aquam mulsam, in qua vel hyssopum vel ruta decocta sit. Fricatione uti diutissime in scapulis, proxime ab his in brachiis, & pedibus, & cruribus, leniter contra pulmonem; idque bis quotidie facere.

Quod ad cibum vero pertinet, huic nec falsis opus est, neque acribus, neque amaris, neque alvum adstringentibus, sed paulo lenioribus. Ergo primis diebus danda est forbitio ptisanæ, vel alicæ, vel oryzæ, cum qua recens adeps cocta sit. Cum hac, forbibile ovum, nuclei pinei: ex melle, panis, vel clota alica ex aqua mulsa. Potui danda deinde non solum pura aqua, sed etiam mulsa egelida; aut, si æstas est, etiam frigida; nisi quid obstat. Hæc autem altero quoque die, incrementum morbo dare satis est.

Ubi incrementum constitit, quantum res patitur, ab omnibus abstinendum est, præterquam aqua egelida. Si vires defunt, adjuvandæ sunt aqua mulsa. Profuntque adversus dolores imposita calida fomenta, vel ea, quæ simul & reprimunt & emolliunt. Prodest etiam impositus super pectus sal bene

bene contritus, cum cerato mistus; quia  
leviter cutem erodit, eoque impetum ma-  
teriae, qua pulmo vexatur, evocat. Utile  
etiam aliquod malagma est ex his, quæ ma-  
5 teriam trahunt. Neque alienum est, dum 250.  
premit morbus, clausis fenestris ægrum 252.  
continere: ubi paulum levatus est, ter aut  
quater die, fenestris aliquantum apertis,  
† purum aerem recipere. Deinde in refectio-  
10 ne pluribus diebus à vino abstinere; ge-  
statione, fricatione uti; forbitionibus, &  
prioribus cibis adjicere, ex oleribus por-  
rum; ex carne, ungulas, & summa truncu-  
lorum, atque pisciculos, sic, ut diu nihil  
15 nisi molle & lene sumatur.

C A P. VIII.

*De Hepaticis.*

20 **A**LTERIUS quoque visceris morbus,  
id est jecinoris, æque modo longus,  
modo acutus esse consuevit. ἡπατικόν  
Græci vocant. Dextra parte sub præcordiis  
vehemens dolor est: idemque ad latus dex-  
trum, & ad jugulum, a humerumque  
25 partis ejusdem pervenit: nonnunquam ma-  
nus quoque dextra torpet: horror validus  
est. Ubi male est, bilis evomitur: inter-  
dum singultus prope strangulat. Et hæc  
quidem acuti morbi signa sunt. Longioris  
30 vero, ubi suppuratio in jecinore est; dolor-  
que modo finitur, modo intenditur; dextra  
parte præcordia dura sunt, & tument; post  
cibum major spiritus difficultas est: accedit  
maxillarum quædam resolutio. Ubi invete-

O 3 ravit

† parvum vult Rhodius in Lexico Scribon. V. exiguum  
vinum. a Aretæus de Diurn. Morb. I, 13. Cælius Au-  
relian. Tard. Pass. III, 4.



ravit malum , venter & crura pedesque intumescunt; pectus atque humeri, circaque jugulum utrunque extenuatur.

In initio sanguinem mittere optimum est: tum venter solvendus est; si non potest aliter, per nigrum veratrum. Imponenda extrinsecus cataplasmata; primum quæ reprimant; deinde calida, quæ diducant; quibus recte iris vel apsinthium adjicitur: post hæc, malagma. Dandæ vero sorbitiones sunt, omnesque cibi & calidi, & qui non multum alunt, & fere qui pulmonis quoque dolori conveniunt; præterque eos, qui urinam movent, potionesque ad id efficaces. Utilia in hoc morbo sunt thymum, satureia, hyssopum, nepeta, amaracum, sesamum, lauri baccæ, pini flos, herba sanguinalis, mentha, ex malo cotoneo medium, columbæ jecur recens & crudum. Ex quibus quædam per se esse, quædam adjicere vel sorbitioni vel potioni licet; sic tamen, ut parce assumantur. Neque alienum est, apsinthium contritum ex melle & pipere, ejusque catapotium quotidie devorare. Abstinentum utique est ab omnibus frigidis, neque enim res ulla magis jecur lædit. Eri- cationibus utendum in extremis partibus. Vitandus omnis labor, omnis vehementior motus: ne spiritus quidem diutius continendus est. Ira, trepidatio, pondus, ja- ctus, cursus, in hoc inimica sunt. Perfusio corporis multa prodest ex aqua, si hiems est, calida; si æstas, tepida: itemque libera- lis unctio, & in balneo sudor.

Si

Si vero jecur vomica blaborat, eadem  
facienda sunt, quæ in cæteris interioribus  
suppurationibus. Quidam etiam ultra id  
scalpello caperunt, & ipsam vomicam ad-  
5 urunt.

C A P. IX.

De Lienosis. <sup>a</sup>

**A**T lienis ubi affectus est, intumescit,  
10 simulque cum eo pars sinistra; quæ  
& dura est, & prementi renititur;  
venterque intentus est: aliquis etiam cru-  
ribus tumor est. Ulcera aut omnino non  
fanescunt, aut certe cicatricem vix reci- 62, 26.  
piunt. In intenta ambulatione, vel cursu,  
15 dolor, & quædam difficultas est.

Hoc vitium quies auget. itaque exerci-  
tatione & labore opus est: habita tamen ra-  
tione, ne febrem ista, si nimium processerit,  
excitent. Unctiones <sup>b</sup>, frictionesque, &  
20 sudores necessarii sunt. Dulcia omnia ini-  
mica sunt: item lac & caseus. Acida au-  
tem maxime conveniunt. Ergo acetum  
acre per se sorbere, & magis etiam, quod  
scilla conditum est, expedit. Edenda sunt  
25 balsamenta, vel oleæ ex muria duræ; la-  
ctucæ intinctæ in aceto; intubi † quoque &  
betæ ex eodem; & sinapi, armoraciæ, & pa-  
stinacæ: de carnibus vero unguæ, rostra,  
aves macræ, ejusdemque generis venatio.  
30 Potui vero jejuno dari debet apsinthium  
aquæ incoctum: at post cibum aqua c à fer-  
rario fabro, in qua candens ferrum subin-  
de extinctum sit. hæc enim vel præcipue

<sup>b</sup> Aret. de Morb. Diut. Curat. I, 13. <sup>c</sup> Aph. VII, 45.  
<sup>a</sup> Cæli. Aurel. Tard. Pass. III, 4. Aret. de Morb. Diut.  
I, 14. Marcell. de Medic. cap. XXIII, p. 345. <sup>b</sup> Nicol.  
Myreps. de Ung. Sect. III, c. 64. 65. 66. 86. 87. † Nonn.  
de Re Cib. I, 12. <sup>c</sup> Scribon. Larg. c. 32. c. 132.

lienem coerces. quod animadversum est in his animalibus, quæ apud hos fabros educata exiguos lienes habent. Potest etiam dari vinum tenue, austerum; omniaque in cibis & potionibus, quæ urinæ movendæ sunt: præcipueque ad id valet vel trifolii semen, vel cuminum, vel apium, vel serpyllum, vel cytisus, vel thymum, vel hyssopum, vel satureia. hæc enim inde commodissime videntur humorem educere. Lienis quoque bubulus utiliter esui datur: præcipueque eruca & nasturtium lienem extenuant. Imponenda quoque extrinsecus sunt, quæ levant. fit ex unguentariis glandulis, quas *μυροβαλάνης* d Græci vocant: fit ex lini & nasturtii semine, quo vinum & oleum adjicitur: fit ex cupresso viridi, & arida ficu: fit ex sinapi, cui sevi hircini à renibus quarta pars ponderis adjicitur, teriturque in sole, & protinus imponitur. Multisque modis huic rei cappar aptum est. Nam & ipsum cum cibo assumere, & muriam ejus cum aceto forbere commodum est. Quin etiam extrinsecus radicem contritam, vel corticem ejus cum furfuribus, aut ipsum capparum cum melle contritum imponere expedit. Malagmata quoque huic rei aptantur.

251,  
18.250. &  
seqq.

## C A P. X.

*De Renum morbis.* a

30

**A**T renes ubi affecti sunt, diu male habent. Pejus vero est, si frequens biliosus vomitus accedit. Oportet con-

d Scribon. Larg. c. XXXII. c. 131. a Aretæus de Diat. Morb. II, 3. Curat. Morb. Diut. II, 3 Cælius Aurelian. Tard. Pass. V, 3.

conquiescere : cubare molliter : solvere al-  
vum; si aliter non respondet, etiam duce-  
re : sæpe desiderare in aqua calida: neque ci-  
bum, neque † portionem frigidam assumere:  
5 abstinere ab omnibus falsis, acribus, acidis,  
pomis: bibere liberaliter: adjicere modo ci-  
bo, modo potioni piper, porrum, ferulam,  
album papaver. quæ maxime inde urinam  
movere consuerunt.

10 Auxilio quoque his exulceratis sunt, si  
adhuc ulcera purganda sunt, cucumeris se-  
mina detractis corticibus sexaginta, nuclei  
ex pinu silvestri quindecim, anisi quod tri-  
bus digitis sumi possit; croci paulum, con-  
15 trita & in duas mulsi potiones divisa.

Si vero dolor tantum levandus est, ejus-  
dem cucumeris semina triginta, iidem nu-  
clei viginti, nuces Græcæ quinque, croci  
paululum, contrita & cum lacte potui data.

20 Ac insuper quoque recte quædam malagma-  
ta injiciuntur; maximeque ea, quæ humo- 250.  
ri extrahendo sunt.

C A P. XI.

25 *De Intestinorum morbis: & primo  
de Cholera.*

**A** VISCERIBUS ad intestina veniendum  
est, quæ sunt & acutis & longis mor-  
bis obnoxia. Primoque facienda men-  
30 tio est cholæræ; quia commune id sto-  
machi atque intestinorum vitium videri  
potest. Nam simul & dejectio a & vomitus  
est: præterque hæc inflatio est, intestina  
torquentur, bilis supra infraque erumpit,

O 5

pri-

† Plin. de R. M. L. V. C. 32.

a Aretæus de Morb. Acut. II, 5. Cælius Aurelian.  
Acut. Morb. III, 19.

primum aquæ similis, deinde ut in ea recens caro lota esse videatur, interdum alba, nonnumquam nigra, vel varia. Ergo eo nomine morbum hunc *χολέρα* Græci nominarunt. Præter ea vero, quæ supra comprehensa sunt, sæpe etiam crura manufque contrahuntur; urget sitis, anima deficit. quibus concurrentibus, non mirum est, si subito quis moritur. Neque tamen ulli morbo minori momento succurritur. 19

Protinus ergo, ubi ista cœperunt, aquæ tepidæ b quam plurimum bibere oportet, & vomere. Vix unquam ea sine vomitu sumitur: sed etiamsi non incidit, tamen corruptæ miscuisse novam materiam prodest; 15  
128, 24. parsque sanitatis est, vomitum esse suppressum. Si id incidit, protinus ab omni potione abstinendum est. Si vero tormina sunt, oportet frigidis & humidis fomentis stomachum fovere: vel, si venter dolet, iisdem 20  
egelidis, sic ut venter ipse mediocriter calentibus juvetur. Quod si vehementer & vomitus, & dejectio, & sitis vexant, & adhuc subcruda sunt, quæ vomuntur, nondum vino maturum tempus est: aqua, neque 25  
ea ipsa frigida, sed potius egelida danda est. Admovendumque naribus est pulegium ex aceto, vel polenta vino aspersa, vel mentha, vel quod secundum naturam est.

At cum discussa cruditas est, tum magis 30  
verendum est, ne anima deficiat. Ergo tum confugiendum est ad c vinum. Id esse oportet tenue, odoratum, & cum aqua frigida mixtum, vel polenta adjecta, vel infracto  
pane;

b Trallian. VII, 14. c Aretæus Acutor. Morb. Gurat. II, 4.



pane; quem ipsum quoque assumere expedit: quotiesque aliquid aut stomachus, aut venter effudit, toties per hæc vires restituere. Erasistratus primo tribus vini guttis, aut quinis aspergendam portionem esse dixit; deinde paulatim merum adjiciendum. Is, si ab initio vinum dedit, & metus cruditatis secutus est, non sine causa fecit: si vehementem infirmitatem  
 10 adjuvari posse tribus guttis putavit, erravit.

At si inanis est homo, & crura ejus contrahuntur, interponenda potio apianthii est. Si extremæ partes corporis frigent, un-  
 15 gendæ sunt calido oleo, cui ceræ paulum sit adjectum; calidisque fomentis nutriendæ. Si ne sub his quidem quies facta est, extrinsecus contra ventriculum ipsum cucurbitula admovenda est, aut sinapi super-  
 20 imponendum. Ubi is constitit, dormire oportet: postero die utique à potione abstinere: die tertio in balneum ire: paulatim se cibo reficere; somnoque, quisquis facile adquiescit; vitetque lassitudinem, & frigo-  
 25 ra. Si post suppressam choleram febricula manet, alvum duci necessarium est: tum cibus vinoque utendum est. Sed hic quidem morbus & d acutus est, & inter intestina stomachumque versatur sic, ut, cujus po-  
 30 tissimum partis sit, non facile dici possit.

## CAP.

d Hippocrat. VII, Epidem. XL, 20. Trallian. VII, 14.

## C A P. XII.

*De Cœliaco ventriculi morbo.*

**I**N ipfius vero ventriculi porta confiftit  
 is, qui & longus effe confuevit, & κοιλια-  
 κός à Græcis nominatur. Sub hoc venter  
 indurefcit, dolorque ejus eft: alvus nihil  
 reddit, ac ne fpiritum quidem † transmittit:  
 extremæ partes frigefcunt: difficulter fpiri-  
 tus redditur. 10

Commodiffimum eft inter initia calida  
 cataplafmata toti ventri imponere, ut dolo-  
 rem leniant. Post cibum vomere, atque ita  
 ventrem exinanire. Proximis deinde die-  
 bus cucurbitulas fine ferro ventri & coxis 15  
 admovere. Ventrem ipfum liquare dato la-  
 cte, & vino falfo, frigido. Si tempus anni  
 patitur, etiam viridibus ficis; fic tamen,  
 ne quis aut cibus, aut humor univerfus de-  
 tur, fed paulatim. Ergo per intervalla 20  
 temporis fat eft cyathos binos ternosve affu-  
 mere, & cibum pro portione hujus. com-  
 modeque facit cyatho lactis cyathus aquæ  
 miftus, & fic datus. Cibique calentes &  
 acres utiliores funt: adeo ut lacti quoque 25  
 recte contritum allium adjiciatur.

Procedente vero tempore, opus eft ge-  
 ftari; maximeque navigare; perfricari ter  
 aut quater die fic, ut nitrum oleo adjicia-  
 tur; perfundi aqua calida post cibum; dein- 30  
 de finapi imponere per omnia membra, ex-  
 cepto capite, donec arrodantur & rubeant;  
 maximeque fi corpus durum & virile eft.  
 paulatim deinde faciendus eft transitus ad  
 ea,

† Planè contrarium dicit Marcellus cap. XXVII.  
 p. 363.

ea, quæ ventrem comprimunt. Assa caro danda, valens, & quæ non facile corrumpatur: in potum vero pluviatilis aqua decocta; sed quæ per binos ternosve cyathos bibatur.

Si vetus vitium est, oportet laser quam optimum ad piperis magnitudinem devorare: altero quoque die vinum vel aquam bibere, interdum interposito cibo, singulos vini cyathos sorbere: ex inferiori parte infundere aquam pluviatilem egelidam; maximeque, si dolor in imis partibus remanet.

C A P. XIII.

15 *De Tenuioris intestini morbo.*

**I**NTRA ipsa vero intestina consistunt duo morbi: quorum unus in tenuiore, alter in pleniore est. Prior acutus est: infrequens esse longus potest. Diocles Carystius tenuioris intestini morbum *αχέρδαψον*, plenioris *εϊλεόν* nominavit. A plerisque video nunc illum priorem *εϊλεόν*, hunc *χολικόν* nominari. Sed prior modo supra umbilicum, modo sub umbilico dolorem movet. Fit in alterutro loco inflammatio: nec alvus, nec spiritus *b* infra transmittitur. Si superior pars affecta est, cibus: si inferior, stercus per os redditur: si utralibet, metus est. Adjicitur periculo, si vomitus *c* biliosus, mali odoris, aut varius, aut niger est. 74, 20.

Remedium est, sanguinem mittere; vel cucurbitulas pluribus locis admovere, non ubique cute incisa: id enim duobus aut tribus locis satis est: ex cæteris spiritum evoca-

a Cæli. Aurelian. Acutor. Morb. III, 17. b Aretæus de Morb, Acut. II, 6. c Aph. VII, 10.

evocare abunde est. Tum animadvertere oportet, quo loco malum sit. solet enim contra id tumere. Et si supra umbilicum est, alvi ductio utilis non est. Si infra est, alvum ducere interdum, ut Erasistrato d<sup>o</sup> placuit, optimum est, & sæpe id auxilii in his partibus magnum remedium est. Ducitur autem percolato ptisanæ cremore, cum oleo & melle sic, ut præterea nihil adjiciatur. Si nihil tumet, duas manus imponere oportet supra summum ventrem, paulatimque deducere. inveniatur enim mali locus; qui necesse est renitatur: & ex eodem demum deliberari poterit, ducenda, nec ne alvus sit.

Illa communia sunt: calida cataplasmata admovere, eaque imponere à mammis usque ad inguina, & spinam; ac sæpe mutare: brachia, cruraque perfricare: demittere totum hominem in calidum oleum. Si dolor non quiescit, etiam in alvum ex parte inferiore tres aut quatuor cyathos calidi olei dare. Ubi per hæc consecuti sumus, ut ex inferiore parte spiritus transmittatur, offerre potui multum tepidum non multum. (nam ante magna cura vitandum est, ne quid bibat.) si id commode cessit, adjicere forbitionem.

Ubi dolor & febricula quierunt, tum demum uti cibo pleniore; sed neque inflante, neque valido, ne intestina adhuc imbecilla lædantur. potui vero nihil præterquam puram aquam. Nam siue quid violentum siue acidum est, id huic morbo alienum est.

Ac

Ac postea quoque vitare oportet balneum, ambulationem, gestationem, cæterosque corporis motus. Nam facile id malum redire consuevit; & cum frigus subit, sive aliqua jactatio, nisi bene jam confirmatis intestinis, revertitur.

## C A P. XIV.

*De Morbo intestini plenioris. a*

10 **I**S autem morbus, qui in intestino pleniore est, in ea maxime parte est, qua cæcum esse proposui. Vehemens fit inflatio, vehementes dolores, dextra magis parte: intestinum verti videtur; quod prope spiritum clidit. In plerisque post frigora  
15 cruditatesque oritur, deinde quiescit; & per ætatem sæpe repetens sic cruciat, ut vitæ spatio nihil demat.

Ubi is dolor cepit, admovere sicca &  
20 calida fomenta oportet; sed primo lenia, deinde validiora; simulque fricatione ad extremas partes, id est, crura brachiaque materiam evocare. Si discussus non est, qua dolet, cucurbitulas sine ferro defigere. Est  
25 etiam medicamentum ejus rei causa comparatum, quod *κολικόν* nominatur. Id se repperisse Cassius gloriabatur. magis prodest potui datum. sed impositum quoque extrinsecus, digerendo spiritum, dolorem  
30 levat.

Nisi finito vero tormento, recte neque cibus neque potio assumitur. Quo victu ut utendum iis, qui hoc genere tentantur, jam mihi dictum est. Confectio medicamenti,  
quod

a Trallian. X, 1. Aretzus de Morb. Diurnis. II, 8. Cæl. Aurelian. Tard. Pass. IV. 7.



281, 7. quod *κολικόν* nominatur, ex his b constat. Costi, anisi, castorei, singulorum p. \* III. petroselinii p. \* IV. piperis longi, & rotundi, singulorum p. \* V. papaveris lacrymæ, junci rotundi, myrrhæ, nardi, singulorum p. \* VI. quæ melle excipiuntur. Id autem & devorari potest, & ex aqua calida sumi.

## C A P. XV.

*De Torminibus.*

69, 3. **P**ROXIMA his inter intestinorum mala tormina esse consueverunt. *δυσεντερίαι* Græce vocatur. Intus intestina a exulcerantur : ex his cruor manat; isque modo cum stercore aliquo semper liquido, modo cum quibusdam quasi mucosis excernitur; interdum simul quædam † carnosâ descendunt. Frequens dejiciendi cupiditas, dolorque in ano est. Cum eodem dolore exiguum aliquid emittitur : atque eo quoque tormentum intenditur; idque post tempus aliquod levatur, exiguaque requies est, somnus interpellatur, febricula oritur, longoque tempore id malum, cum inveteraverit, aut tollit hominem, aut, etiamsi finitur, excruciat.

Oportet inprimis conquiescere; siquidem omnis agitatio exulcerat : deinde jejunum sorbere vini cyathum, cui contrita radix quinquefolii sit adjecta : imponere cataplasmata super ventrem, quæ repriment; quod in superioribus ventris morbis non expedit : quotiesque defecit, subluere aqua calida, in qua decoctæ verbenæ sint :

b Scrib. Larg. cap. XXIX. Com. 120. Nicol. Myreps. sect. xxxi. de Catapl. c. 5. a Trallian. VIII. 9. Aretæus de Morb. Diuturn. II, 9. Hippocr. de Affection. XXIV. † Aphor. IV, 26.

sint : portulacam vel coctam , vel ex dura muria edisse ; cibos potionesque eas , quæ adstringunt album.

- Si vetustior morbus est , ex inferioribus
- 5 partibus tepidum infundere vel ptisanæ cremorem , vel lac , vel adipem liquatam , vel medullam cervinam , vel oleum , vel cum rosa butyrum , vel cum eadem album crudum ex ovis , vel aquam , in qua lini semen
- 10 decoctum sit ; vel , si somnus non accedit , vitellos cum aqua , in qua rosæ floris folia cocta sint. Levant enim dolorem hæc , & mitiora ulcera efficiunt ; maximeque utilia sunt , si cibi quoque secutum fastidium est.
- 15 Themison b muria dura quam asperrima sic utendum memoriæ prodidit.

- Cibi vero esse debent , qui leniter ventrem adstringant. At ea , quæ urinam movent , si id consecuta sunt , in aliam partem
- 20 humorem avertendo profunt : si non sunt consecuta , noxam augent. itaque nisi in quibus prompte id facere consuerunt , non sunt adhibenda. Potui , si febricula est , aqua pura calida , vel ea , quæ ipsa quoque adstringat , dari debet : si non est , vinum leve , austerum. Si pluribus diebus nihil remedia illa juverunt , vetusque jam vitium est , aquæ bene frigidæ potio assumpta ulcera
- 25 adstringit , & initium secundæ valetudinis facit. Sed ubi venter suppressus est , protinus ad calidam potionem revertendum est.

Solet autem interdum etiam putris fæces , pessimique odoris descendere : solet &

P

inter-

b Cæl. Aurelian. Tard. Pass. IV, 6. Galen. Meth. Med. XII. c. 1. Joan. Baptist. Sylvat. Med. Histor. 62.

216 A. CORN. CELSI Lib. 4.  
interdum purus sanguis profluere. Si superius vitium est, alvus aqua mulsa delui debet; tum deinde etiam infundi, quæ supra comprehensa sunt. Valensque est etiam adversus cancerem intestinorum, minii gleba cum salis hemina contrita: sin minus, mista his aqua in alvum datur. At, si sanguis profluit, cibi portionesque esse debent, quæ adstringant.

C A P. X V I.

10

*De Lævitate intestinorum. a*

64, 10. **E**X torminibus b interdum intestinorum lævitas oritur; qua continere nihil possunt, & quicquid assumptum est, inconfectum protinus reddunt. Id interdum ægros trahit, interdum præcipitat.

In hoc utique adhibere oportet compri-  
mentia; quo facilius tenendi aliquid inte-  
stinis vis sit. Ergo & super pectus ponatur  
sinapi; exulcerataque cutè, malagma, c quod  
humorem evocet: & ex verbenis decocta  
in aqua desideat; & cibos portionesque assu-  
mat, quæ alvum adstringunt; & frigidis uta-  
tur perfusionibus.

Oportet tamen prospicere, ne, simul his  
omnibus admotis, vitium contrarium per  
immodicas inflationes oriatur. Paulatim  
ergo firmari intestina debebunt, aliquibus  
quotidie adjectis. Et cum in omni fluore  
ventris, tum in hoc præcipue necessarium  
est, non quoties libet desidere, sed quoties  
neesse est, ut hæc ipsa mora in consuetu-  
dinem ferendi oneris intestina deducat.

Alte-

a Hippocr. de Affection. T. XXV. Aretæus de  
Morb. Diutur. II, 10. b Aphor. VII, 76. c Nicol.  
Myreps. Sect. XXXIV. c. 9.

Alterum quoque, quod æque ad omnes  
 similes affectus pertinet, in hoc maxime  
 servandum est; ut, cum pleraque utilia in-  
 suavia sint, qualis est plantago, & rubi, &  
 5 quicquid malicorio mixtum est, ea potissi-  
 mum ex his dentur, quæ maxime æger vo-  
 let. Deinde, si omnia ista fastidiet, ad ex-  
 citandam cibi cupiditatem, interponatur ali-  
 quid minus utile, sed magis gratum. Exer-  
 10 citationes & fricationes huic quoque morbo  
 necessariae sunt: & cum his sol, ignis, bal-  
 neum, vomitus d, ut Hippocrati visum est;  
 etiam albo veratro e, si cætera parum profi-  
 cient, evocatus.

15

## C A P. XVII.

*De Lumbricis alvum occupantibus.*

NONNUNQUAM autem lumbrici quo-  
 20 que occupant alvum, hique modo  
 ex inferioribus partibus; modo, quod  
 foedius, ore a redduntur. Atque interdum  
 latos eos, qui pejores sunt; interdum tere-  
 tes videmus.

Si lati sunt, aqua potui dari debet, in  
 25 qua lupinum, aut cortex mori decoctus sit;  
 aut cui adjectum sit contritum vel hyflo-  
 pum, vel piperis acetabulum, scammonæ  
 paulum. Vel etiam pridie, cum multum al-  
 30 lium ederit, vomat. Posteroque die mali-  
 punici tenues radículas colligat, quantum  
 manu comprehendet; easque contusas in  
 aquæ tribus sextariis decoquat, donec ter-  
 tia pars supersit; huic adjiciat nitri paulum,  
 & jejunos bibat. Interpositis deinde tribus

P 2

horis,

d Aph. IV, 12. e De Victu Acutor. LVI, 6. Quate-  
 nus sc. fluxio ex capite, de Affection. XXV, 6. a Seren.  
 Sam. XXX, 5. Cælius Aurel. Tard. Pass. IV, 8.

103, 31. horis, duas potiones sumat talis aquæ, vel  
 muriæ duræ huic adjectæ; tum desideat, sub-  
 jectæ calida aqua in pelve.

Si vero teretes sunt, qui pueros maxime  
 exercent, & eadem dari possunt, & quæ- 5  
 dam leviora; ut contritum semen urticæ,  
 aut brassicæ, aut cumini cum aqua, vel men-  
 tha b cum eadem, vel apsinthium decoctum,  
 vel hyssopum ex aqua mulsa, vel nasturtii  
 semen cum aceto contritum. Edisse etiam 10  
 & lupinum, & allium prodest; vel in alvum  
 oleum subter dedisse.

## C A P. XVIII.

*De Tenesmo.*

**E**ST autem aliud levius omnibus proxi- 15  
 mis, de quibus supra dictum est, quod  
 τεινεσµόν Græci vocant. Id neque acu-  
 tis neque longis morbis annumerari de-  
 bet, cum facile a tollatur, neque unquam  
 per se jugulet. In hoc æque atque in tor- 20  
 minibus frequens desidendi † cupiditas est;  
 æque dolor, ubi aliquid excernitur. De-  
 scendunt autem pituitæ b mucisque similia;  
 interdum etiam leviter subcruenta; sed his  
 interponuntur nonnunquam ex cibo quoque 25  
 recte cocta.

Desidere oportet in ‡ aqua calida; sæpius-  
 que ipsum anum nutrire. cui rei plura me-  
 dicamenta idonea sunt: butyrum c cum ro- 30  
 sa; acacia ex aceto liquata; emplastrum id,  
 quod τετραφάρμακον Græci vocant, rosa li-  
 quatum; alumen lanæ circumdatum, & ita  
 appositum. eademque ex inferiore parte  
 in-

262, II.

b Seren. Sammon. XXX, 11. a Plin. H. N. XXVIII.  
 14. † Marcell. de Med. c. XXVIII, p. 372. b Hip-  
 pocrat. de Affection. T. xxvii. ‡ Hippocrat de  
 Fistul. c Al. Trallian. VIII, 6.



indita, quæ torminum auxilia sunt: eadem verbenæ decoctæ, ut inferiores partes foveantur. Alternis vero diebus aqua, alternis leve & austerum d vinum bibendum est. Potio esse debet egelida & frigidæ prior: ratio victus talis, qualem ad tormina supra præcepimus.

C A P. XIX.

*De Ventris fluxu.*

10

LEVIOR etiam, dum recens, dejectio, lubi & liquida alvus, & sæpius quam ex consuetudine fertur. In qua interdum tolerabilis dolor est, interdum gravissimus; idque pejus est. Sed uno die fluere alvum sæpe pro valetudine est: atque, etiam pluribus, dum febris absit, & intra septimum diem id conquiescat. Purgatur enim corpus, &, quod intus læsurum erat, utiliter effunditur. Verum spatium periculosum est. interdum enim tormina ac febri- culas excitat, viresque consumit.

Primo die quiescere satis est; neque impetum ventris prohibere. Si per se desit, balneo uti, paulum cibi capere: si mansit, abstinere non solum à cibo, sed etiam à portione. Postero die, si nihilominus liquida alvus est, æque conquiescere; paululum adstringentis cibi sumere. Tertio die in balneum ire; vehementer omnia præter ventrem perfricare; ad ignem lumbos, scapulasque admovere; cibis uti, sed ventrem contrahentibus; vino non multo, meraco. Si postero quoque die fluet, plus edisse, sed

P 3

vomere

vomere etiam. Ex toto, donec conquiescat, contra fiti, fame, vomitu niti. Vix enim fieri potest, ut, post hanc animadversionem, alvus non contrahatur.

232, 5.

Alia via est, ubi velis supprimere, cœna- 5  
re, deinde vomere: postero die lecto con-  
quiescere, vesperi ungi, sed leviter: dein-  
de panis circa selibram ex vino a aminæo  
mero sumere; tum assum aliquid, maxime-  
que avem; & postea vinum idem bibere 10  
aqua pluviatili mixtum, idque usque quin-  
tum diem facere, iterumque vomere. Frigida  
autem assidue potionem esse debere,  
contra priores authores Asclepiades affir-  
mavit, & quidem quam trigidissimam. Ego 15  
experimentis quemque in se credere debe-  
re existimo, calida potius, an frigida utatur.

Interdum autem evenit, ut id malum, pluribus diebus neglectum, curari diffici- 20  
lius possit. A vomitu oportet incipere: deinde postero die vesperi tepido loco ungi; cibum modicum assumere, vinum meracum quam asperrimum; impositam super ventrem habere cum cerato rutam. 25  
In hoc autem affectu corporis neque ambulatione, neque fricatione opus est: vehiculo sedisse, vel magis etiam equo, prodest. neque enim ulla res magis intestina confir-  
mat. 30

Si vero etiam medicamentis utendum est, aptissimum est, quod ex pomis fit. Vindemiæ tempore in grande vas conjicienda sunt pira atque mala silvestria. si ea non sunt,

a Virgil. Georg. II, 97. Auson. Epist. V. v. 13.

sunt, pira <sup>b</sup> Tarentina viridia, vel Signina, mala <sup>c</sup> Scandiana vel <sup>†</sup> Amerina, <sup>d</sup> myrrhapia: hisque adjicienda sunt cotonea, & cum ipsis corticibus suis punica, forba, &, quibus magis utimur, etiam torminalia, sic ut hæc tertiam ollæ partem teneant: tum deinde ea musto implenda est; coquendumque id, donec omnia, quæ indita sunt, liquata, in unitatem quandam coeant. Id gustui <sup>70</sup> non insuave est: &, quodocunque opus est, assumptum leniter, sine ulla stomachi noxa, ventrem tenet. duo aut tria cochlearia uno die <sup>80</sup> sumpsisse, fatis est. Alterum valentius genus: myrti baccas legere, ex his vinum <sup>15</sup> exprimere, id decoquere, ut decima pars remaneat, ejusque cyathum forbere. Tertium, quod quodocunque fieri potest, malum punicum excavare, exemptisque omnibus feminibus, membranas, quæ inter ea fuerunt, <sup>20</sup> iterum conjicere: tum infundere cruda ova, rudiculaque miscere: deinde malum ipsum super prunam imponere; quod, dum humor intus est, non aduritur: ubi ficcum esse cœpit, remove oportet, extractumque cochle- <sup>25</sup> ari, quod intus est, edisse. Hoc, aliquibus adjectis, majus momentum habet. Itaque etiam in piperatum conjicitur, misceturque cum sale & pipere, esturque ex his. Edenda est pulvicula etiam, cum qua paulum ex favo vetere coctum sit. Et lenticula cum malicorio cocta, rubique cacumina in aqua decocta, & ex oleo atque aceto assumpta, efficacia sunt: ut & ea aqua, in

P 4

qua

<sup>b</sup> Plin. H. N. XV, 15. <sup>c</sup> Scribon. Larg. Comp. 104. Plin. H. N. XV, 15. <sup>†</sup> Gataker. Adversar. Miscellan. cap. 5. pag. 35. I. Rhodius ad Scribon. Larg. comp. 64. <sup>d</sup> Myrrhopia Plin. H. N. XV. 15.

qua vel palmulæ, vel malum cotoneum, vel arida sorba, vel rubi decocti sunt, potata. quod genus significo, quoties potionem dandam esse dico, quæ adstringat. Tritici quoque hemina in vino aminæo austero decoquitur; idque triticum jejuno ac sitienti datur; superque id vinum id sorbetur, quod jure valentissimis medicamentis annumerari potest. Atque etiam potui datur vinum Signinum, vel resinatum austerum, vel quodlibet austerum. Contunditurque cum corticibus, seminibusque suis punicum malum, vinoque tali miscetur: idque vel merum sorbet aliquis, vel bibit mixtum. Sed medicamentis uti, nisi in vehementibus malis, supervacuum est.

## C A P. X X.

*De Vulva morbo.*

**E**X vulva quoque foeminis vehemens malum nascitur: proximeque ab stomacho, vel afficitur hæc, vel corpus afficit. Interdum etiam sic exanimat, ut tanquam comitali a morbo prosternat. Distat tamen hic casus, eo quod neque oculi vertuntur, nec spumæ profluunt, nec nervi distenduntur: sopor tantum est. Id vitium quibusdam foeminis crebro revertens perpetuum evadit.

Ubi incidit, si satis virium est, b sanguis missus adjuvat: si parum est, cucurbitulæ tamen defigendæ sunt in inguinibus. Si diutius aut jacet aut alioqui jacere consuevit,

a Aræteus de Morb. Acut. II, 11. b Idem de Curat. Acut. II, 10.

suevit, admovere oportet naribus extin-  
ctum ex lucerna linamentum, vel aliud ex  
his, quæ foedioris esse c odoris retuli, quod  
mulierem excitet. Idemque aquæ frigidæ  
5 perfusio efficit. Adjuvatque ruta contrita  
cum melle, vel ex cyprino ceratum, vel  
quodlibet calidum & humidum catapla-  
sma, naturalibus pube tenus impositum. In-  
ter hæc etiam perfricare coxas, & poplites  
10 oportet.

Deinde, ubi ad se rediit, circumciden-  
dum vinum est in totum annum †, etiam si  
casus idem non revertitur. Fricatione quo-  
tidie utendum totius quidem corporis,  
15 præcipue vero ventris, & poplitem. Cibus  
ex media materia dandus. Sinapi super-  
imium ventrem tertio quoque aut quarto  
die imponendum, donec corpus rubeat.

Si durities manet, mollire commode  
20 videtur solanum in lac demissum, deinde  
contritum, & cera alba atque medulla cer-  
vina cum irino; aut sebum taurinum vel  
caprinum cum rosa mistum. Dandum po-  
tui etiam vel castoreum est, vel git, vel  
25 anethum. Si parum pura est, purgetur  
junco quadrato. Si vero vulva exulcerata  
est, ceratum ex rosa fiat: etiam recens suil-  
la adeps, & ex ovis album misceatur, idque  
apponatur; vel album ex ovo cum rosa  
30 mistum, adjecto, quo facilius consistat,  
contritæ rosæ pulvere. Dolens vero vulva  
sulphure suffumigari debet.

At, si purgatio nimia mulieri nocet, reme-  
dio sunt cucurbitulæ, cute incisa, inguini-

P 5

bus

c Hippocr. II. de Morb. Mulier. LX. 10. 11. Are-  
tæus de Curat. Acut. II. 10. † delet Rittershusius ad  
Phædrum L. IV. fab. 20.



83, 23.

bus d vel etiam sub mammis admotæ. Si maligna purgatio est, subjicienda sunt \*coercentia. Id faciunt etiam albæ † violæ, nigrum papaver cum melle assumptum, & gummi cum trito semine apii liquatum, & cum cyatho passi datum.

Præter hæc, in omnibus vulvæ doloribus idoneæ potiones sunt, quæ ex odoribus fiunt, id est spica nardi, croco, cinnamomo, casia, similibusque. Idemque etiam decocta lentiscus præstat. Si tamen intolerabilis dolor est, & sanguis profluit, etiam sanguinis detractio apta est; aut certe coxis admotæ cucurbitulæ eute incisa.

2. De Urina nimia profusione. e

At cum urina super potionum modum mingitur, & jam sine dolore profluens maciem & periculum facit, si tenuis est, opus est exercitatione & fricatione, maximeque in sole, vel ad ignem. Balneum rarum esse debet, neque longa in eo mora: cibus comprimens: vinum fausterum meracum; per æstatem, frigidum; per hiemem, egelidum; sed tantum, quantum minimum fit. Infima alvus quoque vel ducenda vel lacte purganda est. Si crassa urina est, vehementior esse debet & exercitatio, & frictio: longior in balneo mora: cibus opus est teneris: vinum idem. In utroque morbo vitanda omnia sunt, quæ urinam movere consuerunt.

C A P.

d Aphor. V, 50. † Mercurialis Variar. Lect. L. I. c. 3. videtur *olivas* legisse, quo loco multa de olivis albis. e Aretæus de Morb. Diuturn. II, 2. Æginet. II, 14. & III, 45. Trall. IX, 8. f Aretæus de Curat. Diut. II, 2.

## C A P. XXI.

*De Seminis nimia ex naturalibus profusione. a*

EST etiam circa naturalia vitium, nimia profusio seminis. quod sine venere, sine nocturnis b imaginibus sic fertur, ut, interposito spatio, tabe hominem consumat.

In hoc affectu salutare sunt vehementes fricationes, perfusiones, natationesque quam frigidissimæ: neque cibi, nec potio, nisi frigida assumpta. Oportet autem vitare cruditates, & omnia infantia: nihilque ex

his assumere, quæ contrahere semen videntur; qualia sunt, filigo, similia, ova, alica, amyllum, omnis caro glutinosa, piper, eruca, bulbi, nuclei pinei. Neque alienum est, fovere inferiores partes aqua, decocta ex verbenis comprimentibus, ex iisdem aliqua cataplasmata imo ventri inguinibusque circumdare; præcipueque ex aceto. Vitare autem oportet rutam, & ne supinus dormiat.

25

## C A P. XXII.

*De Coxarum morbis. a*

SUPEREST, ut ad extremas partes corporis veniam, quæ articulis inter se conferuntur. Initium à coxis faciam. Harum ingens dolor esse consuevit: isque hominem sæpe debilitat, & quosdam non dimittit. Eoque id genus difficillime curatur, quod fere post longos b morbos vi pestifera

a Aret. de Morb. Diut. II, 5. & de Cur. Diut. II, 5. Tral. XI, 9. b Cæl. Aurel. Tard. pass. V, 5. a Equitatio. Plin. XXVIII. cap. 4. in fine. II. Præd. XLV. Aret. de Diut. II, 12. b Aret. de Curat. Diut. II, 12.

tera huc se inclinat : quod ut alias partes liberat ; sic hanc ipsam quoque affectamprehendit.

Fovendum primum aqua calida est : deinde utendum calidis cataplasmatibus. Maxime prodesse videtur, aut cum hordeacea farina, aut cum ficu ex aqua decocta mixtus capparum cortex concisus ; vel lolii farina ex vino diluto cocta, & mixta cum arida fece. quæ quia refrigerant, imponere noctu malaginata commodius est. Inulæ quoque radix contusa, & postea ex vino austero cocta, & late super coxam imposita, inter valentissima auxilia est. Si ista non solverunt, sale calido & humido utendum est.

Si ne sic quidem finitus dolor est, aut tumor ei accedit, incisa cute admovendæ sunt cucurbitulæ: movenda urina: alvus, si compressa est, ducenda. Ultimum est, & in uteri quoque morbis efficacissimum, tribus aut quatuor locis super coxam, † cutem candentibus ferramentis exulcerare. Frictione quoque utendum est, maxime in sole, & eodem die sæpius : quo facilius ea, quæ coeundo nocuerunt, digerantur. Eaque, si nulla exulceratio est, etiam ipsis coxis : si est, cæteris partibus adhibenda est. Cum vero sæpe aliquid exulcerandum candenti ferramenti sit, ut materia inutilis evoceatur, illud perpetuum est, non, ut primum fieri potest, hujus generis ulcera sanare: sed ea trahere, donec id vitium, cui per hæc opiculamur, conquiescat.

C A P.

¶ N. Myrepl. Sect. XXXIV, c. 12. † Aphor. VI, 60.

## CAP. XXIII.

*De Genuum dolore. a*

5 **C**OXIS proxima genua sunt. in quibus  
 ipsis nonnunquam dolor esse consue-  
 vit. In iisdem autem cataplasmatibus  
 cucurbitulisque præsidium est : sicut etiam,  
 cum in humeris, aliisque commissuris do-  
 10 lora aliquis exortus est. Equitare ei, cui 240. 7.  
 genua dolent, inimicissimum omnium est.  
 Omnes autem ejusmodi dolores, ubi inve-  
 teraverunt, vix citra unctionem finiuntur.

## CAP. XXIV.

*De Manuum & pedum articularumque vitiis. a*

15 **I**N manibus pedibusque articularum vi-  
 tia frequentiora longioraque sunt. Quæ  
 in podagricis chiragricisque esse consue-  
 runt, ea raro vel b castratos, vel c pueros  
 ante foeminae coitum, vel d mulieres, nisi  
 20 quibus menstrua suppressa sunt, tentant.

Ubi sentire coeperunt, † sanguis mitten-  
 dus est. id enim inter initia statim factum,  
 sæpe annuam, nonnunquam perpetuam  
 valetudinem bonam præstat. Quidam  
 25 etiam, cum asinino lacte potu ex toto se  
 eluissent, in perpetuum hoc malum evase-  
 runt. Quidam, cum toto anno à vino, mul-  
 so, venere sibi temperassent, securitatem  
 totius vitæ consecuti sunt. idque utique  
 30 post primum dolorem servandum est,  
 etiamsi quiescit. Quod si jam consuetudo  
 ejus facta est, potest quidem aliquis esse se-  
 curior

a Marcell. de Med. c. XXXIV. a Cæli. Aureliani.  
 Tard. Pass. V, 2. Trall. XI, 1. Aret. de Morb. Diut. II,  
 12. b Aph. VI, 28. c Aph. VI, 30. d Aph. VI, 29. † Ches-  
 neau IV, 1. de Arthrit. pag. 419, 420. Willis cap. 14.  
 de Arthrit.

curior his temporibus, quibus dolor se remittit: majorem vero curam adhibere debent hi, quibus id revertitur. quod fere e vere autumnove fieri solet.

Cum vero dolor non urget, mane gestari debet; deinde ferri, aut inambulatione leni se dimovere, & si podagra est, interpositis temporibus exiguis, invicem modo sedere, modo ingredi; tum, antequam cibum capiat, sine balneo, loco calido leniter perfricari, sudare, perfundi aqua egelida: deinde cibum sumere ex media materia, † interpositis rebus urinam moventibus, quotiesque plenior est, evomere.

Ubi dolor vehemens urget, interest, sine tumore is sit, an tumor cum calore, an tumor jam etiam obcaluerit. Nam, si tumor nullus est, calidis fomentis opus est. Aquam marinam, vel muriam duram fervere oportet, deinde in pelvem conjicere, & cum jam homo pati potest, pedes demittere superque pallam dare, & vestimento tegere, paulatim deinde juxta labrum ipsum ex eadem aqua leniter infundere, ne calor intus destituat; ac deinde nocte cataplasmata † calefacientia imponere, maximeque hibisci ‡ radicem ex vino coctam. Si vero tumor calorque est, utilioraque sunt refrigerantia, recteque in aqua quam g frigidissima articuli continentur; sed neque quotidie, neque diu fiat, ne nervi indurescant. Imponendum vero est cataplasma, quod refrigeret: neque tamen in hoc ipso diu permanendum; sed ad ea trans-

e Aphor. VI, 55. † Optime, quia materia serosa est. ‡ Aretæus de Curat. Diut. II, 12. † Plin. H. N. L. XX. c. 4. g Aph. V, 25.



Cap. 24. MEDICINA. 239  
eundum, quæ sic reprimunt, ut emol-  
liant.

Si major est dolor, papaveris cortices in  
vino coquendi, miscendique cum cerato  
5 sunt, quod ex rosa factum fit: vel ceræ &  
adipis suillæ tantundem una liquandum,  
deinde his vinum miscendum, atque ubi,  
quod ex eo impositum est, incaluit, detra-  
hendum, & subinde aliud imponendum est.

10 Si vero tumores etiam obcaluerunt, &  
dolent, levat spongia imposita, quæ subinde  
ex oleo, vel aceto, vel aqua frigida expri-  
mitur; aut pari portione inter se mista, pix,  
cera, alumen. Sunt etiam plura idonea  
15 manibus pedibusque h malagmata. Quod si 259, 15.  
nihil superimponi dolor patitur, id, quod  
sine tumore est, fovere oportet spongia,  
quæ in aquam calidam demittatur, in qua  
vel papaveris cortex, vel cucumeris silve-  
20 stris radix decocta sit; tum inducere arti-  
culis crocum cum succo papaveris & ovillo  
lacte.

At si tumor est, foveri quidem debet  
aqua egelida, in qua lentiscus, aliave ex  
25 reprimentibus verbena decocta sit: induci  
vero medicamentum ex nucibus amaris  
cum aceto tritis; aut ex cerussa, cui con-  
tritæ herbæ muralis succus sit adjectus. La-  
pis etiam, qui carnem edit, quem σαροφαί-  
30 γον Græci vocant, excisus sic, ut pedes ca-  
piat, demissos eos, cum dolent, retentosque  
ibi levare consuevit. Ex quo in Assio i sepul-  
chra faciunt. Et lapidi Assio k gratia est ad  
juvandum.

Ubi

h Nicol. Myreps. Sect. XXXIV. c. X, XI. Scrib.  
Larg. c. XLI. Comp. 158, 159. i Plin. H. N. XXXVI.  
17. k Plin. loco. cit. Oribas. Synops. II, 56.

Ubi dolor & inflammatio se remiserunt, (quod intra dies l trīginta fit, nisi vitium hominis accessit) modicis exercitationibus, abstinentia, unctiōibus lenibus utendum est sic, ut etiam cum acopo, vel liquido cerato cyprino articuli perfricentur. Equitare podagricis quoque alienum est. 5

237.9.

Quibus vero articulorum dolor certis temporibus revertitur, hos ante & curioso victu cavere oportet, ne inutilis materia corpori supersit : & crebriore vomitu, & , si quis ex corpore metus est, vel, alvi ductiōe uti, vel lacte purgari. Quod Erasistratus in podagricis m expulit : ne in inferiores partes factus cursus pedes replet : cum evidens sit omni purgatione non superiora tantummodo, sed etiam inferiora exinaniri. 10 15

## C A P. XXV.

*De Refectiōe convalescentium à morbo.* 20

EX quocunque autem morbo quis convalescit, si tarde confirmatur, vigilare prima luce debet; nihilominus in lecto conquiescere : circa tertiam horam leniter unctis manibus corpus permulcere. Deinde delectationis causa, quantum juvat, ambulare, circumcisa omni negotiosa actione. Tum gestari diu : multa fricatione uti : loca, cœlum, cibos sæpe mutare. Ubi triduo quatrduove vinum bibit, uno aut etiam altero die interponere aquam. Per hæc enim fiet, ne in vitia tabem inferentia incidat, & ut mature vires suas recipiat. Cum vero 30

vero  
l Alii quadraginta, Aph. VI, 49. m Libro quo de Podagra scripsit. Cælius Aurelian. Tard. Pass. II, 2. in fine.

Cap. 25. MEDICINA. 241  
vero ex toto convaluerit, periculose vitæ  
genus subito mutabit, & inordinate aget.  
Paulatim ergo debet, omiffis his legibus,  
eo tranfire, ut arbitrio fuo vivat.

## LIBER QUINTUS.

### PRÆFATIO.

10 **D**IXI de his malis corporis, qui-  
bus victus ratio maxime sub- 3, 29.  
venit. nunc tranfeundum est  
ad eam medicinæ partem, quæ  
magis medicamentis pugnat. His multum  
15 antiqui authores tribuerunt, & Erasiftra-  
tus; & hi qui se *ἰμπειρικὸς* nominaverunt;  
præcipue tamen Herophilus, deductique  
ab illo viri; adeo ut nullum morbi genus  
fine his curarent. Multaque etiam de  
20 facultatibus medicamentorum memoriæ  
prodiderunt, qualia funt vel Zenonis, vel  
Andrææ, vel Apollonii, qui Mus cognomi-  
natus est. Horum autem ufum ex magna  
parte Afclepiades non fine caufa fustulit; &  
25 cum omnia fere medicamenta ftomachum 29, 7.  
lædant, malique fucci funt, ad ipfius victus 85, 7.  
rationem potius omnem curam fuam 84, 25.  
tranfultit. Verum, ut illud in plerisque mor-  
bis utilius est, fic multa admodum corpori-  
30 bus noftris incidere confuerunt, quæ fine  
medicamentis ad fanitatem pervenire non  
poffunt. Id ante omnia fcire convenit,  
quod omnes medicinæ partes ita connexæ  
funta ut ex toto feperari non poffint; fed ab

Q

eo

eo nomen trahant, à quo plurimum petunt. Ergo ut illa, quæ victu curat, aliquando medicamentum adhibet; sic illa, quæ præcipue medicamentis pugnat, adhibere etiam rationem victus debet; quæ multum admodum in omnibus malis corporis proficit. Sed cum omnia medicamenta proprias facultates habeant, ac sæpe simplicia opitulentur, sæpe mista; non alienum videtur ante proponere & nomina, & vires, & misturas eorum: quo minor ipsam curationem exsequentibus mora fit.

## C A P. I.

*De simplicibus facultatibus quarumcunque rerum, ex quibus medicamenta sunt:*  
 & primo de his, quæ Sanguinem suppressunt.

**S**ANGUINEM suppressunt, atramentum stutorium, quod Græci χάλκαιθοι appellent, chalcitis, acacia, & ex aqua lycium, thus, aloe, gummi, plumbum combustum, porrum, herba sanguinalis, creta vel cimolia vel figularis, misy, frigida aqua, vinum, acetum, alumen, melinum, squama † & ferri & æris; atque hujus quoque duæ species sunt, alia tantum æris, alia rubri æris.

## C A P. II.

*Quæ vulnus glutinent.*

**G**LUTINANT vulnus, myrrha, thus, gummi, præcipueque acanthinum, psyllium, tragacantha, cardamomum;

† Et utriusque ferri legendum dicit Rubeus, p. 193.

Cap. 5. MEDICINA. 243

mum, bulbi, lini semen, nasturtium, ovi album, gluten, ichthyocolla, vitis alba, contusæ cum testis suis cochleæ, mel coctum, sponsia vel ex aqua frigida, vel ex 293,  
5 vino, vel ex aceto expressa: ex iisdem lana 20.  
succida, si levis plaga est; etiam a aranea.

Reprimunt, alumen & scissile, quod *χυσόν* vocatur, & liquidum, melinum, auripigmentum, ærugo, chalcitis, atramentum  
10 futorium.

### C A P. III.

*Quæ concoquant, & moveant pus.*

15 **C**ONCOQUUNT & movent pus, nardum, myrrha, costus, balsamum, galbanum, propolis, styrax, thuris & fuligo & cortex, bitumen, pix, sulphur, resina, sebum, adeps, oleum.

### C A P. IV.

20 *Quæ aperiant vulnera.<sup>a</sup>*

**V**ULNERA aperiunt tanquam ora in corporibus, quod *ἀνοσμήν* Græce dicitur, cinnamomum, balsamum, paces, juncus quadratus, pulegium, flos albæ violæ, bdellium, galbanum, resina terebinthina & pinea, propolis, oleum vetus, piper, pyrethrum, chamæpitys, uva taminia, sulphur, alumen, rutæ semen.

30 C A P. V.

*Quæ purgent.*

**P**URGANT, ærugo, auripigmentum, quod *ἀπρενικόν* à Græcis nominatur ( huic autem  
Q 2 tem

<sup>a</sup> Petron. Sat. c. 58.

<sup>a</sup> Oribas. Synops. II, 42, 47.



tem & sandarachæ in omnia eadem vis; sed validius est) squama æris, pumex, iris, balsamum, styrax, thus, thuris cortex, resina, & pinea, & terebinthina liquida, œnanthe, lacerti stercus, sanguis columbæ, & palumbi, & hirundinis, ammoniacum, bdellium (quod in omnia idem, quod ammoniacum, potest; sed hoc valentius est) abrotonum, ficus arida, coccum gnidium, a scobis eboris, omphacium, radícula, coagulum, sed maxime leporinum (cui eadem, quæ cæteris coagulis, facultas, sed utique validior est) fel taurinum, vitellus crudus, cornu cervinum, gluten, mel crudum, misy, chalcitis, crocum, uva taminia, spuma argenti, galla, squama æris, lapis hæmatites, minium, costum, sulphur, pix cruda, sebum, adeps, oleum, ruta, porrum, lentícula, ervum.

## C A P. VI.

20

*Quæ rodant.*

**R**ODUNT, alumen liquidum, sed magis rotundum, ærugo, chalcitis, misy, squama æris, sed magis rubri, æs combustum, sandaracha, minium sinopicum, casia, balsamum, myrrha, thuris cortex, galbanum, resina terebinthina liquida, piper utrunque, sed rotundum magis, cardamomum, auripigmentum, calx, nitrum, & spuma ejus, apii semen, narcissi radix, omphacium, alcyonium, oleum ex amaribus nucibus, allium, mel crudum, vinum, lentiscus, squama ferri, fel taurinum, scamonea,

monea, uva taminia, cinnamomum, styrax, ruthæ semen, resina, narcissi semen, sal, nuce amaræ, ut oleum earum, atramentum sutorium, chryfocolla, concharum cinis.

C A P. VII.

*Quæ exedant corpus.*

10 **E**XEDUNT corpus, acaciæ succus, hebenus, ærugo, squama æris, chryfocolla, cinis Cyprius, nitrum, cadmia, spuma argenti, hypocistis, diphryges, sal, auripigmentum, sulphur, eruca, sandaracha, salamandra, alcyonium, æris flos, chalcitis, atramentum sutorium, ochra, calx, acetum, 15 galla, alumen, lac caprifici, vel lactucæ marinæ, quæ τιδύμαλλο à Græcis nominatur, fel, thuris tuligo, spodium, lenticula, mel, oleæ folia, marrubium, lapis hæmatites; & a Phrygius, & Alius, & scissilis, 20 misy, vinum, acetum.

C A P. VIII.

*Quæ adurant. a*

25 **A**DURUNT, auripigmentum, atramentum sutorium, chalcitis, misy, ærugo, calx, charta combusta, sal, squama æris, fex combusta myrrha, stercus & lacerti, & columbæ, & palumbi, & hiru- 30 dinis, piper, coccum gnidium, allium, diphryges, lac utrumque (quod proximo capite supra comprehensum est) veratrum & album & nigrum, cantharides, corallium, pyrethrum, thus, salamandra, eruca, sandaracha, uva taminia, chryfocolla, ochra,

Q 3

alu-

a Plin. H. N. XXXVI, 19.

a Oribas. Synops. II, 48.



C A P. IX.

*Quæ crustas ulceribus inducant.*

E ADEM fere crustas ulceribus tanquam §  
igne adustis inducunt, sed præcipue  
chalcitis, utique si cocta est, flos æris,  
æругo, auripigmentum, misy, & id quo-  
que magis coctum.

C A P. X.

10

*Quæ crustas ulceribus resolvant.*

C RUSTAS vero has resolvit, farina tri-  
ticea cum ruta, vel porro, aut lenticu-  
la, cui mellis aliquid adjectum est. 15

C A P. XI.

*Quæ discutiant ea, quæ in aliqua  
parte corporis coierunt.*

A D discutienda vero ea, quæ in cor- 20  
poris parte aliqua coierunt, ma-  
xime possunt, abrotonum, hel-  
nium, amaracus, alba viola, mel, lilium,  
sanfucus, cyperus, lac, fertula campana,  
serpyllum, cupressus, cedrus, iris, viola 25  
purpurea, narcissus, rosa, crocum, prasium,  
juncus quadratus, nardum, cinnamomum,  
casia, ammoniacum, cera, resina, uva ta-  
minia, spuma argenti, styrax, ficus arida,  
tragoriganus, lini & narcissi semen, bitu- 30  
men, sordes ex gymnasio, pyrites lapis, aut  
molaris, crudus vitellus, amaræ nuces,  
sulphur.

C A P.

## C A P. XII.

*Qua evocent, & educant.*

5 **E**VOCAT & educit, ladanum, alumen  
 rotundum, hebenus, lini semen, om-  
 phacium, fel, chalcitis, bdellium, re-  
 fina terebinthina & pinea, propolis, ficus  
 arida decocta, stercus columbæ, pumex,  
 farina lolii, grossi in aqua cocti, elaterium,  
 10 lauri baccæ, nitrum, sal.

## C A P. XIII.

*Qua exasperata levent.*

15 **L**ÆVANT id, quod exasperatum est, spo-  
 dium, hebenus, gummi, ovi album,  
 lac, tragacanthum.

## C A P. XIV.

*Qua carnem nutriant, & ulcus impleant.*

20 **C**ARNEM alunt, & ulcus implent, refina  
 pinea, ochra<sup>a</sup> Attice, mel, asteriace,<sup>255, 27.</sup>  
 cera, butyrum.

## C A P. XV.

25

*Qua molliant.*

**M**OLLIUNT, æs combustum, terra  
 Eretria, nitrum, papaveris lachry-  
 ma, ammoniacum, bdellium, cera,  
 sebum, adeps, oleum, ficus arida, sesamum,  
 30 fertula campana, narcissi & radix & semen,  
 rosæ folia, coagulum, vitellus crudus,  
 amaræ nuces, medulla omnis, stimmi, pix,  
 cochlea cocta, cicutæ semen, plumbi re-  
 trimentum, σκαρίαν μολύβδου Græci vo-<sup>267, 17.</sup>

Q 4

cant,

cant, panaces, cardamomum, galbanum, resina, uva taminia, styrax, iris, balsamum, fordes ex gymnasio, sulphur, butyrum, ruta.

## C A P. XVI.

5

*Qua cutem purgent.*

**C**UTEM purgat mel, sed magis, si est cum galla, vel ervo, vel lenticula, vel marrubio, vel iride, vel ruta, vel nitro, vel ærugine. 10

## C A P. XVII.

*De misturis simplicium rerum; & de ratione ponderum.*

**E**XPOSITIS simplicibus facultatibus, dicendum est, quemadmodum misceantur, quæque ex his fiant. Miscentur autem varie, neque hujus ullus modus est, cum ex similibus alia demantur, alia adjiciantur; iisdemque servatis, ponderum ratio mutetur. Itaque, cum facultatum materia non ita multiplex sit, innumerabilia misturarum genera sunt; quæ comprehendere si possent, tamen esset supervacuum. Nam & iidem effectus intra paucas compositiones sunt, & mutare eas cuilibet, cognitæ facultatibus, facile est. Itaque contentus his ero, quas accepi velut nobilissimas. In hoc autem volumine eas explicabo, quæ vel desiderari in prioribus potuerunt; vel ad eas curationes pertinent, quas protinus hic comprehendam sic, ut tamen, quæ magis communia sunt, simul jungam. Si qua singulis, vel etiam paucis commo- 15  
20  
25  
30



Sed & ante sciri volo, in uncia pondus denariorum septem esse. Unius deinde denarii pondus dividi à me in sex partes, id est sextantes <sup>a</sup>, ut idem in sextante denarii habeam, quod Græci habent in eo, quem ὀβολὸν <sup>b</sup> appellant. Is ad nostra pondera <sup>c</sup> relatus paulo plus dimidio scrupulo facit.

2. *Quid d Malagma, & Emplastrum, & Pastillus inter se differant,*

Malagmata vero, atque emplastra, pastillique, quos τροχίσκος Græci vocant, cum plurima eadem habeant; differunt eo, quod malagmata maxime ex floribus eorumque etiam furculis, emplastra pastillique magis ex quibusdam metallicis fiunt. Deinde malagmata contusa abunde mollescunt: nam super integram cutem injiciuntur: laboriose vero conteruntur ea, ex quibus emplastra pastillique fiunt; ne lædant vulnera, cum imposita sunt. Inter emplastrum autem & pastillum hoc interest, quod emplastrum utique liquati aliquid accipit: in pastillo tantum arida medicamenta aliquo humore junguntur. Tum emplastrum hoc modo fit. Arida medicamenta per se teruntur: deinde mistis his instillatur aut acetum, aut si quis alius non pinguis humor accessurus est; & ea rursus ex eo teruntur. Ea vero, quæ liquari possunt, ad ignem simul liquantur; & si quid olei misceri debet, tum infunditur. Interdum etiam aridum aliquod ex oleo prius coquitur. Ubi facta sunt, quæ separatim fieri debuerunt,

Q 5 in

<sup>a</sup> Rhod. de Ponderib. p. 24. <sup>b</sup> Rhod. de Ponderib. p. 27. <sup>c</sup> Rhod. de Ponderib. p. 24. <sup>d</sup> Reines. Variar. Lect. II. 8. p. 189.

250 A. CORN. CELSI Lib. 5.  
in unum omnia miscentur. At pastilli hæc  
ratio est. Arida medicamenta contrita hu-  
more non pingui, ut vino vel aceto, cogun-  
tur, & rursus coacta, inarescunt: atque, ubi  
utendum est, ejusdem generis humore di-  
luuntur. Tum emplastrum imponitur, pa-  
stillus illinitur, aut alicui molliori, aut ce-  
rato miscetur.

## C A P. XVIII.

10

### De Malagmatis. a

#### 1. *Malagma adversus calidas podagras.*

**H**IS cognitis, primum malagmata subji-  
ciam; quæ fere non sunt refrigerandi,  
sed calefaciendi causa reperta. Est ta- 15  
men, quod refrigerare potest; ad calidas po-  
dagras aptum. Habet gallæ & immature &  
alterius, coriandri feminis, cicutæ, lachry-  
mæ aridæ, gummi, singulorum plenum a-  
cetabulum, cerati eloti, quod *πεπλυμένον* 20  
Græci vocant, felibram. Reliqua fere ca-  
lefaciunt. Sed quædam digerunt ma-  
263, 20. teriam, quædam extrahunt, quæ *ἐπισπασικά*  
vocantur: pleraque certis partibus membro-  
rum accommodata sunt. 25

#### 2. *Malagma ad materiam extrahendam.*

**S**I materia extrahenda est, ut in hydro-  
pico, in lateris dolore, in incipiente 30  
abscessu, in suppuratione quoque me-  
diocri, aptum est id, quod habet resinæ ari-  
dæ, nitri, ammoniaci, galbani, singulorum  
p. \*. ceræ p. \*. Aut in quo hæc sunt: æru-  
ginis rasæ, thuris, singulorum p. 11. \*. am-  
moniaci

Cap. 18. MEDICINA. 251  
moniaci salis p. vi. \*. squamæ æris, ceræ,  
singulorum p. viii. \*. resinæ aridæ. p. xii. \*.  
aceti cyathus. Idem præstat cumini farina  
cum struthio, & melle p. ii. \*.

5 3. *Malagma ad jecur dolens.*

Si jecur dolet, id in quo est balsami la-  
chrymæ p. xii. \*. costi, cinnamomi, cassiæ  
corticis, myrrhæ, croci, junci rotundi, bal-  
sami feminis, iridis illyricæ, cardamomi, a-  
10 momi, nardi, singulorum. p. xvi. \*. Qui-  
bus adjicitur nardinum unguentum, do-  
nec cerati crassitudo sit. Et hujus quidem  
recentis usus est: si vero fervandum est, re-  
sinæ terebinthinæ p. xvi. \*. ceræ p. x. \*. ex  
15 vino leni contunduntur, & cum eo miscen-  
tur.

4. *Malagma ad lienem.*

At, si lienis torquet, glandis, quam *μυρο- 216, 15.*  
*βάλανος* Græci vocant, cortex & nitrum pa-  
20 ribus portionibus contunduntur, resper-  
gunturque aceto quam acerrimo: ubi cerati  
crassitudinem habet, linteo, ante in aqua  
frigida madefacto, inlinitur, & sic imponi-  
tur, supraque farina ordeacea injicitur:  
25 sed manere ibi non amplius sex horis debet,  
ne lienem consumat: satiusque est id bis, aut  
ter fieri.

5. *Malagma commune pluribus.*

Commune autem & jecinori, & lieni, &  
30 abscessibus, & strumæ, parotidibus, articu-  
lis, calcibus quoque suppurantibus, aut  
aliter dolentibus, etiam concoctioni ven-  
tris, Lyfias composuit ex his: opopanacis,  
galbani, resinæ, singulorum p. ii. \*. am-  
monia-

252 A. CORN. CELSI Lib. 5.  
moniaci, bdellii, ceræ, sevi taurini, iridis  
aridæ p. IIII. \*. cachryos acetabulo, piperis  
granis † quadraginta. quæ contrita irino un-  
guento temperantur.

6. *Malagma ad laterum dolorem.* 5

Ad laterum autem dolores compositio  
est a Apollophanis: in qua sunt resinæ tere-  
binthinæ, thuris fuliginis, singulorum  
p. IV. \*. bdellii, ammoniaci, iridis: sevi aut  
vitulini, aut caprini à renibus, visci, sin- 10  
gulorum p. IV. \*. Hæc autem omnem dolo-  
rem levat, dura emollit, mediocriter cale-  
facit.

7. *Ad idem Andrea.*

Ad idem valet Andreae quoque malagma, 15  
quod etiam resolvit, humorem educit,  
pus maturat, ubi id maturum est, cutem  
rumpit, & ad cicatricem perducit. Prodest  
impositum minutis majoribusque abscef-  
sibus: item articulis, & coxis, & pedibus 20  
dolentibus: item, si quid in corpore colli-  
sum est, reficit: præcordia quoque dura &  
inflata emollit: ossa extrahit: ad omnia de-  
nique valet, quæ adjuvare calor potest. Id  
habet ceræ p. XI. \*. visci, fycamini, quam 25  
alias fycomorum vocant, lachrymæ, sin-  
gulorum p. I. \*. piperis & rotundi, & lon-  
gi, ammoniaci thymiamatis, bdellii, iri-  
dis Illyricæ, cardamomi, xyloballami,  
thuris masculi, myrrhæ, resinæ aridæ, sin- 30  
gulorum p. X. \*. pyrethri, cocci Gnidii,  
spumæ nitri, salis ammoniaci, radicis ari-  
stolochiæ Creticæ, cucumeris agrestis ra-  
dicis, resinæ terebinthinæ liquidæ, singu-  
lorum

† Rhodius de Ponderib. p. 26. a Oribas. Syn-  
opsf. III. Cæl. Aurelian. Acut. M. II. 24. dicitur *Po-  
lyarchion*; Marcell. de Medic. c. XX. Æginet. VII. 18.

Cap. 18. MEDICINA. 253  
lorum p. xx. \*. quibus adjicitur unguenti  
irini, quantum satis est ad ea mollienda,  
atque cogenda.

8. *Malagmata ad resolvenda, quæ adstricta  
sunt; & mollienda, quæ dura sunt;  
& digerenda, quæ coeunt.*

Præcipuum vero est ad resolvenda, quæ  
adstricta sunt, mollienda, quæ dura sunt,  
digerenda, quæ coeunt, id, quod ad Poly-  
10 archum authorem refertur. Habet junci  
quadrati, cardamomi, thuris fuliginis,  
amomi, ceræ, refinæ liquidæ, pares portio-  
nes.

9. *Aliud malagma ad eadem.*

15 Aliud ad eadem Nilei: crocomagmatis,  
quod quasi recrementum ejus est, p. iv. \*.  
ammoniæ thymiamatis, ceræ, singulo-  
rum p. xxx. \*. ex quibus duo priora ex ace-  
to teruntur, cera cum rosa liquatur, & tum  
20 omnia junguntur.

10. *Malagma Moschi ad molliendum.*

Proprie etiam dura mollit id, quod Mo-  
schi esse dicitur. Habet galbani unciam,  
thuris fuliginis p. iii. \*. ceræ, ammoniæ  
25 thymiamatis trientes †, picis aridæ p. ii, \*.  
aceti heminas tres

11. *Malagma Medici ad digerenda, quæ coeunt.*

Fertur etiam ad digerenda, quæ coeunt,  
sub authore Medo: quod habet ceræ p. iii.  
30 \*. panacis p. \*. femis, squamæ æris, alumi-  
nis rotundi, item scissilis, singulorum p. i. \*.  
plumbi combusti p. i. \*. & femis.

12. *Malagma Panthemii ad eadem.*

Ad eadem Panthemus utebatur, calcis.  
p. \*.

† Rhodius de Ponderib. p. 12.



254 A CORN. CELSI Lib. 5.  
P. \*.femis, sinapis contriti, item fœni græci, aluminis, singulorum P. I. \*.sevi bubuli P. II. \*. & femis.

13. *Malagma ad strumas.*

Ad strumam multa malagmata invenio. Credo autem, quo pejus id malum est, minusque facile discutitur, eo plura esse tentata; quæ in personis varie responderunt. Andreas author est, ut hæc misceantur: urticæ feminis P. I. \*. piperis rotundi, bdellii, galbani, ammoniaci thymiamatis, resinæ aridæ, singulorum P. IV. \*. resinæ liquidæ, ceræ, pyrethri, piperis longi: lactucæ marinæ feminis, sulphuris ignem non experti, quod ἀπυρον vocatur, pares portiones.

14. *Aliud Miconis ad idem.*

Hoc autem Miconis c est: fecis aridæ, acetii, spumæ nitri, falis ammoniaci, sinapis, cardamomi, radicis cucumeris silvestris, resinæ, singulorum P. IV. \*. Quæ ex leni vino contunduntur.

15. *Aliud Malagma ad idem valens.*

Expeditius ad idem fit, quod habet visci, felini stercoreis, resinæ, sulphuris ignem non experti pares portiones. Et in quo est sulphuris P. I. \*. lapidis, quem pyriten vocant, P. IV. \*. cumini † acetabulum. Item in quo est lapidis ejusdem pars una, sulphuris duæ partes, resinæ terebinthinæ partes tres.

16. *Malagma ad strumam, & phymata.*

Arabes autem cujusdam est ad strumam, & orientia tubercula, quæ φύμαλα vocantur, quod hæc digerit. Habet myrrhæ, falis ammoniac-

c Plin. H. N. XX, 23. *Mictionis*, ubi alii *Mycconis*, meminit. † I. Rhodius de Ponderib. p. 34.

moniaci, thuris, resinæ & liquidæ & aridæ, crocomagmatis, ceræ, singulorum p. i. \*. lapidis ejus, quem *πυρίτω* vocant, p. iv. \*. quibus quidam adjiciunt sulphuris p. ii. \*.

5 17. *Malagma ad strumam, & tubera, & καρκινώδη,*

Est etiam proficiens in struma; & in his tuberibus, quæ difficulter concoquuntur; & in his, quæ *καρκινώδη* vocantur, quod ex  
10 his constat: sulphuris p. ii. \*. nitri p. iv. \*. myrrhæ p. vi. \*. fuliginis thuris p. \*. femis, salis ammoniaci p. iii. \*. ceræ p. i. \*.

18. *Malagma Protarchi ad parotidas, & favum, & mala ulcera.*

15 Protarchus autem ad *παρωτίδας* atque tubercula, quæ *μελικηίδες*, id est favi, vel *φύμαλα* nominantur, item mala ulcera, pumicis, resinæ pineæ liquidæ, thuris fuliginis, spumæ nitri, iridis, singulorum p.  
20 viii. \*. cum ceræ p. ix. \*. miscebat, hisque olei cyathum & dimidium adjiciebat.

19. *Malagma adversus panum, & phymata.*

At adversus panum, tum primum orientem quod *φύγεθλον* Græci vocant, & omne tuberculum, quod *φῦμα* nominatur, miscetur ochra, quæ Attice nominatur, cum  
25 duabus partibus similæ, hisque, dum contunduntur, subinde mel instillatur, donec  
30 malagmatis crassitudo sit.

20. *Malagma adversus phymata.*

Discutit etiam omne tuberculum, quod *φῦμα* vocatur, id, quod habet calcis, spumæ nitri, piperis rotundi, singulorum p.  
1. \*.

256 A. CORN. CELSI Lib. 5.  
I. \*. galbani P. I I. \*. falis P. IV. \*. quæ exci-  
piuntur cerato ex rosâ facto.

21. *Malagma ad supprimendum omne, quod abscedit.* 1

Supprimit quoque omne, quod abscedit,  
id, in quo est galbani, fabæ fressæ, singulo- 5  
rum P. I. \*. myrrhæ, thuris, corticis ex ra-  
dice capparis, singulorum P. IV. \*. Satisque  
omnia abscedentia digerit murex combu-  
stus, & bene contritus, aceto subinde ad- 10  
jecto.

22. *Malagma ad sanguinem supprimendum.*

At, si plus satis sanguis subit, recte im-  
ponitur, quod adversus phymata quoque  
potest. Constat ex his: bdellii, styracis,  
ammoniaci, galbani, resinæ & aridæ & li- 15  
quidæ pineæ; item ex lentisci, thuris, iri-  
dis, singulorum P. II. \*.

23. *Malagma ad carcinomata & phymata  
lenienda.*

Carcinomata vero & phymata commode 20  
his leniuntur: galbani, visci, ammoniaci,  
resinæ terebinthinæ singulorum P. I. \*.  
sevi taurini P. \*. semis, fecis combustæ  
quam maxima portione, dum id ficcius non  
faciat, quam esse malagma oportet. 25

24. *Malagma ad faciem contusam ejusque livorem.*

Quod si facie contusa livor subcruentus  
est, hæc compositio nocte & die imposita  
tollit. Aristolochiæ, thapsiæ, singulorum  
P. II. \*. bdellii, styracis, ammoniaci thymia- 30  
matis, galbani, resinæ aridæ, & ex lentif-  
co liquidæ, thuris masculi, iridis Illyricæ,  
ceræ, singulorum P. IV. \*. Eidem faba quo-  
que imposita proficit.

25. *Malagmata ἀνασσωμωλικά ad aperiendum.*

Sunt etiam quædam malagmata, quæ ἀνασσωμωλικά Græci vocant, quoniam aperiendi vim habent. Quale est, quod ex his constat: piperis longi, spumæ nitri, singulorum p.ii. \*. erysimi p.ii. \*. quæ cum melle miscentur. Idoneaque etiam strumæ aperiendæ sunt. Ejus generis, vehementiusque ex his est, quod habet calcis p.ii. \*.  
 10 piperis grana sex, nitri, ceræ, singulorum 282.  
 p. x. \*. mellis p.iii. \*. olei heminam.

26. *Miconis Malagma, ad resolvendum aperiendumque ac purgandum.*

Miconis quoque est, quod resolvit, aperit, purgat. Habet alcyonium, sulphur, nitrum, pumicem, pari pondere; quibus tantum picis, & ceræ adjicitur, ut fiat cerati crassitudo.

27. *Malagma ad ossa & nervos.*

20 Ad ossa autem Aristogenis, fit ex his: sulphuris p. i. \*. resinæ terebinthinæ, nitri spumæ, & ex scilla partis interioris, plumbi eloti, singulorum p.ii. \*. thuris fuliginis p. viii. \*. ficus aridæ quam pinguiissimæ, 25 sevi taurini, singulorum p. viii. \*. ceræ p. xii. \*. iridis Macedonicæ p. vi. \*. sesami fricti acetabulum. maximeque nervis & articulis malagma hoc convenit,

30 28. *Malagma Euthylei ad articulos, & ad omnem dolorem.*

Euthylei quod est, & ad articulos, & ad omnem dolorem, & ad vesicæ, & ad recenti cicatrice contractos articulos, quas ἀγκύλας Græci nominant, conveniens, habet tu-

liginis thuris acetabulum, resinæ tantundem, galbani sine furculis fescunciam, ammoniaci, bdellii, singulorum P. \*. ceræ P. \*. semis. Aliud item fit, quod habet iridis, ammoniaci, galbani, nitri, singulorum P. XIV. \*. resinæ liquidæ P. VI. \*. ceræ P. XVI. \*.

29. *Malagma Sofagoræ ad dolores articulorum.*

Ad dolores articulorum Sofagoræ: plumbi combusti, papaveris lachrymæ, corticis hyoscyami, styracis, peucedani, sevi, resinæ, ceræ par pondus. 10

30. *Chryssippi Malagma, ad idem valens.*

Est & Chryssippi: resinæ liquidæ, sandarachæ, piperis, singulorum P. XII. \*. quibus ceræ paululum adjicitur. 15

31. *Ctesiphontis Malagma ad idem valens, & ad parotidas, & phymata, & strumam.*

Ctesiphontis: ceræ Creticæ, resinæ terebinthinæ, nitri quam ruberrimi, singulorum P. \*. semis, olei cyathi tres. Sed id nitrum ante per triduum, instillata aqua, teritur, & cum sextario ejus incoquitur, donec omnis humor consumatur. Prodest vero ea compositio etiam ad parotidas, phymata, strumam, omnemque coitum humoris emolliendum. 20 25

32. *Malagma ad articulos.*

Ad articulos, fici quoque aridæ partem nepetæ mistam; vel uvam taminiam sine seminibus cum pulegio recte aliquis imponit. 30

33. *Malagma Aristonis, adversus podagras & recentia phymata, & omnes dolores.*

Eadem podagræ præsidio sunt. Sed ad  
cam



eam fit Aristonis quoque, quod habet nardi, cinnamomi, cassiæ, chamæleontis, junci rotundi, singulorum p. viii. \*. fevi caprini ex irino liquati p. xx. \*. iridis p. i. 5 \*. quæ in aceto quam acerrimo jacere per xx. dies debet. Idem autem etiam recentia phymata doloresque omnes discutit.

34. *Theoxeni Malagma ad pedum dolores.*

At Theoxenus ad pedum dolores, fevi 10 à renibus partem tertiam, salis partes duas miscebat, hisque membranulam illitam imponebat; tum superinjiciebat ammoniacum thymiana in aceto liquatum.

15 35. *Numenii Malagma ad podagram, cæterosque articulos induratos.*

At Numenius podagram, cæterosque articulos induratos hoc mollebat: abrotoni, rosæ aridæ, papaveris lachrymæ, singulorum p. iii. \*. resinæ terebinthinæ 20 p. iv. \*. thuris, spumæ nitri, singulorum p. viii. \*. iridis, aristolochiæ, singulorum p. xii. \*. ceræ p. iii. \*. quibus adjicitur cedriæ cyathus unus, olei laurini cyathi tres, olei acerbi sextarius.

25 36. *Dexii Malagma, si quando callus in articulis increvit.*

Si quando autem in articulis callus increvit, Dexius docuit imponere, calcis p. iv. \*. cerussiæ p. viii. \*. resinæ pinæ p. xx. \*. 30 piperis grana xxx. ceræ p. ii. \*. Quibus, dum contunduntur, hemina vini lenis instillatur.

## CAP. XIX.

## De Emplastris. 2

**E**X emplastris autem nulla majorem  
 usum præstant, quam quæ cruentis 5  
 protinus vulneribus injiciuntur. <sup>ἔναι-</sup>  
<sup>μοα</sup> Græci vocant. Hæc enim reprimunt in-  
 flammationem, nisi magna vis eam cogit; at-  
 que tum illius quoque impetum minuunt,  
 & glutinant vulnera, quæ id non patiuntur, 10  
 & cicatricem iisdem inducunt. Constant  
 autem ex medicamentis non pinguibus,  
 ideoque *ἀλίπαλα* à Græcis nominantur.

1. *Barbarum Emplastrum nigrum, quod cruen-*  
*tis protinus vulneribus injicitur.* 15

Optimum ex his est, quod Barbarum <sup>b</sup> no-  
 minatur. Habet enim æruginis rasæ p. xii.  
 \*. spumæ argenti p. xx. \*. aluminis, picis  
 aridæ, resinæ pineæ aridæ, singulorum p. i.  
 \*. quibus adjiciuntur olei & aceti singulæ 20  
 heminæ.

2. *Choacon Emplastrum nigrum, ad idem valens.*

Alterum ad idem, quod Choacon vocant,  
 habet spumæ argenti p. x. \*. resinæ aridæ  
 tantundem. sed spuma prius ex tribus olei 25  
 heminis coquitur. His duobus emplastris  
 color niger est. qui fere talis fit, ex pice  
 atque resina: ut ex bitumine nigerrimus;  
 ex æruginis, aut æris squama, viridis; ex  
 minio ruber; ex cerussa, albus. 30

3. *Basilicon Emplastrum nigrum ad idem.* c

Raucæ admodum compositiones sunt,  
 in quibus aliquid misturæ varietas novat.  
 Ergo id quoque nigrum est, quod *βασιλι-*  
*κόν*

a P. Ægineta VII, 17. b Scribon. Larg. c. LXXVII.  
 c. 207. c Oribaf. Synopf. III.

Cap. 19. MEDICINA. 261  
κόν nominatur. Habet opopinacis p. i. \*.  
galbani p. ii. \*. picis, & resinæ singulo-  
rum p. x. olei dimidium cyathum.

4. *Smaragdinum Emplastrum ad idem.*

5 At, quod perviride est, Smaragdinum ap-  
pellatur. in quo sunt resinæ pineæ p. iii. \*.  
ceræ p. i. \*. æruginis, p. \*. semis, thuris  
pollinis p. ii. \*. olei tantundem, & aceti,  
quo pollen & ærugo in unum cogantur.

10 5. *Emplastrum rufum ad idem.* d

Est etiam coloris fere ruffi, quod cele-  
riter ad cicatricem vulnera perducere vi-  
detur. Habet thuris p. i. \*. resinæ p. ii. \*.  
squamæ æris p. iii. \*. spumæ argenti p. xx.  
15 \*. ceræ p. c. \*. olei heminam.

6. *Παρεσκολλητικόν Emplastrum ad idem.*

Præterea est, quod *παρεσκολλητικόν* à gutti-  
nando vocant. Constat ex his: bituminis,  
aluminis scissilis p. iv. \*. spumæ argen-  
20 ti p. iv. \*. & olei veteris hemina.

7. *Cephalicum Emplastrum Philotæ,*  
*capiti conveniens.*

Præterea sunt quædam generis ejusdem,  
quæ, quia capitibus fractis maxime con-  
25 veniunt, *κεφαλικαί* à Græcis nominantur.  
Philotæ compositio habet terræ Eretriæ,  
chalcitidis, singulorum p. iv. \*. myrrhæ,  
æris combusti, singulorum p. x. \*. ichthyo-  
collæ p. vi. \*. æruginis rasæ, aluminis ro-  
30 tundi, misyos crudi, aristolochiæ, singu-  
lorum p. viii. \*. squamæ æris p. xx. thu-  
ris masculi p. ii. \*. ceræ p. i. rosæ, & olei  
acerbi, ternos cyathos, aceti quantum fa-  
tis est, dum arida ex eo conteruntur.

R 3

8. *Em-*

8. *Emplastrum viride ad idem valens.*

Aliud ad idem viride. Habet æris combusti, squamæ æris, myrrhæ, ichthyocolæ, singulorum p. vi. \*. misyos crudi, æruginis rasæ, aristolochiæ, aluminis rotundi, 5  
singulorum p. viii. \*. ceræ p. vi. olei hemina, aceti quod satis sit.

9. *Tetrpharmacum Emplastrum, ad pus movendum. e*

Puri autem movendo non aliud melius, 10  
quam quod expeditissimum est, & † τετρα-  
φαρμακον à Græcis nominatur. Habet pares  
portiones ceræ, picis, resinæ, sevi taurini;  
si id non est, vitulini.

10. *Enneapharmacum Emplastrum ad pus movendum, & ad purgandum valens. 15*

Alterum ad idem, ‡ εννεαφαρμακον nomi-  
natur; quod magis purgat. Constat ex no-  
vem rebus, cera, melle, sevo, resina, myrrha,  
rosa, medulla vel cervina vel vitulina vel 20  
bubula, œsypo, butyro. Quorum quoque  
pondera paria miscentur.

11. *Emplastra, quibus utriusque rei facultas est.*

Sunt autem quædam emplastra quibus  
utriusque rei facultas est. quæ, nisi singula 25  
habenda sit, meliora sunt; alias deteriora,  
nec, nisi cum utraque opus est, aut in sin-  
gulis singulorum inopia, utenda veniunt:  
sed in copia rejicienda sunt; his potius ad-  
hibitis, quæ id proprie, quod eo tempore 30  
opus est, consequuntur. Exempli causa duo  
proponam.

*Attalum Emplastrum ad vulnera.*

Est igitur ad vulnera Attalum: quod ha-  
bet

e Scribon. Larg. cap. LXXXI. c. 211. † Casaub.  
ad Spartiani Adrianum, c. 21. pag. 192 ‡ Casaub. ad  
Spartian. Adrian. c. 21. pag. 192. 232.

bet squamæ æris p. vi. \*. thuris fuliginis p. xv. \*. ammoniaci tantundem, resinæ terebinthinæ liquidæ p. xxv. \*. sevi taurini tantundem, aceti heminas tres, olei sextarium.

5 *Judæi Emplastrum, fracto capiti accommodatum.*

At inter ea, quæ fracto capiti accommodantur, habent quidam id, quod ad authorem Judæum refertur. Constat ex his:  
 10 salis p. iv. \*. squamæ æris rubri, æris combusti, singulorum p. xii. \*. ammoniaci thymiamatis, thuris fuliginis, resinæ aridæ, singulorum p. vi. \*. resinæ Colophonix, ceræ, sevi vitulini curati, singulorum p. xx.  
 15 \*. additur aceti sesquicyathus, olei minus 271, 8. cyatho †. Quæ τελεραπιδυρα Græci appellant, nos curata vocamus; cum ex sevo putata omnes membranulæ diligenter exemptæ sunt, aut ex alio medicamento.

20 12. *Emplastra ἐπισπαστικά g*

Sunt etiam quædam emplastra nobilia ad extrahendum. quæ ipsa quoque ἐπισπαστικά nominantur. Quale est, quod, quia lauri baccas habet, λεγαδαφνιδων appellatur. In eo  
 25 est, resinæ terebinthinæ p. x. \*. nitri, ceræ, picis aridæ, baccarum lauri, singulorum p. xx. \*. olei paululum. Quoties autem baccam, aut nucem, aut simile aliquid posuero, scire oportebit, antequam expendatur,  
 30 ei summam pelliculam esse demendam.

13. *Aliud λεγαδαφνιδων, ad extrahendum, & pus movendum.*

Aliud eodem nomine, quod puri quoque movendo est. Sevi vitulini, ammo-

R 4 niaci

f Aëcius Tetrab. IV. Serm. III, 14. † Rhodius de Ponderib. & Mensur. p. 35. g Scribon. Larg. c. LXXXVI.



niaci trymiatis, picis, ceræ, nitri, bac-  
carum lauri, resinæ aridæ, aristolochiæ,  
pyrethri, pares portiones.

14. *Philocratis Emplastrum, ad extrahendum,*  
*& pus movendum.* 5

Præter hæc, est Philocratis: quod habet  
salis ammoniaci p. vii. \*. aristolochiæ p.  
viii. \*. ceræ, resinæ terebinthinæ, fuli-  
ginis thuris, singulorum p. xv. \*. spumæ  
argenti p. xxxii. \*. Quibus, ut pus quoque 10  
moveant, iridis p. iii. \*. galbani p. vi. \*.  
adjiciuntur.

15. *ῤυπῶδες Emplastrum, ad extrahendum.*

Optimum tamen ad extrahendum est  
id quod à similitudine fordium ῤυπῶδες 15  
Græci appellant. Habet myrrhæ, croci,  
iridis, propolis, bdellii, capitulorum pu-  
nici mali, aluminis scissilis & rotundi, mi-  
syos, chalcitidis, atramenti futorii cocti,  
opopanacis, salis ammoniaci, visci, singu- 20  
lorum p. iv. \*. aristolochiæ p. viii. \*. squa-  
mæ æris p. xvi. \*. resinæ terebinthinæ p.  
lxxv. \*. ceræ, & fevi vel taurini vel hirci-  
ni singulorum p. c. \*.

16. *Emplastrum Hecatæi, ad extrahendum.* 25

Hecatæo quoque authore emplastrum  
generis ejusdem fit ex his: galbani p. ii. \*.  
fuliginis thuris p. iv. \*. picis p. vi. \*. ceræ,  
& resinæ terebinthinæ, singulorum p.  
viii. \*. quibus paulum irini unguenti 30  
miscetur.

17. *Alexandrinum Emplastrum viride, ad*  
*extrahendum.*

Valensque ad idem emplastrum viride  
Ale-

Alexandrinum est. Habet aluminis scif-  
 filis p. viii. \*. salis ammoniaci, p. vii. \*.  
 squamæ æris p. xvi. \*. myrrhæ, thuris sin-  
 gulorum p. xviii. \*. ceræ p. cl. \*. resinæ  
 5 Colophonix aut pineæ p. cxc. \*. olei hemi-  
 nam, aceti sextarium.

18. *De Emplastris exedentibus.*

Quædam autem sunt emplastra exeden-  
 tia, quæ σηπτικὰ Græci vocant, quale est id,  
 10 quod habet resinæ terebinthinæ, fuliginis  
 thuris, singulorum p. ii. \*. squamæ æris  
 p. i. \*. ladani p. ii. \*. aluminis tantundem,  
 spumæ argenti p. iv. \*.

19. *Emplastrum, quod exest corpus, ossa resolvit,*  
 15 *& supercrescentem carnem coercet.*

Exest etiam vehementer corpus, atque  
 ossa quoque resolvit, & supercrescentem  
 carnem coercet id, quod habet spumæ ar-  
 genti, squamæ æris, uncias singulas; nitri  
 20 ignem non experti, lapidis Añi, aristolo-  
 chix p. sextantes †, ceræ, resinæ terebinthi-  
 næ, thuris, olei veteris, atramenti sutorii,  
 salis ammoniaci p. semis, æruginis rasæ p.  
 ‡ bessem, aceti scillitici heminam, vini ami-  
 25 nxi tantundem.

20. *Emplastra adversus morsus, & alia  
 recentiora vulnera.*

*Emplastrum Diogenis nigrum.*

Sunt etiam adversus morsus quædam ac-  
 30 commodata; quale est Diogenis nigrum:  
 quod habet bituminis, ceræ, resinæ pineæ  
 aridæ, singulorum p. xx. \*. spumæ argenti  
 p. c. \*. olei § sextarium. Aut in quo sunt squa-  
 mæ æris. p. iv. \*. cerussæ, & æruginis rasæ

R 5 fin-

† I. Rhodius de Ponderib. p. 13. ‡ I. Rhodius de  
 Ponderib. p. 11, 12. § I. Rhodius de Ponderib. p. 27.

266 A. CORN. CELSI Lib. 5.  
 singulorum p. VIII. \*. ammoniaci p. XII. \*.  
 ceræ, resinæ pineæ, singulorum. p. XXV. \*.  
 spumæ argenti p. c. \*. olei sextarium, Aut  
 in quo sunt squamæ æris p. XIV. \*. galbani  
 p. VI. \*. cerussæ, & æruginis rasæ, singulo-  
 rum p. VIII. \*. ammoniaci p. XII. ceræ, resi-  
 næ pineæ singulorum p. LV. \*. ex quibus spu-  
 ma argenti concoquitur.

21. *Ephesium Emplastrum rubrum,*  
*ad idem valens.* 10

Rubrum quoque emplastrum, quod E-  
 phesium vocatur, huc aptum est. Habet re-  
 sinæ terebinthinæ p. II. \*. galbani p. IV. \*.  
 minii sinopici p. VI. \*. thuris fuliginis p. VI. \*.  
 ceræ p. VIII. \*. spumæ argenti p. LVI. \*. olei  
 veteris heminam. 15

22. *Aliud Emplastrum, ad idem valens.*

Item id, quod ex his constat; squamæ  
 æris, thuris fuliginis, singulorum p. IV. \*.  
 galbani p. VI. \*. salis ammoniaci p. XII. z. \*.  
 ceræ p. XXV. \*. olei tribus heminis. Hæc au-  
 tem aliis quoque recentioribus vulneribus  
 recte imponuntur.

23. *Λευκα Emplastra non gravibus vulneribus*  
*accommodata, & maxime senilibus.* 25

Sunt etiam alba lenia, λευκα Græci vo-  
 cant, fere non gravibus vulneribus accom-  
 modata, præcipueque senilibus. Quale est  
 quod habet cerussæ p. LII. \*. fevi vitulini  
 curati, & ceræ, singulorum p. LVIII. \*.  
 olei heminas tres, ex quibus ea cerussa co-  
 quitur. 30

24. *Elephantinum Emplastrum.* a

Aliud, quod habet cerussæ p. XX. \*. ceræ.  
 p. LV. \*.

a Oribas. Synops. l. III.

p. LV. \* olei heminam , aquæ sextarium.  
 Quæ quoties adjiciuntur ceruffæ vel spumæ  
 argenti , scire licet , illa ex his coquenda  
 esse. Est autem ea percandida compositio,  
 5 quæ supra posita est , ideoque elephantina  
 nominatur.

25. *Lenia Emplastra.*

Lenia quoque quædam emplastra sunt ,  
 10 quæ βλιπαρῶν fere Græci nominant ; ut id  
 quod habet minii p. iv. \* spumæ argenti  
 p. xxv. \* ceræ , & adipis suillæ singulorum  
 p. xxxv. \* vitellos ovorum quatuor.

26. *Emplastrum lene.*

Alia compositio generis ejusdem : ceræ ,  
 15 resinæ terebinthinæ , singulorum p. v. \* ce-  
 russæ p. viii. \* spumæ argenti , plumbi re-  
 trimenti , (σκωρίαν μολύβδου Græci vocant) 247, 34.  
 singulorum p. x. \* cicini olei , & myrtei ,  
 singulorum heminæ tertia.

20 27. *Archagathi Emplastrum lene.*

Alia , quæ ad authorem Archagathum  
 refertur : misyos cocti , æris combusti , sin-  
 gulorum p. iv. \* , cerussæ coctæ p. viii. \* .  
 resinæ terebinthinæ p. x. \* spumæ argenti  
 25 p. vi. \* .

21. *Emplastra ejusdem generis, ad leniendum apta.*

Etiannum generis ejusdem : spumæ ar-  
 genti , ceræ , adipis suillæ , singulorum p.  
 xxvii. \* . vitelli cocti , rosæ hemina. Aut  
 30 compositio hæc : cerati ex oleo myrteo facti  
 partes tres , adipis suillæ pars quarta , pau-  
 lulum ex plumbi retrimento. Aut hæc com-  
 positio : spumæ argenti † selibra , ex olei  
 hemina , & aquæ marinæ altera , cocta do-  
 nec

268 A. CORN. CELSI Lib. 5.  
nec bullire defierit, cui paulum ceræ sit ad-  
jectum. Aut hæc: pares portiones ceræ, fe-  
vi, stibii, spumæ argenti, ceruffæ.

C A P. XX.

De Pastillis.

Et primo de his, qui ad recentia vulnera  
glutinanda, sanandaque apti sunt.

PASTILLI quoque facultates diversas  
habent. Sunt enim ad recentia vulnera  
glutinanda sanandaque apti. Qualis  
est, qui habet chalcitidis, misyos, spumæ  
nitri, floris æris, gallæ, aluminis scissilis  
modice cocti, singulorum p. i. \*. æris com-  
busti, capitulorum mali punici, singulorum  
p. iii. \*. Hunc oportet diluere aceto, ac  
sic, ubi vulnus glutinandum est, illinere.  
At, si nervosus aut musculosus is locus est,  
commodius est cerato miscere, sic ut illius  
octo partes, nona hujus sit.

1. *Alius Pastillus ad glutinanda vulnera.*

Alius ad idem. Constat ex his: bitumi-  
nis, aluminis scissilis, singulorum, p. i. \*.  
æris combusti p. iv. \*. spumæ argenti p. xi.  
\*. olei sextario.

2. *De Sphragide Pastillo, quem Polyidas  
confecit ad glutinandum vulnus.*

Sed longe Polyidæ d celeberrimus est:  
σφραγίς autem nominatur. Qui habet alu-  
minis scissilis p. iv. \*. atramenti sutorii p.  
ii. \*. myrrhæ p. v. \*. aloes tantundem, ca-  
pitulorum punici mali, fellis taurini, sin-  
gulorum p. vi. \*. quæ contrita vino austero  
excipiuntur.

3. *Pastil-*

d Cælius Aurelian. de Acut. Morb. III, 3.



3. *Pastillus ad ulcera sordida, & nigritiem in auribus, naribus, & in obscœnis partibus, inflammationesque eorum.*

Ad ulcera sordida, & nigritiem in auribus, naribus, obscœnis partibus, inflammationesque eorum: chryfocollæ p. i. \*. atramenti futorii, aluminis sciffilis, singulorum p. ii. \*. halicacabi corticis p. iv. \*. minii p. vi. \*. spumæ argenti p. xii. \*. ceruffæ p. xvi. \*. quæ ex aceto coguntur, & ubi utendum est, diluuntur.

4. *Pastillus Andronis ad uvam inflammatam, ad naturalia sordida, etiam cancro laborantia.*

Andronis e vero est ad uvam inflammatam, ad naturalia sordida, etiam cancro laborantia: gallæ, atramenti futorii, myrrhæ, singulorum p. i. \*. aristolochiæ, aluminis sciffilis, singulorum p. ii. \*. capitulorum punici mali p. xxv. \*. ex passo coactorum & cum usus exigit, aceto vel vino dilutorum, prout valentius aut levius vitium est, cui medendum est.

5. *Pastillus ad fissa ani, vel ora venarum fundentia sanguinem, vel cancrum.*

Proprie autem ad ani fissa, vel ora venarum fundentia sanguinem, vel cancrum valet: æruginis p. ii. \*. myrrhæ p. iv. \*. gummi p. viii. \*. thuris p. xii. \*. stibii, lacrymæ papaveris, acaciæ, singulorum p. xvi. quæ ex vino & teruntur, & in ipso usu deliquantur.

6. *Pastillus ad expellendum calculum ex vesica.*

Expellere autem ex vesica cum urina calculum videtur hæc compositio: cassiæ, croci,

270 A. CORN. CELSI Lib. 5.  
croci, myrrhæ, costi, nardi, cinnamomi,  
dulcis radicis, balsami, hyperici pares por-  
tiones conteruntur; deinde vinum lene in-  
stillatur, & pastilli fiunt, qui singuli habeant  
p. i. \*. hique singuli quotidie mane jejuno  
dantur.

## C A P. XXI.

### *De Pessis.*

**H**Æc tria compositionum genera, id  
est, quæ in malagmatis, emplastris  
pastillisque sunt, maximum præci-  
pueque varium usum præstant. Sed alia  
quoque utilia sunt: ut ea quæ fœminis  
subjiciunt. *πισσα*, Græci vocant. Eorum  
hæc proprietas est: medicamenta compo-  
sita molli lana excipiuntur, eaque lana na-  
turalibus conditur.

#### *1. Ad sanguinem evocandum.*

Ad sanguinem autem evocandum, cau-  
neis duabus adjicitur nitri p. i. \*. aut allii  
femen conteritur, adjicitur myrrhæ pau-  
lulum, & unguento fusino miscetur. Aut  
cucumeris sylvestris pars interior ex lacte  
muliebri diluitur.

#### *2. Ad vulvam molliendam.*

Ad vulvam molliendam, ovi vitellus,  
& fœnum Græcum, & rosa, & crocum  
temperantur. Aut elaterii p. iiii. \*. salis  
tantundem, uvæ taminix p. vi. \*. melle ex-  
cipiuntur.

#### *3. Alia Pessi compositio, ad idem valens.*

Aliud Boetho a authore: quod habet croci,  
resinæ terebinthinæ, singulorum p. iv. \*.  
myr-

Cap. 22. MEDICINA. 271  
myrrhæ p. III. \*. rosæ p. I. \*. fevi vitulini  
p. III. ceræ p. II. \*. miscentur.

4. *Ad inflammationes vulvæ Numenii Pessus.*

Optima autem adversus inflammationes  
5 vulvæ Numenii compositio est, quæ habet  
croci p. III. \*. ceræ p. I. \*. butyri p. VIII. \*.  
adipis anserinæ p. XII. \*. vitellos coctos duos,  
rosæ minus cyatho.

5. *Ad ejiciendum è vulva infantem mortuum.* 263, 15.

10 Si vero infans intus decessit, quo facilius  
ejiciatur, malicorium ex aqua terendum,  
eoque utendum est.

6. *Si mulier vitio locorum concidit, quæ  
curatione utendum sit.*

15 Si concidere vitio locorum mulier solet,  
cochleæ cum testis suis comburendæ, conte-  
rendæque, deinde his mel adjiciendum.

7. *Si mulier non comprehendit.*

Si non comprehendit, adeps leonina ex  
20 rosâ mollienda est.

## C A P. XXII.

*De Medicamentis, quibus aridis utimur,*

1. *Ad carnem supercrescentem exedendam.*

25 **Q**UÆDAM mixturæ medicamentorum  
sunt, quibus aridis neque coactis uti-  
mur sic, ut inspergamus; aut cum ali-  
quo liquido mixta illinamus: quale est, ad  
carnem supercrescentem exedendam, quod  
habet squamæ æris, fuliginis thuris, sin-  
30 gulorum p. I. \*. æruginis p. II. \*. Hæc  
autem eadem cum melle purgant ulcera;  
& cum cera, implent. Misy quoque &  
galla, si paribus portionibus misceantur,  
corpus consumunt: eaque vel arida in-  
sper-

spargere licet, vel excepta cadmia illinire.

2. *Ad putrem carnem continendam, ne ultra serpat, eamque leniter exedendam, plures compositiones.*

Putrem vero carnem continet, neque §  
 ultra serpere patitur, & leniter exest, mel  
 vel cum lenticula, vel cum marrubio, vel  
 cum oleæ foliis, ante ex vino decoctis.  
 Item fertula campana in mulso cocta, de-  
 inde contrita. Aut calx cum cerato. Aut 10  
 amaræ nuces cum allio, sic ut hujus pars  
 tertia sit, paululumque his croci adjiciatur.  
 Aut quod habet spumæ argenti p. vi. \*. cor-  
 nu bubuli combusti p. xii. \*. olei myrtei, &  
 vini cyathos ternos. Aut quod ex his con- 15  
 stat: floris punici mali, atramenti futorii,  
 aloes, singulorum p. ii. \*. aluminis scissilis,  
 thuris, singulorum p. iv. \*. gallæ p. viii. \*.  
 aristolochiæ p. x. \*. Vehementius idem fa-  
 cit, etiam adurendo, auripigmentum cum 20  
 chalcitide, & aut nitro, aut calce, aut charta  
 combusta. Item sal cum aceto. Vel ea com-  
 positio, quæ habet chalcitidis, capitulorum  
 mali punici, aloes, singulorum p. ii. \*. alu-  
 minis scissilis, thuris, singulorum p. iv. \*. 25  
 gallæ p. viii. \*. aristolochiæ. p. x. \*. mellis  
 quantum satis sit ad ea cogenda. Vel can-  
 tharidum, sulphuris, singulorum p. i. \*.  
 lolii p. iiii. \*. quibus adjicitur picis liquidæ  
 quantum satis est ad jungendum. Vel chal- 30  
 citis quoque cum resina & ruta mixta: aut  
 cum eadem resina diphryges: aut uva ta-  
 minia cum pice liquidâ. Idem vero possunt  
 & feces vini combustæ, & calcis & nitri  
 pares

Cap. 22. MEDICINA. 273  
pares portiones. Vel aluminis scissilis p. i.  
thuris, sandarachæ, nitri, singulorum p. i.  
\*. gallæ. p. viii. \*. aristolochiæ p. x. \*. mel-  
lis quantum satis est.

5 3. *Heræ compositio. a*

Est etiam Heræ compositio, quæ habet  
myrrhæ, chalcitidis, singulorum, p. ii. \*.  
aloes, thuris, aluminis scissilis, singulorum  
p. iv. \*. aristolochiæ, gallæ immaturæ, sin-  
10 gulorum p. viii. \*. malicorii contriti p.  
xx. \*.

4. *Judæi compositio.*

Est & Judæi: in qua sunt calcis partes  
duæ, nitri quam ruberrimi pars tertia:  
15 quæ urina impuberis pueri coguntur, do-  
nec strigmenti crassitudo sit. Sed subinde  
is locus, cui id illinitur, madefaciendus est.

5. *Jollæ compositio.*

20 At Jollas, chartæ combustæ, sandara-  
chæ, singulorum p. i. \*. calcis p. ii. p. au-  
ripigmenti tantundem miscebat.

6. *Ad sanguinis profluvia vel ex membrana  
cerebri, vel aliis locis; & ad cancerum, & ad  
25 inducendam cicatricem, & ad coercendam  
carnem incrementem.*

Si vero ex membrana, quæ super cere-  
brum est, profluit sanguis, vitellus con-  
bustus & contritus inspergi debet. Si ex  
30 alio loco sanguinis profluvium est, auri-  
pigmenti, squamæ æris, singulorum p. i. \*.  
sandarachæ p. ii. \*. marmoris cocti p. iv. \*.  
inspergi debent. Eadem cancro quoque ob-  
sistunt. Ad inducendam cicatricem, squa-  
mæ æris, thuris fuliginis, singulorum  
S P. ii. \*.



p. II. \*. calcis p. IV. p. Eadem incrementem quoque carnem coercent.

7. *Timæi compositio ad ignem sacrum vel cancrum.*

Timæus autem ad ignem sacrum, & ad cancrum his utebatur : myrrhæ p. II. \*. thuris, atramenti sutorii, singulorum p. III. \*. sandarachæ, auripigmenti, squamæ æris, singulorum p. IV. \*. gallæ p. VI. \*. cerussæ combustæ p. VIII. \*. Eadem vel arida insper- 10  
sa, vel melle excepta idem præstant.

8. *Ad sternutamenta excitanda.*

Sternutamenta vero & albo veratro, vel struthio coniecto in nares excitantur. vel his mistis : piperis, veratri albi, singulorum 15  
p. \*. III. castorei p. I. \*. spumæ nitri p. II. \*. struthii p. III. \*.

9. *Gargarizationes quibus fieri debeant.*

Gargarizationes autem aut lævandi causa fiunt, aut reprimendi, aut evocandi. Læ- 20  
vant, lac, cremor vel ptisanæ, vel furfurum. Reprimit autem aqua, in qua vel lenticula, vel rosa, vel rubus, vel cotoneum malum, vel palmulæ decoctæ sunt. Evocant, fina- 25  
pi, piper.

C A P. XXIII.

*De Antidotis,  
& quibus malis opitulentur.*

**A**NTIDOTA raro, sed præcipue inter- 30  
dum necessaria sunt, quia gravissimis casibus opitulantur. Ea recte quidem dantur collisis corporibus vel per ictus, vel ubi ex alto deciderunt, vel in viscerum,  
late-

Cap. 23. MEDICINA: 275  
laterum, faucium, interiorumque partium  
doloribus. Maxime autem desideranda sunt  
adversus venena, vel per morsus, vel per ci-  
bos, aut potiones nostris corporibus inserta.

5 1. *Compositio antidoti.*

Unum est, quod habet lacrymæ pa-  
paveris p. \*. z. acori, malabathri p. v. \*. iri-  
dis Illyricæ, gummi, singulorum p. 11. \*.  
anisi p. 111. \*. nardi Gallici, foliorum rosæ  
10 aridorum, cardamomi, singulorum p. 1v.  
\*. petroselini p. \*. 111. z. trifolii p. v. \*. cas-  
siæ nigræ, filis, bdellii, carpobalsami, semi-  
nis papaveris albi, singulorum p. \*. z. styra-  
cis p. \*. v. z. myrrhæ, opopanacis, nardi  
15 Syri, thuris masculi, hypocistidis succi, sin-  
gulorum p. vi. \*. castorei p. vi. \*. costi, pi-  
peris albi, galbani, resinæ terebinthinæ,  
croci, floris junci rotundi, singulorum p.  
vi. \*. z. dulcis radicis p. viii. \*. z. quæ  
20 melle vel passo excipiuntur.

2. *Aliud antidotum, a Ambrosia nominatum;  
quod Zopyrus Ptolemæo regi composuit.*

Alterum, quod Zopyrus regi Ptolemæo  
dicitur composuisse, atque Ambrosiam  
25 nominasse; ex his constat: costi, thuris  
masculi, singulorum p. v. \*. piperis albi p.  
\*. z. floris junci rotundi p. 11. \*. cinamomi  
p. 111. \*. cassiæ nigræ p. 1v. \*. croci Cilicii  
p. \*. 1v. z. myrrhæ, quam staecten nominant,  
30 p. v. \*. nardi Indici p. \*. v. z. quæ singula  
contrita melle cocto excipiuntur: deinde,  
ubi utendum est, id, quod b Ægyptiæ fabæ  
magnitudinem impleat, in potione vini di-  
luitur.

S 2

3. An-

a Ambrosiæ Junii Crispi meminit Marcellus de  
Medic. cap. XXIII. p. 345. b Rhodius de Ponderib.  
p. 25.

3. *Antidotum Mithridatis.* c

Nobilissimum autem est Mithridatis. quod quotidie sumendo rex ille dicitur adversus venenorum pericula tutum corpus suum reddidisse. In quo hæc sunt: costi p. \*. z, acori p. v. \*. hyperici, cumini, sagapeni, acaciæ succi, iridis Illyricæ, cardamomi, singulorum p. ii. \*. anisi p. iii. \*. nardi Gallici, gentianæ radicis, aridorum rosæ foliorum, singulorum p. iv. \*. papaveris lachrymæ, petroselini, singulorum p. \*. iv. z. cassiæ, fileris, lolii, piperis longi, singulorum p. vi. \*. styracis p. \*. v. z. calto-  
rei, thuris, hypocistidis succi, myrrhæ, opopanacis, singulorum p. vi. \*. malabathri  
folii p. vi. \*. floris junci rotundi, resinæ terebinthinæ, galbani, dauci Cretici feminis, singulorum p. \*. v. z. nardi, opobalsami, singulorum p. \*. vi. z. thlaspis p. \*. vi. radicis Ponticæ p. vii. \*. croci, zinziberis, cinnamomi, singulorum p. \*. viii. Hæc contrita melle excipiuntur, & adversus venenum, quod magnitudinem nucis Græcæ impleat, ex vino datur. In cæteris autem affectibus corporis pro modo eorum vel quod d Ægyptiæ fabæ vel ervi magnitudinem impleat, satis est.

## C A P. XXIV.

D *Acopis.* a.1. *Acopum nervis utile.*

**A** C O P A quoque utilia nervis sunt. Quale est, quod habet floris junci rotundi p. \*. ii. zz. costi, junci quadrati,

c Plin. H. N. XXIII, 18. d I. Rhodius de Ponderib. p. 26. a Scribon, Larg. cap. CLIV. c. 26.

drati, lauri baccarum, ammoniaci, cardamomi, singulorum p. \*. iv. z. myrrhæ, æris combusti, singulorum p. vii. \*. iridis Illyricæ, ceræ, singulorum p. iv. \*. Alexandrini calami, junci rotundi, aspalathi, xylobalsami, singulorum p. xviii. \*. fevi. p. i. \*. unguenti irini cyathum.

2. *Acopum Elodes nervis utile.*

Alterum, quod ἐλαιώδες vocant, hoc modo fit: ceræ p. \*. z. olei tantundem, resinæ terebinthinæ ad nucis juglandis magnitudinem; simul incoquuntur: deinde infusa in mortario teruntur, instillaturque subinde quam optimi mellis acetabulum, tum irini unguenti, & rosæ terni cyathi.

3. *Εἴχρεια ad ulcera purganda & implenda.*

*Εἴχρεια* autem Græci vocant liquida, quæ illinuntur. Quale est, quod fit ad ulcera purganda & implenda, maxime inter nervos, paribus portionibus inter se mixtis, butyri, medullæ vitulinæ, fevi vitulini, adipis anserinæ, ceræ, mellis, resinæ terebinthinæ, rosæ, olei cicini. Quæ separatim omnia liquantur, deinde liquida miscentur, & tum simul teruntur. Et hoc quidem magis purgat: magis vero emollit, si pro rosâ cyprus infunditur.

4. *Ad sacrum ignem.*

Ad sacrum ignem: spumæ argenti p. vi. \*. cornu bubuli combusti p. ii. \*. conteruntur, adjiciturque invicem vinum, & id, quod specialiter <sup>b</sup> sic vocatur, & myrteum, donec utriusque terni cyathi conficiantur.

<sup>b</sup> Omnes edit. *Sil.* cujus meminit Plin. H. N. XXXIII, 13. Plura loca congestit R hodijs ad Scribon. Larg. cap. XXX. c. 126. & in Lexico.

## C A P. XXV.

## De Catapotiiis.

1. *Catapotium ad somnum accersendum, & levationem doloris, & simul ad coquendum.* 5

CATAPOTIA quoque multa sunt, variisque de causis fiunt. *A'vādvra* vocant, quæ somno dolorem levant. Quibus uti, nisi nimia necessitas urget, alienum est. Sunt enim ex vehementibus medicamentis, & stomacho alienis. Prodest tamen etiam ad concoquendum, quod habet papaveris lachrymæ, galbani, singulorum p. i. \*. myrrhæ, castorei, piperis, singulorum p. ii. Ex quibus, quod ervi magnitudinem 10  
habet, fatis est devorasse. 15

2. *Catapotium valentius ad somnum.*

Alterum, stomacho pejus, ad somnum valentius, ex his fit: mandragoræ p. \*. z. apii feminis, item hyoscyami feminis, singulorum p. iv. \*. quæ ex vino teruntur. Unum autem ejusdem magnitudinis, quæ supra posita est, abunde est sumpsisse. 20

3. *Catapotium ad plurimos dolores per somnum leniendos.* 25

Sive autem capitis dolores, sive ulcera, sive lippitudo, sive dentes, sive spiritus difficultas, sive intestinorum tormenta, sive inflammatio vulvæ, sive coxæ est, sive jecur, aut lienis, aut latus torquet, sive vitio 30  
locorum aliqua prolabitur & obmutescit, occurrit dolori per quietem ejusmodi catapotium. Silis, acori, rutæ silvestris feminis, singulorum p. ii. \*. castorei, cinamomi, su-



singulorum p. ii. \*. papaveris lachrymæ, panacis radice, mandragoræ malorum aridorum, junci rotundi floris, singulorum p. ii. \*. piperis grana LVI. Hæc per se contrita, rursus instillato subinde passo, simul omnia teruntur, donec crassitudo sordium fiat. Ex eo paulum aut devoratur, aut aqua diluitur, & potui datur.

4. *Catapodium aliud ad multa valens.*

10 Quinetiam silvestris papaveris, cum jam ad excipiendam lachrymam maturum est, manipulus, qui manu comprehendi potest, in vas demittitur, & superinfunditur aqua, quæ id contegat, atque ita coquitur. Ubi  
15 jam bene manipulus is coctus est, ibidem expressus projiciatur; & cum eo humore passum pari mensura misceatur, inferveatque, donec crassitudinem sordium habeat. Cum infrixit, catapodia ex eo fiunt, ad nostræ  
20 † fabæ magnitudinem, habentque usum multiplicem. Nam & somnum faciunt, vel per se assumpta, vel ex aqua data: & aurium dolores levant, adjectis exiguo modo rutæ succo, ac passo: & tormina supprimunt ex  
25 vino liquata: & inflammationem vulvæ coercent, mista cerato ex rosa facto, cum paululum his croci quoque accessit: & ex aqua fronti inducta, pituitam in oculos decurrentem tenent.

30 5. *Catapodium ad inducendum somnum, quem vulva dolens prohibuit.*

Item, si vulva dolens somnum prohibet, croci p. ii. \*. anisi, myrrhæ, singulorum p. i. \*. papaveris lacrymæ p. iv. \*. cicutæ

S 4

femi-

† Rhodius de Ponder. p. 25.

feminis p. viii. \*. miscentur, excipiunturque vino veteri & quod lupini magnitudinem habet, in tribus cyathis aquæ diluitur. Id tamen in febre periculose datur.

6. *Ad jecur sanandum.*

5

Ad sanandum jecur, nitri p. \*. z. croci, myrrhæ, nardi Gallici, singulorum p. i. \*. melle excipiuntur, daturque, quod Ægyptiæ fabæ magnitudinem habeat.

7. *Ad finiendos dolores lateris.*

10

Ad lateris dolores finiendos piperis, aristolochiæ, nardi, myrrhæ pares portiones.

8. *Ad thoracis dolores finiendos.*

Ad thoracis, nardi p. i. \*. thuris, cassiæ, singulorum p. iiii. \*. myrrhæ, cinnamomi, 15  
singulorum p. vi. \*. croci p. viii. resinæ terebinthinæ quadrans, mellis heminæ tres.

9. *Catapotium Athenionis ad tussim.*

Ad tussim, Athenionis: myrrhæ, piperis, 20  
singulorum p. i. \*. castorei, papaveris lachrymæ, singulorum p. i. \*. Quæ separatim contusa postea junguntur, & ad magnitudinem fabæ nostræ, bina catapotia mane, bina noctu dormituro dantur.

10. *Catapotium Heraclidis Tarentini*

25

*ad tussim & somnum.*

At, si tussis somnum prohibet, ad utrumque Heraclidis Tarentini: croci p. i. \*. cinnamomi, castorei, papaveris lachrymæ, 30  
singulorum p. i. \*. myrrhæ, piperis longi, costi, galbani, singulorum p. \*. z.

11. *Catapotium ad purganda ulcera*

*in faucibus tussientibus.*

Quod si purganda sunt ulcera in faucibus

bus

bus tuffientibus : panacis , myrrhæ , resinæ terebinthinæ , fingulorum p. v. \* . galbani p. \* . z. hyffopi p. \* . z. conterenda funt , hisque hemina mellis adjicienda , & quod digito excipi potest , devorandum est.

12. *Colice Cassii medici.*

Colice vero Cassii ex his constat: 2 croci, 224, 1. anisi , castorei , fingulorum p. 111. \* . petroselinii p. iv. \* . piperis & longi , & rotundi, 10 fingulorum p. v. \* . papaveris lacrymæ , junci rotundi , myrrhæ , nardi , fingulorum p. vi. \* . quæ melle excipiuntur. Id autem & devorari potest , & ex aqua calida sumi.

15 13. *Ad infantem mortuum aut secundas expellendas.*

Infantem vero mortuum , aut secundas expellit aquæ potio , cui salis ammoniaci p. i. \* . aut cui dictami Cretici p. i. \* . adjectum est.

14. *Laborantibus ex partu quid dari debeat.*

20 Ex partu laborantibus , erysimum ex vino tepido jejunis dari debet.

15. *Ad adjuvandum vocem.*

Vocem adjuvat , thuris p. i. \* . in duobus cyathis vini datum.

25 16. *Adversus difficultatem urinæ.*

Adversus urinæ difficultatem : piperis longi , castorei , myrrhæ , galbani , papaveris lacrymæ , croci , costi , uncia singulæ , styracis , resinæ terebinthinæ pondo sextantes , mellis apsinthii cyathus. Ex quibus 30 ad magnitudinem fabæ Ægyptiæ mane & cœnato dari debet.

17. *Arteriaces compositio quomodo fiat.*

Arteriace vero hoc modo fit: cassiæ , iris, S 5 dis,

a Forte costi uti libro IV. c. 14. sed malim ibi legere croci , ita Scribon. Larg. cap. XXIX. cujus descriptio in alius variat.

282 A. CORN. CELSI Lib. 5.  
dis, cinnamomi, nardi, myrrhæ, thuris, singulorum p. 1. \*. croci p. 1. \*. piperis † grana xxx. ex passu tribus sextariis decoquuntur, donec mellis crassitudo his fiat. Aut croci, myrrhæ, thuris singulorum p. 1. \*. conjiciuntur in passu eundem modum, eodemque modo decoquuntur. Aut ejusdem passu heminæ tres usque eo coquuntur, donec extracta inde gutta indurescat, & adjicitur tritæ cassiæ p. 1. \*. 10

### C A P. XXVI.

*De quinque generibus noxarum corporis.*

CUM facultates medicamentorum proposuerim; genera, in quibus noxa corpori est, proponam. Ea quinque sunt. Cum quid extrinsecus læsit, ut in vulneribus. Cum quid intra seipsum corruptum est, ut in cancro. Cum quid innatum est, ut in vesica calculus. Cum quid increvit, ut vena, quæ intumescens in varicem convertitur. Cum quid deest, aut cum curta pars aliqua est. Ex his alia sunt, in quibus medicamenta, alia in quibus plus manus proficit. Ego, dilatis his, quæ præcipue scalpellum † in manum postulant, nunc de his dicam, quæ maxime medicamentis egent. Dividam autem hanc quoque curandi partem, sicut priorem; & ante dicam de his, quæ in quamlibet partem corporis incidunt: tum de his, quæ certas partes infestant. Incipiam à vulneribus. 15 20 25 30

1. *De vulneribus, quæ per tela inferuntur.*

In his autem ante omnia scire medicus debet,

† p. 252. 257. ‡ aut vel ac.

debet, quæ insanabilia sint, & quæ difficilem curationem habeant, quæ promptiorem. Est enim prudentis hominis, primum eum, qui servari <sup>b</sup> non potest, non attingere, nec subire speciem ejus, ut occisi, quem <sup>14, 1.</sup> fors ipsius interemit. Deinde, ubi gravis metus sine certa tamen desperatione est, indicare necessariis periclitantis, in difficili <sup>c</sup> rem esse: ne, si victa ars malo fuerit, vel <sup>10</sup> ignorasse, vel fefellisse videatur. Sed ut hæc prudenti viro conveniunt: sic rursus histrionis est, parvam rem attollere, quo plus præstitisse videatur. Obligari æquum est confessione promptæ rei, quo curiosius <sup>15</sup> etiam circumspiciat, ne, quod per se exiguum est, majus curantis negligentia fiat.

2. *Quæ vulnera insanabilia sint.*

<sup>d</sup> Servari non potest, cui basis cerebri, cui cor, cui stomachus, cui jecinoris portæ, cui <sup>20</sup> in spina <sup>‡</sup> medulla percussa est; cuique aut pulmo medius, aut jejunum, aut tenuius intestinum, aut ventriculus, aut renes vulnerati sunt; cuive circa fauces grandes <sup>ve-</sup> <sup>81, 23.</sup> næ, vel arteriæ præcisæ sunt.

<sup>25</sup> 3. *Quæ vulnera difficilem curationem habeant.*

Vix autem ad sanitatem perveniunt, quibus ulla parte aut pulmo, aut jecinoris crassum, aut membrana, quæ continet cere- <sup>512, 13.</sup> brum, aut lienis, aut vulva, aut vesica, aut <sup>30</sup> ullum intestinum, aut septum transversum vulneratum est. Hi quoque in præcipiti sunt, in quibus usque ad grandes intusque

<sup>b</sup> Hipp. de Arte T. IV, 6. XXIII, 5, 6. Apuleius de Doctr. Platon. L. II. Cicero ad Attic. L. XVI, Ep. 15. Rittershus. ad Isidor. Pelusiot. L. II. Epist. 16. <sup>c</sup> Æginet. VI, 88. <sup>d</sup> Aph. VI, 18. Coac. Not. III, 387. II. Prædict. XIX, XXII. <sup>‡</sup> Exemplum vide apud Tulpium Obs. L. III. c. 27. <sup>e</sup> Aph. VI, 24. Coac. Not. III, 379, 389.



conditas venas in alis vel poplitibus mucro defedit. Periculosa etiam vulnera sunt, ubicunque venæ majores sunt, quoniam exhaurire hominem profusione sanguinis possunt. Idque evenit non in alis tantum, atque poplitibus; sed etiam in his venis, quæ ad anum testiculosque perveniunt. Præter hæc malum vulnus est, quodcunque in alis vel feminibus, vel inanibus locis, vel inter digitos est. Item quodcunque musculum, aut nervum, aut arteriam, aut membranam, aut os, aut cartilaginem læsit.

4. *Quæ vulnera tutiorem curationem habeant.*

Tutissimum omnium, quod in carne est. Et hæc quidem loco vel pejora, vel meliora sunt. Modo vero periculum facit, quodcunque magnum est.

5. *Observationes in vulneris genere & figura.*

Aliquid etiam in vulneris genere figuraque est. Nam pejus est, quod etiam collisum, quam quod tantum discissum est, adeo ut acuto quoque, quam retuso telo, vulnerari commodius sit. Pejus etiam vulnus est, ex quo aliquid excisum est; ex quo ve caro alia parte abscissa, alia dependet. Pestima quæque plaga curva est: tutissima, quæ lineæ modo recta est. Quo deinde propius huic illive figuræ vulnus est, eo vel deterius vel tolerabilius est.

6. *Ætatis observatio, & corporis, & vitæ, & temporis.*

Quinetiam confert aliquid & ætas, & corpus, & vitæ propositum, & anni tempus. quia facilius sanescit puer vel adolescens, quam senior: valens, quam infirmus: neque

f Hippoc. Coac. Not. III, 390. & I. de Morb. III, 5. g II. Præd. XXIV, 2. Coac. Præn. III, 389, h II. Prædict. XIX, 7.

81, 23.

18, 33.  
119,  
31.

30

neque nimis tenuis, neque nimis plenus,  
quam si alterum ex his est: integri habitus,  
quam corrupti: exercitatus, quam iners:  
sobrius & temperans, quam vino veneri-  
5 que deditus. Opportunissimumque curatio-  
ni tempus i vernum est; aut certe neque fer- 42, 17.  
vens, neque frigidum. siquidem vulnera &  
nimius calor & nimium frigus infestant;  
maxime tamen horum varietas: ideoque  
10 perniciosissimus autumnus est. 33, 33.

7. *Signa eorum, quæ intus læsa sunt.*

Sed pleraque ex vulneribus oculis sub-  
jecta sunt: quorundam ipsæ sedes indices  
sunt, quas alio loco demonstravimus, cum  
15 positus interiorum partium ostendimus.  
Veruntamen, quia quædam vicina sunt,  
interestque, vulnus in summa parte sit, an  
penitus penetraverit, necessarium est notas  
subjicere, per quas quid intus ictum sit, sci-  
20 re possimus; & ex quibus vel spes, vel des-  
peratio oriatur.

8. *Signa percussæ cordis. k*

Igitur, corde percussio, sanguis multus  
fertur, venæ languescunt, color pallidissi-  
25 mus, sudores frigidi, malique odoris, tan-  
quam in ægroto corpore oriuntur: extre-  
misque partibus frigidis l matura mors se-  
quitur.

9. *Signa pulmonis icti. m*

30 Pulmone icto, spirandi difficultas est: fan-  
guis ex ore spumans, ex plaga rubens, si-  
mulque etiam spiritus cum sono fertur: in  
vulnus inclinari juvat: quidam sine ratio-  
ne consurgunt. Multi si in ipsum vulnus  
incli-

i Aph. VI, 47. k Æginet. VI, 88. l Aph. VIII, 12.  
m Æginet. VI, 88.

inclinati sunt, loquuntur: si in aliam partem, obmutescunt.

10. *Signa jecinoris vulnerati.*

Jecinoris autem vulnerati notæ sunt: multus sub dextra parte præcordiorum profusus sanguis: ad spinam reducta præcordia; in ventrem cubandi dulcedo; punctiones, doloresque usque ad jugulum, junctumque ei latum scapularum os, intenti. quibus nonnunquam etiam biliosus vomitus accedit.

11. *Signa percussorum renum.*

Renibus vero percussis, dolor ad inguina testiculosque descendit: difficulter urina redditur; eaque aut est cruenta, aut cruor fertur.

12. *Signa vulnerati lienis.*

At, liene iccto, sanguis niger à sinistra parte prorumpit: præcordia cum ventriculo ab eadem parte indurescunt: fitis ingens oritur: dolor ad jugulum, sicut jecinore vulnerato, venit.

13. *Signa percussa vulva.*

At, cum vulva percussa est, dolor in inguinibus, & coxis, & feminibus est: sanguinis pars per vulnus, pars per naturam descendit: vomitus bilis insequitur. Quædam obmutescunt; quædam mente labuntur; quædam, sui compotes, nervorum oculorumque dolore urgeri se confitentur; morientesque eadem, quæ corde vulnerato, patiuntur.

14. *Signa percussæ cerebri, vel membranae ejus.*

Si cerebrum membranave ejus vulnus accepit,

accepit, sanguis per nares, quibusdam etiam per aures exit; fereque bilis n vomitus insequitur: quorundam sensus obtunduntur, appellatique ignorant: quorundam 5 trux vultus est: quorundam oculi, quasi resoluti, huc illucque moventur: fereque tertio, vel quinto die delirium accedit. Multorum etiam nervi o distenduntur. Ante mortem autem plerique fascias, quibus 10 caput deligatum est, lacerant, ac nudum vulnus frigori objiciunt.

15. *Signa stomachi percussi.*

Ubi stomachus autem percussus est, singultus, & bilis vomitus insequitur: si quid 15 cibi vel potionis assumptum est, id redditur cito: venarum motus elanguescunt; sudores tenues oriuntur; per quos extremæ partes frigescent.

20 16. *Signa jejuni intestini, & ventriculi vulnerati, & aliorum intestinorum. p*

Communes vero jejuni intestini & ventriculi vulnerati notæ sunt. Nam cibus & potio per vulnus exeunt: præcordia indurescunt: nonnunquam bilis per os redditur. 25 Intestino tantum sedes inferior est. Cætera intestina icæta vel stercus †, vel odorem ejus exhibent.

17. *Signa percussa medulla, qua in spina est.*

Medulla vero, quæ in spina est, discissa, 30 nervi resolvuntur, aut distenduntur: sensus intercedit: interposito tempore aliquo sine voluntate inferiores partes vel semen, vel urinam, vel etiam stercus excernunt.

18. *Si-*

a Aph. VI, 50. Æginet. VI, 88. Hippoc. Coac. Not. III, 383. 384. o Ægin. VI, 90. p Æginet. VI, 88. † Valleriola Obs. L.II. obs. 9.

18. *Signa septi transversi percussi.*

At, si septum transversum percussum est, præcordia sursum contrahuntur, spina dolet, spiritus rarus est, sanguis spumans fertur.

5

19. *Signa vesica vulnerata.*

Vesica vero vulnerata, dolent inguina: quod super pubem est, intenditur: pro urina, sanguis; at ex ipso vulnere urina descendit: stomachus afficitur. itaque aut bilem vomunt, aut singultiunt: frigus, & ex eo mors sequitur.

20. *De sanguine, & sanie, & pure, & eorum speciebus: quandoque meliora, deteriorave sint.*

His cognitis, etiamnum quædam alia noscenda sunt, ad omnia vulnera ulceraque, de quibus dicturi sumus, pertinentia. Ex his autem exit sanguis, sanies, pus. Sanguis omnibus notus est. Sanies est tenuior hoc, varie crassa, & glutinosa, & colorata. Pus crassissimum albidissimumque, glutinosius & sanguine & sanie. Exit autem sanguis ex vulnere recenti, aut jam sanescente. Sanies est inter utrumque tempus. Pus ex ulcere jam ad sanitatem spectante. Rursum & sanies & pus quasdam species Græcis nominibus distinctas habent. Est enim quædam sanies, quæ vel ἰχῶρ, vel μελίκηρος nominatur. Est pus, quod ἰλαιώδες appellatur. Ἰχῶρ tenuis, subalbidus, ex malo ulcere exit, maximeque ubi, nervo læso, inflammatio secuta est. Μελίκηρος crassior est, glutinosior, & subalbida, mellique albo subsimilis. Fertur hæc quoque ex malis ulce-

15

20

25

30



ulceribus, ubi nervi circa articulos læsi sunt; & inter hæc loca, maxime ex genibus. Ἐλαιῶδες tenue, subalbidum, quasi unguinosum colore, atque pinguitudine oleo albo non dissimile adparet in magnis ulceribus sanescentibus. Malus est autem sanguis, nimium aut tenuis, aut crassus; 82, 1. colore vel lividus, vel niger; aut pituita mistus, aut varius. Optimus calidus, rubens, modice crassus, non glutinosus. Itaque protinus ejus vulneris expedita magis curatio est, ex quo sanguis bonus fluxit. Itemque postea spes in his major est, ex quibus melioris generis quæque proveniunt.

Sanies igitur mala est, multa, nimis tenuis, livida, aut pallida, aut nigra, aut glutinosa, aut mali odoris, aut quæ ipsum ulcus, & junctam ei cutem erodit. Melior est non multa, modice crassa, subrubicunda, aut subalbida. Ἰχῆρ autem pejor est multus, crassus, sublividus aut subpallidus, glutinosus, ater, calidus, mali odoris. Tolerabilior est subalbidus, quique cætera omnia contraria prioribus habet. Melicera autem mala est, multa, & percrassa: melior, quæ & tenuior, & minus copiosa est. Pus inter hæc optimum est. Sed id quoque pejus est, multum, tenue, dilutum; magisque, si ab initio tale est: itemque, si colore fero simile, si pallidum, si lividum, si fœculentum. Præter hæc, si male olet; nisi tamen locus hunc odorem excitat. Melius est, quo minus est, quo crassius, quo albidius: itemque, si læve est, si nihil olet, si

290 A. CORN. CELSI Lib. 5.  
 æquale est Modo tamen, convenire & magnitudini vulneris, & tempori debet. Nam plus ex majore, plus nondum solutis inflammationibus naturaliter fertur. *Ελαιώδης* quoque pejus est multum, & parum pingue: quo minus autem, quoque idipsum pinguius, eo melius est.

21. *Curatio adversus profusionem sanguinis in vulneribus.* 1

Quibus exploratis, ubi aliquis ictus est, qui servari potest, protinus prospicienda duo sunt: ne sanguinis profusio, neve inflammatio interimat. Si profusionem timeamus (quod ex sede vulneris, & ex magnitudine ejus, & ex impetu ruentis sanguinis intelligi potest) ficcis linamentis vulnus implendum est, supraque imponenda spongia ex aqua s frigida expressa, ac manu super comprimenda. Si parum sic sanguis conquiescit, sæpius linamenta mutanda sunt. Et, si sicca parum valent, aceto madefacienda sunt. Id vehemens ad sanguinem supprimendum est: ideoque quidam id vulnere infundunt. Sed alius rursus metus subest; ne, nimis valenter ibi re- tenta materia, magnam inflammationem postea moveat. Quæ res efficit, ut neque rodentibus medicamentis, neque adurentibus, & ob idipsum inducentibus crustam, (quamvis pleraque ex his sanguinem sup- primunt) sit utendum: sed, si semel ad ea decurritur, his potius, quæ mitius idem efficiunt. Quod si illa quoque profluvio vincuntur, venæ, quæ sanguinem fundunt,

appre-

1 *Æginet. IV, 53. Aëtius Tetrab. IV. Serm. II, 51. S Frigidam potui exhibet Aëtius Tetr. I. Serm. III. c. 145. Cels. p. 204, 31.*

204,  
15.  
293,  
18.

apprehendendæ, circaque id, quod ictum est, duobus locis deligendæ intercidendæque sunt, ut & in se ipsæ coeant, & nihilominus ora præclusa habeant. Ubi ne id quidem  
5 res patitur, possunt ferro candenti aduri. Sic etiam satis multo sanguine effuso ex eo loco, quo neque nervus, neque musculus est, utputa in fronte, vel superiore capitis parte, commodissimum est, cucurbitulam  
10 admoveere adversa parte, ut illuc sanguinis cursus revocetur.

22. *Curaciones adversus vulnerum inflammationem.*

Et adversus profusionem quidem in his  
15 auxilium est: adversus inflammationem autem, in ipso sanguinis cursu. Ea timeri potest, ubi læsum est vel os, vel nervus, vel cartilago, vel musculus, aut ubi parum sanguinis pro modo vulneris fluxit. Ergo  
20 quoties quid tale erit, sanguinem mature suppressere non oportebit; sed pati fluere, dum tutum erit, adeo ut, si parum fluxisse videbitur, mitti quoque ex brachio debeat; utique, si corpus juvenile, & robustum, &  
25 exercitatum est: multoque magis, si id vulnus ebrietas præcessit. Quod si musculus læsus videbitur, præcidendus erit. nam percussus, mortiferus est: præcisus, sanitatem recipit.

30 23. *De glutinatione vulnerum.*

Sanguine autem vel suppresso, si nimis erumpit; vel exhausto, si per se parum fluxit; longe optimum est, vulnus glutinari. Potest autem id, quod vel in cute,

vel etiam in carne est; si nihil ei præterea mali accedit. Potest caro, alia parte dependens, alia inhærens; si tamen etiamnum integra est, & conjunctione corporis fovetur.

In his vero, quæ glutinantur, duplex curatio est. Nam si plaga in molli parte est, sui debet: maximeque, si discissa auris ima est, vel imus nasus, vel frons, vel bucca, vel palpebra, vel labrum, vel circa guttur cutis, vel venter. Si vero in carne vulnus est, hiatque, neque in unum oræ facile attrahuntur, futura quidem aliena est: imponendæ vero fibulæ sunt (*ἀγκυρῆς* Græci nominarunt) quæ oras, paulatim tamen, contrahant; quo minus lata postea cicatrix fit.

Ex his autem colligi potest, utrum id quoque, quod alia parte dependens, alia inhærebit, si alienatum adhuc non est, futuram, an fibulam postulet. Ex quibus neutra ante debet imponi, quam intus vulnus purgatum est: ne quid ibi concreti sanguinis relinquatur. Id enim & in pus vertitur, & inflammationem movet, & glutinari vulnus prohibet. Ne linamentum quidem, quod suppressendi sanguinis causa inditum est, inibi relinquendum est. nam id quoque inflammat.

Comprehendi vero futura, vel fibula, non cutem tantum, sed etiam aliquid ex carne, ubi suberit hæc, oportebit; quo valentius hæreat, neque cutem abrumpat. Utraque optima est ex t\*acia molli, non nimis torta, quo mitius corpori insideat.

Utra-

t De ea librum scripsit Ioan. Rhodius. Turneb. Advers. XVII, 21. \* H. F. ab Aquapendente, Oper. Chirurg. P. 1. c. 17. pag. 70. Salmasius Epist. 45. & 49.

Utraque neque nimis rara, neque nimis crebra injicienda est. Si nimis rara est, non continet: si nimis crebra est, vehementer afficit; quia, quo sæpius acus corpus trans-  
 5 ivit, quoque plura loca injectum vinculum mordet, eo majores inflammationes oriuntur; magisque ætate. Neutra etiam vim ullam desiderat: sed ea hætenus utilis est, qua cutis ducentem quasi sua sponte  
 10 subsequitur. Fere etiam fibulæ latius vulnus esse patiuntur: futura oras jungit, quæ ne ipsæ quidem inter se contingere ex toto debent; ut si quod intus humoris concreverit, sit qua emanet. Si quod vulnus neu-  
 15 trum horum recipit, id tamen purgari debet.

Deinde omni vulneri primo imponenda est spongia ex\* aceto expressa. Si sustinere aliquis aceti vim non potest, vino utendum  
 20 est. Levis plaga juvatur etiam, si ex aqua frigida expressa spongia imponitur. Sed ea, quocumque modo imposita est, dum ma-  
 25 det, prodest: itaque, ut inarescat, non est committendum. Licetque sine peregrinis, & conquiritis, & compositis medicamentis vulnus curare. Sed si quis huic parum confidit, imponere medicamentum debet, quod sine sevo compositum sit ex his, quæ  
 30 cruentis vulneribus apta esse proposui: maximeque si caro est, Barbarum: si nervi, vel cartilago, vel aliquid ex eminentibus, quales aures, vel labra sunt, Polybi sphragidem. Alexandrinum quoque viride nervis idoneum est: eminentibusque parti-  
 bus

T 3

\* Maledictam methodum dicit Etmuller in Comment. ad Schrod. & Morell. pag. 408.



294 A. CORN. CELSI Lib. 5.  
bus ea, quam Græci *ῥύπλισσας* vocant.

Solet etiam, colliso corpore, exigua parte findi cutis. Quod ubi incidit, non alienum est, scapello latius aperire; nisi musculi, nervique juxta sunt, quos incidi non expedit. ubi satis diductum est, medicamentum imponendum est. At, si id, quod collisum est, quamvis parum diductum est, latius tamen aperiri propter nervos aut musculos non licet; adhibenda sunt ea, quæ humorem leniter extrahant; præcipueque ex his, id, quod *ῥυπῶδες* vocari proposui. Non alienum est etiam, ubicunque vulnus est grave, impositum, quo id juvetur, insuper circumdare lanam succidam ex aceto & oleo: vel cataplasma, si mollis is locus est, quod leniter reprimat; si nervosus, aut musculosus, quod emolliat.

24. *Quomodo vulnus ligari conveniat.*

Fascia vero ad vulnus deligandum lineam aptissima est: eaque lata esse debet, ut semel injecta non vulnus tantum, sed paululum utrinque ejus comprehendat. Si ab altera parte caro magis recessit, ab ea melius attrahitur: si æque ab utraque, transverse comprehendere oras debet; aut si id vulneris ratio non patitur, media primum injicienda est, ut tum in utranque partem ducatur. Sic autem deliganda est, ut & contineat, nec adstringat. quod non continetur; elabitur: quod nimis adstrictum est, cancro periclitatur. Hieme sæpius fascia circuire debet: æstate, quoties necesse est. Tum extrema pars ejus inferioribus ac affuen-

297,  
15.

300,  
17.

Cap. 26. MEDICINA. 295  
affluenda est. nam nodus vulnus lædit. nisi  
tamen longe est.

Porro neminem decipi decet, ut propriam viscera curationem requirant, de  
5 quibus supra posui. Nam plaga ipsa curanda extrinsecus, vel futura, vel alio medicinæ genere est. In visceribus nihil movendum est; nisi, si quid aut ex jecinore, aut liene, aut pulmone duntaxat extremo dependeat, id præcidatur. Alioquin vulnus interius ea victus ratio eaque medicamenta sanabunt, quæ cuique visceri convenire superiore libro proposui.

25. *Quomodo vulnerato agendum sit.*

15 His ita primo die ordinatis, homo in lecto collocandus est: isque si grave vulnus est, abstinere, quantum vires patiuntur, ante inflammationem, cibo debet: bibere, donec sitim finiat, aquam calidam; vel, si  
20 æstas est, ac neque febris, neque dolor est, etiam frigidam. Adeo tamen nihil perpetuum est, sed semper pro vi corporis æstima- 120,7.  
mandum, ut imbecillitas etiam cibum protinus facere necessarium possit; tenuem  
25 scilicet, & exiguum, qui tantum sustineat. Multique etiam ex profluvio sanguinis intermorientes ante ullam curationem vino 299,  
\* reficiendi sunt; quod alioqui inimicissimum vulneri est. 21.

30 26. *De notis vulnerum.*

Nimis vero vintumescere vulnus, periculosum: nihil x intumescere, periculosissimum est. illud indicium magnæ inflammationis: hoc, emortui corporis est. Pro-

T 4 tinus.

\* Athen. Deipnos. L. I. C. 8, p. 10.

v Aph. V, 66.

x II, Epidem. III, 128.

tinusque, si mens homini consistit, si nulla febris accessit, scire licet, mature vulnus sanum fore. At ne febris quidem terrere debet, si in magno vulnere, dum inflammatio est, permanet. Illa perniciofa est, 5 quæ vel levi vulnere supervenit, vel ultra tempus inflammationis durat, vel delirium movet: vel si nervorum y rigorem aut distentionem, quæ ex vulnere orta est, ca non finit. Vomitus quoque biliosus non 1 voluntarius, vel protinus, ut percussus est aliquis, vel dum inflammatio manet, malum signum est in his duntaxat, quorum vel nervi, vel etiam nervosi loci vulnerati sunt. Sponte tamen vomere, non alienum 15 est; præcipue his, quibus in consuetudine fuit: sed neque protinus post cibum, neque jam inflammatione orta, neque cum in superioribus partibus plaga est.

52, 18.  
287, 2.

27. *De curationibus vulnerum.* 20

z Biduo sic vulnere habito, tertio die id aperiendum, detergendaque sanies ex aqua frigida est, eademque rursus injicienda sunt. Quinto jam die, quinta inflammatio futura est, se ostendit. Quo die rursus de- 25 tecto vulnere, considerandus color est. Quod si lividus, aut pallidus, aut varius, aut niger est; scire licet, malum vulnus esse. idque, quandocumque animadversum est, terrere nos potest. Album, aut rubicun- 30 dum esse vulnus, commodissimum est. Item cutis dura, crassa, dolens, periculum ostendit. Bona signa sunt, ubi hæc sine dolore, tenuis, & mollis est. Sed si glutinatur vulnus,

y Aph. IV, 57. II, 26.  
z De Fractur. XXXIII, 5.

vulnus, aut leviter intumuit, eadem sunt imponenda, quæ primo fuerunt.

Si gravis inflammatio est, neque glutinandi spes est, neque movetur, aquæ quæ  
 5 que a calidæ necessarius usus est, ut materiam digerat; & duritiam emolliat, & pus  
 citet. Ea sic temperanda est, ut manu contingenti jocunda sit; & usque eo adhibenda, donec aliquid minuisse ex tumore ca-  
 10 loremque ulceri magis naturalem reddidisse videatur. Post id fomentum, si late  
 plaga non patet, imponi protinus emplastrum debet, maximeque, si grande vulnus  
 est, tetrapharmacum: si in articulis, digi-  
 15 tis, locis cartilaginosis, *ῥυπαρῶδες*. At si latius 294.  
 hiat, idem illud emplastrum liquari ex iri- 12.  
 no unguento oportet, eoque inlita linamenta disponi per plagam: deinde emplastrum supra dari, & super id lanam succidam;  
 20 minusque etiam, quam primo, fasciæ adstringendæ sunt.

28, *Curationes propria articulorum.*

Sed propria quædam in articulis visenda sunt. In quibus si præcisi nervi sunt, qui  
 25 continebant, debilitas<sup>b</sup> ejus partis sequitur. Si id dubium est, & ex acuto telo plaga est, & ea transversa, commodior est: & si ex retuso & gravi est, nullum in figura discrimen est: ad videndum est, pus supra articulum,  
 30 an infra nascatur. Si sub eo nascitur, albumque & crassum diu fertur, nervum præcisum esse credibile est: magisque, quo majores dolores inflammationesque, & quo maturius excitatæ sunt. Quamvis autem

T 5

non

<sup>a</sup> Aph. V. 22. <sup>b</sup> Coac. Præn. III, 385. I. de Morb. III, 2.

298            A. CORN. CELSI            Lib. 5.  
non abscissus nervus est; tamen, si circa du-  
rus tumor diu permanet, necesse est, &  
diuturnum ulcus esse, & sanato quoque eo,  
tumorem permanere: futurumque est, ut  
tarde membrum id vel extendatur, vel f  
contrahatur. Major tamen in extendendo  
257,            mora est, ubi recurvato articulo curatio  
33.            adhibita est; quam in recurvando eo, quod  
rectum continuerimus. Collocari quoque  
membrum, quod ictum est, ratione certa 10  
debet. Si glutinandum est, ut superius sit:  
si in inflammatione est, ut in neutram par-  
tem inclinatum sit: si jam pus profluit, ut  
devexum sit.

348,            Optimum etiam medicamentum, b quies 15  
41.            est. Moveri, & ambulare, nisi sanis, alie-  
num est. Minus tamen periculosum his est,  
qui in capite vel brachiis, quam qui in in-  
ferioribus partibus vulnerati sunt. Mini-  
meque ambulatio convenit, femine, aut 20  
crure, aut pede laborante. Locus, in quo  
cubat, tepidus esse debet. Balneum quo-  
que, dum parum vulnus purum est, inter  
res infestissimas est. Nam id & tumidum  
& sordidum reddit. Ex quibus ad cancrum 25  
transitus esse consuevit. Lenis fricatio recte  
adhibetur; sed his partibus, quæ longe ab-  
sunt à vulnere.

29. *Vulnus quomodo purgandum est.*

262.            Inflammatione finita, vulnus purgan- 30  
dum est. Id optime faciunt tincta in mel-  
le linamenta: supraque id emplastrum vel  
πετραφάρμακον vel εννεαφάρμακον dandum  
est. Tum demum vero purum ulcus est,  
cum

b Hipocrat. de Ulcer. T. II, 3. j



cum rubet, ac nimium neque ficcum, neque humidum est. At, quodcumque sensu caret, quod non naturaliter sentit; quod nimium aut aridum aut humidum est; § quod aut albidum, aut lividum, aut nigrum est; id purum non est.

30. *Quomodo vulnus implendum est.*

Purgato vulnere, sequitur ut impleatur; jamque calida aqua eatenus necessaria est, 10 ut sanies removeatur. Lanæ succidæ supervacuus usus est: lota melius circumdatur. Ad implendum autem vulnus proficiunt quidem etiam medicamenta aliqua: itaque ea adhiberi non alienum est; ut butyrum cum rosa, & exigua mellis parte; 15 aut cum eadem parte mellis aut cum eadem rosa, τετραφάρμακον; aut ex rosa linamenta. Plus tamen proficit balneum rarum. Cibi boni succi; vitatis omnibus acribus. 20 Sed jam plenioribus, avis, & venatio, & suilla elixa dari potest. Vinum omnibus, 295, dum febris, dum inflammatio est, alienum 28. est: itemque usque ad cicatricem, si nervi, musculive vulnerati sunt; etiam, si alte caro. 25 At, si plaga in summa cute generis tutioris est, potest non pervetus, modice tamen datum, ad implendum quoque proficere. Si quid molliendum est, quod in nervosis locis, musculosisque necessarium est, cerato 30 quoque super vulnus utendum est. At, si caro supercrevit, modice reprimit ficcum linamentum; vehementius, squama æris. Si plus est, quod tolli opus est, adhibenda sunt etiamnum vehementiora, quæ corpus excedant.

300 A. CORN. CELSI Lib. 5.  
exedant. Cicatricem, post omnia hæc, com-  
mode inducit lycium ex passo aut lacte  
dilutum; vel etiam per se impositum sic-  
cum linamentum vehementius.

31. De ulceribus, quæ extrinsecus per vulnera 5  
incidunt, curationibusque eorum.

331.  
411.

Hic ordo felicitatis curationis est. Sed quæ-  
dam tamen periculosa incidere consue-  
runt. Interdum enim vetustas ulcus occu-  
pat, induciturque ei callus, & circum oræ 10  
crassæ livent. Post quæ, quicquid medi-  
camentorum ingeritur, parum proficit;  
quod fere negligenter curato ulceri super-  
venit.

294,  
31.  
533,  
23.

Interdum vel ex nimia inflammatione, 15  
vel ob æstus immodicos, vel ob nimia fri-  
gora, vel quia nimis vulnus adstrictum est,  
vel quia corpus senile, aut mali habitus  
est, cancer occupat. Id genus à Græcis di-  
ductum in species est; nostris vocabulis 20  
non est. Omnis autem cancer non solum id  
corrumpit, quod occupavit; sed etiam ser-  
pit: deinde aliis aliisque signis \* discernitur:  
Nam modo super inflammationem rubor  
ulcus ambit, isque cum dolore procedit; 25  
*ἰρυσίπιλας* Græci nominant: modo ulcus  
nigrum est, quia caro ejus corrupta est, id-  
que vehementius; etiam in putrescendo in-  
tenditur, ubi vulnus humidum est, & ex  
nigro ulcere humor pallidus fertur, mali- 30  
que odoris est, & caro intus corrupta: in-  
terdum etiam nervi ac membranæ resol-  
vuntur, specillumque demissum descen-  
dit aut in latus, aut deorsum, eoque vitio  
non-

\* In principio difficillimè cognoscitur teste Galeno  
M. M. XIV. Vide Hildan. Observ. Chirurg. Cent. 1.  
Obs. 1.

nonnunquam os afficitur : modo oritur ea, quam Græci γάγγραινα appellat. 303

Priora in qualibet parte corporis fiunt : hæc in prominentibus membris, id est inter ungues, & alas, vel inguina; fereque in fenibus, vel in his, quorum corpus mali habitus est. Caro illi ulceri vel nigra, vel livida est, sed sicca & arida; proximaque cutis, plerunque subnigris pustulis impletur; 10 deinde ei proxima, vel pallida, vel livida fereque æruginosa & sine sensu est. Deterior in inflammatione est, omniaque ea simul ferpunt: ulcus, in locum pustulosum: Pustulæ, in eum, qui pallet aut livet: pallor aut livor, 15 in id quod inflammatum est: inflammatio, in id quod integrum est, transit. Inter hæc deinde febris acuta oritur, ingensque fitis: quibusdam etiam delirium accedit: alii, quamvis mentis suæ compotes sunt, balbutiendo vix sensus suos explicant: incipit 20 affici stomachus: fit fœdi spiritus ipse odor. Atque initium ejus quidem mali recipit curationem: ubi vero penitus infedit, insanabile est. plurimique sub frigido sudore moriuntur. 51, 30.

32. *Curatio veteris ulceris.*

Ac pericula quidem vulnerum hæc sunt. Vetus autem ulcus scalpello circumcidendum est, excidendæque ejus oræ, & quicquid super eas livet, æque incidendum. Si 30 varicula intus est, quæ id sanari prohibet, ea quoque excidenda. Deinde, ubi sanguis emissus, novatumque vulnus est, eadem curatio adhibenda, quæ in recentibus vulneri-

neribus exposita est. Si scalpello aliquis  
uti non vult, potest sanare id emplastrum,  
quod ex ladano fit: &, cum ulcus sub eo  
exesum est, id, quo cicatrix inducitur.

33. *Curatio Erysipelatum.*

Id autem, quod *ἔρυσίπελας* vocari dixi,  
non solum vulnere supervenire, sed sine  
hoc quoque oriri consuevit: atque inter-  
dum periculum magnum adfert; utique, si  
circa cervicem aut c caput constitit.

Oportet, si vires patiuntur, sanguinem  
mittere: deinde imponere simul reprimen-  
tia & d refrigerantia; maximeque cerussam  
solani succo, aut cimoliam cretam aqua  
pluviatili exceptam; aut ex eadem aqua  
subactam farinam cupresso adjecta, aut, si  
tenerius corpus est, lenticula. Quicquid  
impositum est, betæ foliis contegendum  
est, & super linteolum frigida aqua madens  
imponendum. Si per se refrigerantia pa-  
rum proderunt, miscenda erunt hoc mo-  
do: sulphuris p. i. \*. cerussæ, croci, sin-  
gulorum p. x. \*. eaque cum vino conte-  
renda sunt, & id his illinendum: aut, si du-  
rior locus est, solani folia contrita suillæ  
adipi miscenda sunt, & illinita linteolo su-  
perinjicienda.

At, si nigrities est, quæ nequedum ser-  
pit, imponenda sunt, quæ carnem putrem  
lenius exedunt; repurgatumque ulcus sic,  
ut cætera, nutriendum est. Si magis eputre  
est, jamque procedit ac serpit, opus est ve-  
hementius erodentibus. Si ne hæc qui-  
dem evincunt, aduri locus debet, donec  
nul-

c Aëtius Tetr. IV. Serm. II. c. 59. Æginet. IV. 21.  
d Oribas. de Morb. Curat. III. 47. e Aph. VII. 20.

nullus ex eo humor feratur. nam quod sanum est, siccum est, cum aduritur. Post unctionem putris ulceris, superponenda sunt, quæ crustas à vivo resolvant; *ἀπὸ ξα-  
5 πάλιν* Græci nominant. Ubi exciderunt, purgandum ulcus, maxime melle & resina est. Sed iis quoque purgari potest, quibus purulenta curantur, eodemque modo ad sanitatem perducendum est,

10                    34. *Curatio Gangrana.* f

Gangrænam vero, si nondum plane tenet, sed adhuc incipit, curare non difficilimum est; utique in corpore juvenili: & magis etiam, si muscoli integri sunt; si ner-  
15 vi vel læsi non sunt, vel leviter affecti sunt; neque ullus magnus articulus nudatus est; aut carnis in eo loco paululum est, ideoque non multum quod putresceret, fuit; consistitque uno loco vitium; quod maxime  
20 fieri in digito potest. In ejusmodi casu primum est, si vires patiuntur, sanguinem mittere. Deinde, quicquid aridum est, & intentione quadam proximum quoque locum male habet, usque ad sanum corpus  
25 concidere.

Medicamenta vero, dum malum serpit, adhibenda nulla sunt, quæ pus movere consuerunt; ideoque ne aqua quidem calida. Gravia quoque, quamvis reprimentia,  
30 aliena sunt: sed his quam levissimis opus est. superque ea, quæ inflammata sunt, utendum est refrigerantibus. Si nihilo magis malum constitit, uri id, quod est inter integrum ac vitiatum locum, debet.

Præ-



Præcipueque in hoc casu petendum, non à medicamentis solum, sed etiam à vitæ ratione præsidium est. Neque enim id malum, nisi corrupti vitiosique corporis est. Ergo primo, nisi imbecillitas prohibet, abstinentia utendum. Deinde danda, quæ per cibum potionemque alvum, ideoque etiam corpus adstringant; sed ea levia. Postea, si vitium constitit, imponi super vulnus eadem debent, quæ in putri ulcere præscripta sunt. Ac tum quoque plenioribus cibis uti licebit ex media materia; sed tamen non nisi alvum, corpusque ficcantibus: aqua vero pluviatili frigida. Balneum, nisi jam certa fiducia redditæ sanitatis est, alienum est; siquidem emollitum in eo ulcus cito rursus eodem malo afficitur. Solent vero nonnunquam nihil omnia auxilia proficere, ac nihilominus serpere sub his cancer. Inter quæ miserum, sed unicum, auxilium est, ut cætera pars corporis tuta sit, membrum, quod paulatim emoritur, abscindere.

35. *Curatio vulnerum, ubi quid collisum est, aut detritum, aut infixum.* 25

Hæ gravissimorum vulnerum curationes sunt. Sed ne illa quidem negligenda, ubi interior pars collisa; aut ubi dera sum, detritumve aliquid est; aut ubi furculus corpori infixus est; aut ubi tenue, sed altum vulnus insedit. 30

In primo casu commodissimum est mallicorium ex vino coquere, interiorumque ejus partem continere, & cerato miscere  
ex

ex rosa facto, idque superponere : deinde, ubi cutis ipsa exasperata est, inducere lenē medicamentum, qualis λιπαρά est. 267, 9.

Derafo vero, detritoque, imponendum est emplastrum τετραφάρμακον, minuendusque cibus & vinum substrahendum. Neque id, quia non habebit altiores ictus, contemnendum erit : siquidem ex ejusmodi casibus sæpe cancri fiunt. Quod si levius id erit, & in parte exigua, contenti esse poterimus eodem leni medicamento.

Surculum vero, si fieri potest, oportet vel manu, vel etiam ferramento educere. Si vel præfractus est, vel altius descendit, quam ut ita fieri possit, medicamento evocandus est. Optime autem educit superimposita arundinis radix; si tenera est, protinus contrita; si jam durior, ante in mulso decocta. cui semper mel adjiciendum est aut aristolochia cum eodem melle. Pessima ex furculis, arundo est; quia aspera est. Eademque offensa etiam in filice est. Sed usu cognitum est, utranque adversus alteram medicamentum esse, si contrita ac superimposita est. Facit autem idem in omnibus furculis, quodcunque medicamentum extrahendi vim habet. Idem altis tenuibusque vulneribus aptissimum est. Priori rei Philocratis; huic Hecatæi emplastrum maxime convenit. 264.

36. *Quomodo cicatrix vulnere inducenda, purgandaque sit. g*

Ubi vero in quolibet vulnere ventum ad inducendum cicatricem est (quod per-

V

pur-

purgatis jam, repletisque ulceribus necessarium est) primum ex aqua frigida linamentum, dum caro alitur: deinde cum jam continenda est, siccum imponendum est, donec cicatrix inducatur: tum deligari super album plumbum oportet, quo & reprimatur cicatrix, & colorem maxime sano corpori similem accipit. Idem radix silvestris cucumeris præstat. Idem compositio, quæ habet elaterii p. i. \*. spumæ 10  
argenti p. ii. \*. glandis unguentariæ pondo  
iv. \*. quæ excipiuntur resina terebinthina,  
donec emplastri crassitudo ex omnibus fiat.  
At nigras quoque cicatrices leniter purgant, paribus portionibus mixta, ærugo 15  
& plumbum elotum, eademque resina cocta; sive eo ungitur cicatrix, quod in facie fieri potest; sive id ut emplastrum imponitur, quod in aliis partibus commodius est.

At, si vel excrevit cicatrix, vel concava 20  
est, stultum est, decoris causa, rursus & dolorem & medicinam sustinere: alioquin res utrique succurri patitur. Siquidem utraque cicatrix exulcerari scalpello potest. Si medicamentum aliquis mavult, idem efficiunt compositiones hæ, quæ corpus exedunt. Cute exulcerata, super eminentem carnem exedentia medicamenta conjicienda sunt: super concavam, implentia; donec utrumque ulcus sanæ cuti æquetur, & tum 30  
cicatrix inducatur.

## C A P. X X V I I.

*De vulneribus, quæ per morsus inferuntur,  
eorumque curationibus.*

5 **D**IXI de his vulneribus, quæ maxime  
per tela inferuntur. Sequitur, ut de  
his dicam, quæ morfu fiunt, inter-  
dum \* hominis, h interdum simiæ, sæpe canis,  
nonnumquam ferarum, aut aliorum ani-  
10 malium, aut serpentium. Omnis autem  
feræ morsus habent quoddam virus.

Itaque, si vehemens vulnus est, i cucur-  
bitula admovenda est: si levius, protinus  
emplastrum injiciendum, præcipueque  
15 Diogenis. si id non est, quodlibet ex his, 265:  
quæ adversus morsus proposui. si ea non  
sunt, viride Alexandrinum: si ne id qui- 264:  
dem est, quodlibet non pingue ex his, quæ  
recentibus vulneribus accommodantur.

20 Sal quoque his præcipueque ei, quod ca-  
nis fecit, medicamentum est, si aridus vul-  
neri imponitur, superque id duobus digi-  
tis verberatur. exsaniat enim. Ac salsamen-  
tum quoque recte super id vulnus deliga-  
25 tur.

2. *Curatio adversus rabiosæ canis morsum. k*

Utique autem, si rabiosus canis fuit,  
cucurbitula virus ejus extrahendum est.  
Deinde, si locus neque nervosus, neque  
30 musculosus est, vulnus id adurendum est.  
Si uri non potest, sanguinem homini mit-  
ti non alienum est. Tum usto quidem vul-  
neri superimponenda, quæ cæteris ustis  
sunt. Ei vero, quod expertum ignem non

V 2

est,

\* Dom. Panarolus Pentec. 11. Obl. 32. h Seren.  
Samm. XLV. i Æginet. V, 2. k Æginet. V, 3.  
A. Actuar. M. M. VI, 11.

308 A. CORN. CELSI Lib. 5.  
est, ea medicamenta, que vehementer exe-  
dunt. Post quæ nullo novo magisterio, sed  
jam supraposito vulnus erit implendum, &  
ad sanitatem perducendum. Quidam post  
rabiosi canis morsum protinus in balneum 5  
mittunt; cumque ibi patiuntur desudare,  
dum vires corporis sinunt, vulnere aperto;  
quo magis ex eo quoque virus distillet: de-  
inde multo meracoque vino excipiunt.  
quod omnibus venenis contrarium est. Id- 10  
que cum ita per triduum factum est, tutus  
esse homo à periculo putatur.

Solet autem ex eo vulnere, ubi parum  
occursum est, aquæ timor nasci. *ὕδροφοβία*  
Græci adpellant. Miserrimum genus mor- 15  
bi: in quo simul æger & siti & aquæ metu  
cruciat. quo oppressis in angusto spes est.  
Sed unicum tamen remedium est, nec opi-  
nantem in piscinam non ante ei provisam  
projicere, &, si natandi scientiam non ha- 20  
bet, modo mersum bibere pati, modo at-  
tollere; si habet, interdum deprimere, ut  
invitus quoque aqua satietur. sic enim si-  
mul & sitis, & aquæ metus tollitur. Sed  
aliud periculum excipit, ne infirmum cor- 25  
pus in aqua frigida vexatum, nervorum  
distentio absumat. Id ne incidat, à piscina  
protinus in oleum calidum demittendus  
est. Antidotum <sup>m</sup> autem (præcipue id, quod  
275. primo loco posui; ubi id non est, aliud) si 30  
nondum æger aquam horret, potui ex aqua  
dandum est: &, si amaritudine offenditur,  
mel adjiciendum est: at, si jam is morbus  
occupavit, per catapotia sumi potest.

### 3. CURA-

I Cassii Problem. 73. in Scribon. Larg. c. XLIII. c. 171.



3. *Curationes communes adversus omnes  
morsus serpentium.* n

Serpentium quoque morsus non ni-  
miam distantem curationem desiderant:  
5 quamvis in ea multum antiqui variarunt;  
adeo ut in singula anguium genera singu-  
la medendi præciperent; aliique alia. sed  
in omnibus eadem maxime proficiunt. Igi-  
tur in primis supra vulnus id membrum  
10 deligandum est: non tamen nimium vehe-  
menter, ne torpeat. Dein venenum extra-  
hendum est. Id cucurbitula optime facit.  
Neque alienum est, ante scalpello circa vul-  
nus incidere, quo plus vitiati jam sangui-  
15 nis extrahatur. Si cucurbitula non est,  
(quod tamen vix incidere potest) tum  
quodlibet simile vas, quod idem possit. Si  
ne id quidem est, homo o adhibendus est,  
qui vulnus exfugat.  
20 Neque hercule scientiam præcipuam  
habent hi, qui \*Pfylli nominantur; sed au-  
daciam usu ipso confirmatam. Nam vene-  
num serpentis, ut quædam etiam venato-  
ria venena, quibus Galli præcipue utuntur,  
25 non gustu, sed in vulnere nocent. Ideoque  
colubra ipsa tuto estur: ictus ejus occidit. &  
si stupente ea (quod per quædam medica-  
menta circulatores faciunt) in os digitum  
quis indidit, neque percussus est, nulla in  
30 ejus saliva noxa est. Ergo quisquis, exem-  
plum Pfylli secutus, id vulnus exuxerit, &  
ipse tutus erit, & tutum hominem præsta-  
bit. Illud interea ante debet attendere,  
ne quod in gingivis, palatove, aliave par-

V 3 te

n Aëtii Tetrab. IV. Serm. 1. c. 1. 2. & seqq. v. Ægi-  
net. V. 2. Actuar. M. M. VI, 11. \*Vocantur alio nomi-  
ne *Marfi*, Vide Reinel. Variar. Lect. 1. c. 8. p. 26.

te oris ulcus habeat. Post hæc is homo loco calido collocandus est, sic, ut id, quod percussum erit, in inferiorem partem inclinetur.

Si neque qui exsugatur, neque cucurbitula est, forbere oportet jus anserinum, vel vitulinum, & vomere. Vivum autem gallinaceum pullum per medium dividere, & protinus calidum super vulnus imponere sic, ut pars interior corpori jungatur. Facit id etiam hædus agnusve discissus, & calida ejus caro statim super vulnus imposita. Emplastra quoque, quæ supra comprehensa sunt. Aptissimumque est, vel Ephesium, vel id quod ei subjectum est. Præsensque in aliquo antidoto præsidium est. Sin id non est, necessarium est exforbere portionem meri vini cum pipere, vel quidlibet aliud, quod calori movendo est, nec humorem intus coire patitur. nam maxima pars venenorum frigore interimit. Omnia etiam urinam moventia, quia materiam extenuant, utilia sunt.

4. *Speciales curationes adversus ictus serpentium:*

& primò adversus ictum Aspidis. p

Hæc adversus omnes ictus utilia sunt, communiaque: usus tamen ipse docuit, eum, quem \* Aspis percussit, acetum potius bibere debere. Quod demonstrasse dicitur casus cujusdam pueri, qui cum ab hac ictus esset, & partim ob ipsum vulnus, partim ob immodicos æstus siti premeretur, ac locis siccis alium humorem non reperiret, acetum, quod forte secum habebat, ebibit, & libera-

p Æginet. V, 18. Aëtius Tetrab. IV. Serm. I, 20.  
\* De Aspide videatur Ammian. Marcellin. L. XXII. Cap. 15. pag. 338. Ejus morsum sanari posse negat Ælian. de Animal. I. Cap. 54.

liberatus est. Credo quoniam id, quamvis refrigerandi vim habet, habet tamen & dissipandi. Quo fit, ut terra resperfa eo spumet. Eadem ergo vi verisimile est spissescentem quoque intus humorem hominis ab eo discuti, & sic dari sanitatem.

5. *Adversus ictum Scorpionis.* q

In quibusdam etiam aliis serpentibus certa quædam auxilia satis nota sunt. Nam scorpio ipse sibi pulcherrimum medicamentum est. Quidam contritum cum vino bibunt. Quidam eodem modo contritum super vulnus imponunt. Quidam super prunas eo imposito, vulnus suffumigant, undique veste circumdata, ne is fumus dilabatur; tum carbonem ejus super vulnus deligant. Bibere autem oportet herbæ solaris (quam ἡλιοτρόπιον Græci vocant) semen, vel certe folia ex vino. Super vulnus vero etiam furfures ex aceto, vel ruta silvatica recte imponitur, vel cum melle sal tostus. Cognovi tamen medicos, qui ab scorpione ictis nihil aliud, quam ex brachio sanguinem miserunt.

25 6. *Adversus Aranei & Scorpionis ictum.*

Ad scorpionis etiam, & ad aranei ictum, allium cum ruta recte miscetur, ex oleoque contritum superimponitur.

30 7. *Adversus\* Ceraſtis, & Dipsadis, & Hæmorrhoidis ictum.* s

At, si cerasites, aut dipsas, aut hæmorrhoids percussit, asphodeli, quod Ægyptiæ fabæ magnitudinem æquet, arefactum, in

V 4 duas

q Aëtius Tetrab. IV. Serm. I, 19. r Aëtius Tetrab. IV. Serm. I, 16. Ex eo mors, Dom. Panarolus Pentec. 1. Obs. 45. \* Describitur ab Ælian. de Animal. 1. c. 57. s Aëtius Tetrab. IV. Serm. I, 22. 23.

duas potiones dividendum est sic, ut ei rutæ paululum adjiciatur. Trifolium quoque & mentastrum, & cum aceto panaces æque proficiunt. Costumque, & cassia, & cinnamomum recte per potionem assumuntur. 5

8. *Adversus Chersydri t ictum, & Cerastis.*

Adversus Chersydri vero ictum, panaces, aut laser, quod sit scrupulorum p. 11. \*. vel porri succus cum hemina vini sumendus est, & edenda multa satureia. Imponendum autem super vulnus stercus caprinum ex aceto coctum; aut ex eodem hordeacea farina; aut ruta, vel nepeta, cum sale contrita, melle adjecto. Quod in eo quoque vulnere, quod cerastes fecit, æque valet. 15

9. *Adversus Phalangii ictum.* u

Ubi vero phalangium \* nocuit, præter eam curationem, quæ manu editur, sæpe homo demittendus in solium est, dandusque ei myrrhæ & uvæ taminix par modus 20 ex passi hemina; vel radiculæ semen, aut lolii radix ex vino; & super vulnus furfures ex aceto cocti, imperandumque, ut is conquiescat.

10. *Adversus ictus Italorum anguium, qui minus terribiles peregrinis sunt.* 25

Verum hæc genera serpentium & peregrina, & aliquanto magis pestifera sunt; maxime, quæ æstuosis gignuntur locis. Italia frigidioresque regiones hac quoque parte 30 salubritatem habent, quod minus terribiles angues edunt. Adversus quos satis proficit herba betonica, vel cantabrica, vel centaurion, vel agrimonia, vel trixago, vel

t Aëtius Tetrab. IV. Serm. I, 35. u Aëtius Tetrab. IV. Serm. I, 18. \* Salmasius in Notis ad Spartiani Hadrian. C. 20, pag. 190. Ed. Hackian.

vel personata, vel marinæ pastinacæ; si vel singulæ binæve tritæ, & sic potui datæ sunt cum vino, & super vulnus impositæ.

Illud ignorare non oportet, omnis serpentis ictum & jejuni & jejuno magis nocere. ideoque perniciosissimi sunt, cum incubant: utilissimumque est, ubi ex anguibus metus est, non ante progredi, quam quis aliquid assumpfit.

10 11. *Remedium generale adversus omnia venena, vel in cibo, vel in potione assumpta.*

Non tam facile his opitulari est, qui venenum, vel in cibo, vel in potione sum-  
pserunt. Primum, quia non protinus sen-  
15 tiunt, ut ab angue icti: ideo ne succurrere quidem statim sibi possunt. Deinde quia noxa non à cute, sed ab interioribus partibus incipit. Commodissimum est tamen, ubi primum sensit aliquis, protinus oleo  
20 multo epoto vomere. Deinde, ubi præcordia exhausta, bibere antidotum: si id non est, vel merum vinum.

12. *Specialia remedia adversus quedam venena:*

*& primo adversus Cantharidas. a*

25 Sunt tamen quedam remedia propria adversus quedam venena, maximeque leviora. Nam si cantharidas aliquis ebibit, panaces cum lacte contusa, vel galbanum vino adjecto dari, vel lac per se debet.

30 13. *Adversus Cicutam. b*

Si cicutam, vinum merum calidum cum ruta quamplurimum ingerendum est; deinde is vomere cogendus: posteaque laser ex vino dandum. Isque, si febre vacat, in

V 5 cali-

a Æginet. V, 30. Scribon. Larg. LVII. Actuar. M. M. V, 12. b Æginet. V, 41. Scribon. Larg. XLVII. Actuar. M. M. V, 12.



314 A. CORN. CELSI Lib. 5.  
calidum balneum mittendus: si non vacat,  
ungendus ex calefacientibus est. Post quæ  
quies ei necessaria est.

14. *Adversus Hyoscyamum.* z

Si hyoscyamum, fervens mulsum bi-  
bendum est, aut quodlibet lac, maxime  
tamen asininum.

15. *Adversus Cerussam.* a

Si cerussam, jus malvæ, vel juglandis  
ex vino contritæ, maxime profunt. 10

16. *Adversus Sanguisugam, si epota est,*  
& lac, quod intus coit. b

Si sanguisuga epota est, acetum cum sa-  
le bibendum est. Si lac intus coit, aut pas-  
sum, aut cum aceto laser. 15

17. *Adversus Fungos inutiles.* c

Si fungos inutiles quis assumpsit, radi-  
cula aut eposca, aut cum sale & aceto eden-  
da est. Ipsi vero hi & specie quidem dif-  
cerni possunt ab utilibus, & cocturæ gene- 20  
re idonei \* fieri. Nam si ex oleo inferbue-  
runt, si piri furculus cum his inferbuit,  
omni noxa vacant.

18. *De adustis corporis locis, & quomodo*  
*curare debeant* d 25

Adustis quoque locis extrinsecus vis in-  
fertur; itaque sequi videtur, ut de his di-  
eam. Hæc autem optime curantur foliis  
aut lilii, aut linguæ caninæ, aut betæ in vi-  
no oleoque decoctis. Quorum quodlibet 30  
protinus impositum ad sanitatem perducit.

Sed dividi quoque curatio potest in ea,  
quæ mediocriter exedentia reprimentia-  
que,

z. Æginet. V, 38. a Scribon. Larg. XLVII. b Æ-  
ginet. V, 36. Plin. H. N. XXII, 23. c Æginet. V, 54.  
Scrib. Larg. LXVI. d Ægin. IV, 11, Seren. Samm. LX,  
Aëtius Tetrab. IV. Serm. II, 64. \* Alii sunt.

que, primo & pustulas prohibeant, & summam pelliculam exasperent: deinde ea, quæ lenia ad sanitatem perducant. Ex prioribus est lenticulæ cum melle farina: 5 vel myrrha cum vino; vel creta cimolia cum thuris cortice contrita, & aqua coacta, atque, ubi usus necessitas incidit, aceto diluta. Ex insequentibus, quælibet *λεπτοραί*. 267. Sed idonea maxime est, quæ vel plumbi 10 recrementum, vel vitellos habet.

Est etiam illa adustorum curatio, dum inflammatio est, impositam habere cum melle lenticulam: ubi ea declinavit, farinam cum ruta, vel porro, vel marrubio, 15 donec crustæ cadant: tum ervum cum melle, aut irim, aut resinam terebinthinam, donec ulcus purum sit: novissime siccum linamentum.

20 CAP. XXVIII.

*De interioribus ulceribus, quæ, aliqua corporum parte corrupta, nascuntur.*

1. *De carbunculo. e*

25 **A**B his, quæ extrinsecus incidunt, ad ea veniendum est, quæ interius, corrupta aliqua corporum parte, nascuntur. Ex quibus non aliud carbunculo pejus. Ejus hæ notæ sunt. Rubor est, superque eum non nimium pustulæ eminent, 30 maxime nigræ, interdum sublividæ, aut pallidæ. In iis sanies esse videtur; infra color niger est. Ipsum corpus aridum, & durius, quam naturaliter oportet. Circaque quasi crusta est; eaque inflammatione cingitur.

e Æginet. IV, 25. Aëtuar. M. M. II, 12. Oribaf. Synops. VII, 12.

gitur. Neque in eo loco levari cutis potest, sed inferiori carni quasi affixa est. Somnus urget. Nonnunquam horror, aut febris oritur, aut utrunque. Idque vitium subteractis quasi quibusdam radicibus serpit; interdum celerius, interdum tardius. Supra quoque, procedens inalbescit; dein lividum fit; circumque exiguae pustulae oriuntur. Et si circa stomachum faucesve incidit, subito spiritum saepe elidit. 10

Nihil melius est, quam protinus adurere. Neque id grave est. nam non sentit; quoniam ea caro mortua est. Finisque adurendi est, dum ex omni parte sensus doloris est. Tum deinde ulcus, sicut caetera 15 adusta, curandum est. Sequitur enim sub medicamentis erodentibus crusta: quae undique à viva carne diducta, trahit secum, quicquid corruptum erat; purusque jam sinus curari potest implentibus. At, si in sum- 20 ma cute vitium est, possunt succurrere quaedam vel exedentia tantum, vel etiam adurentia. Vis pro magnitudine abhibenda est. Quodcunque vero medicamentum impositum est, si satis proficiet, protinus à 25 viva corruptam partem resolvit.

Certaque esse fiducia potest fere, si undique vitiosa caro excidat, qua hujuscemodi medicamen exest: si id non fit, medicamentumque malo vincitur, utique ad 30 unctionem properandum est. Sed in ejusmodi casu abstinendum à cibo, à vino est. Aquam liberaliter bibere expedit. Magisque ea servanda sunt, si febricula quoque accessit. 2. De

## 2. De Carcinomate.

Non idem periculum *καρκίνωμα* affert, nisi imprudentia curantis agitatum est. Id vitium fit maxime in superioribus partibus, f circa f faciem, nares, aures, labra, g mammæ foeminarum. Et ex jecore, aut splene hoc nascitur. Circa locum aliqua quasi puncta sentiuntur: isque immobilis, inæqualiter tumet: interdum etiam torpet. Circa eum inflatæ venæ quasi recurvantur: hæque pallent, aut livent: nonnunquam etiam in quibusdam delitescunt. Tactusque is locus, aliis dolorem affert, in aliis eum non habet. Et nonnunquam sine ulcere durior aut mollior est, quam esse naturaliter debet: nonnunquam iisdem omnibus ulcus accedit. Interdumque nullam habet proprietatem: interdum simile his est, quæ vocant Græci *κονδυλώματα*, aspredine quadam & magnitudine sua. Colorque ejus ruber est, aut lenticulæ similis. Neque tuto secatur. nam protinus aut resolutio nervorum, aut distentio insequitur. Sæpe homo ictus obmutescit, atque ejus anima deficit. Quibusdam etiam, si id ipsum pressum est, quæ circa sunt, intenduntur & intumescunt. Namque pessimum id genus est, fereque primum id fit; quod *κακόνθηδες* à Græcis nominatur. Deinde ex eo id *καρκίνωμα*, quod sine ulcere est. Deinde ulcus; & ex eo, thymiūm.

Tolli nihil, nisi *κακόνθηδες*, potest: reliqua curationibus irritantur. Et quo major vis adhibita est, eo magis quidam usi sunt medicamentis adurentibus. Quidam ferro ad-

adufferunt : quidam scalpello exciderunt. neque ulli unquam medicina \* profuit : sed adusta, protinus concitata sunt, & increverunt, donec occiderent. Excisa etiam, post inductam cicatricem, tamen reverterunt, & causam mortis attulerunt. Cum interim plerique nullam vim adhibendo, qua tollere id malum tentent; sed imponendo tantum lenia medicamenta, quæ quasi blandiantur, quo minus ad ultimam senectutem perveniant, non prohibeantur. Discernere autem cacoethes, quod curationem recipit, à carcinomate, quod non recipit, nemo scire potest, nisi tempore & experimento.

Ergo, ubi primum id vitium notatum est, imponi debent medicamenta adurentia. Si levatur malum, minuunturque ejus indicia, procedere curatio potest & ad scalpellum, & ad ustionem. Si protinus irritatum est, scire licet, jam carcinoma esse; removendaque sunt omnia acria, omnia vehementia. Sed, si sine ulcere is locus durus est, imponi ficum quam pinguiissimam, aut *ῥοπαῖδες* emplastrum satis est. Si ulcus æquale est, ceratum ex rosa injiciendum est, adjiciendusque ei pulvis ex contrita testa, ex aqua, qua faber ferrarius tingere candens ferrum solitus est. Si id nimium supercrevit, tentanda squama æris est (quæ lenissima ex adurentibus est) eatenus, ne quid eminere patiatur : sed ita, si nihil exacerbavit : sin minus, eodem cerato contenti esse debemus.

264,  
14.

3. De

\* Aphor. VI, 38.



## 3. De Theriomate.

Est etiam ulcus, quod *θνησίωμα* Græci  
 vocant. Id & per se nascitur, & interdum  
 ulceri ex alia causa facto supervenit. Co-  
 5 lor est vel lividus, vel niger: odor fœ-  
 dus: multus, & muco similis humor. Idi-  
 psum ulcus neque tactum, neque medica-  
 mentum sentit: prurigine tantum move-  
 tur. circa dolor est, & inflammatio. Inter-  
 10 dum etiam febris oritur. Nonnunquam ex  
 ulcere sanguis erumpit. Atque id quoque  
 malum serpit. quo omnia sæpe intendun-  
 tur. Fitque ex his ulcus, quod *ἑρπηθαι ἐσθίο-*  
*μαρον* Græci vocant; quia celeriter serpen-  
 15 do, penetrandoque usque ad ossa, corpus  
 vorat. Id ulcus inæquale est, cœno simile;  
 inestque multus humor glutinosus; odor  
 intolerabilis; majorque, quam pro modo  
 ulceris, inflammatio. Utrumque, sicut om-  
 20 nis cancer, fit maxime in senibus; vel his,  
 quorum corpora mali habitus sunt. 167, 18.

Curatio utriusque eadem est: sed in ma-  
 jore malo major vis necessaria. Ac pri- 84, 9.  
 mum, à victus ratione ordinandum est: ut  
 25 quiescat in lectulo: ut primis diebus à cibo  
 abstineat: aquam quamplurimam assumat.  
 Alvus quoque ei ducatur. Dein, post in-  
 flammationem, cibum boni succi capiat;  
 vitatis omnibus acribus: potionis quan-  
 30 tum volet, sic, ut interdum quidem aqua  
 contentus sit: in cœna vero etiam vini au-  
 steri aliquid bibat. Non æque tamen fame  
 in his, quos *ἑρπης* urget, atque in his, qui  
*θνησίωμα* adhuc habebunt, utendum erit.  
 Et

Et victus quidem talis necessarius est.

Super ulcus vero inspergenda est arida aloe contrita, &, si parum proficiet, chalcitis. At, si quis nervus, exesa carne, nudatus est, contegendus ante linteolo est, ne sub eo medicamento aduratur. Si validioribus etiam remediis opus est, ad eas compositiones veniendum est, quæ vehementius adurunt. Quicquid autem inspergitur, averso specillo infundi debet. Superdanda cum melle sunt vel linamenta, vel oleæ folia ex vino decocta, vel marrubium: eaque linteolo contegenda in aqua frigida madefacto, dein bene expresso. Circaque, quæ tumor ex inflammatione est, imponenda, quæ reprimant, cataplasmata. Si sub his nihil proficitur, ferro locus aduri debet; diligenter nervis, qui apparent, ante contactis. Adustum vel medicamentis vel ferro corpus, primum purgandum, deinde implendum esse, apparere cuilibet ex prioribus potest.

#### 4. De Sacro igne. i

Sacer quoque ignis malis ulceribus annumerari debet. Ejus duæ species sunt. Alterum est subrubicundum, aut mistum rubore atque pallore; exasperatumque per pustulas continuas, quarum nulla altera major est, sed plurimæ perexiguæ. In his semper fere pus, & sæpe rubor cum calore est: serpitque id nonnunquam sanescente eo, quod primum vitiatum est: nonnunquam etiam exulcerato, ubi, ruptis pustulis, ulcus continuatur, humorque exit, qui esse inter

i Æginet IV, 12. Seren. Sammon. XLI, Aëtius Te-  
trab. IV. Serm. II, 59.

ter saniem & pus videri potest. Fit maxime in pectore, aut lateribus, aut eminentibus partibus, præcipueque in plantis. Alterum autem est in summæ cutis exulceratione, sed sine altitudine, latum, sublividum, inæqualiter tamen; mediumque sanescit, extremis procedentibus: ac sæpe id, quod jam sanum videbatur, iterum exulceratur. At circa, proxima cutis, quæ vitium receptura est, tumidior & durior est, coloremque habet ex rubro subnigrum. Atque hoc quoque malo fere corpora seniora tentantur, aut quæ mali habitus sunt; sed in cruribus maxime.

15 Omnis autem facer ignis, ut minimum periculum habet ex his, quæ serpunt; sic prope difficillime tollitur. Medicamentum ejus \*fortissimum est, uno die febris, quæ humorem noxium absumat. Pus, quo cras-

20 sius & albidius est, eo periculi minus est. 33. Prodest etiam infra ulcera locum cædi, quo plus puris exeat; & id, quo ibi corruptum corpus est, extrahatur. Sed tamen, si febricula accessit, abstinencia, lectulo, alvi ductione opus est. In omni vero sacro igni, neque lenibus & glutinosis cibis, neque salis & acribus utendum est; sed his, quæ inter utrumque sunt: qualis est panis sine fermento, piscis, hœdus, aves, exceptoque apro, omnis fere venatio. Si non est febricula, & gestatio utilis est, & ambulatio, & vinum austerum, & balneum. Atque in hoc quoque genere potio magis liberalis esse, quam cibus, debet.

X

Ipsa

\* Edit. Aldi, Steph. aliisque fortuitum.

Ipsa autem ulcera, si mediocriter ser-  
 punt, aqua calida: si vehementius, vino  
 calido fovenda sunt. Deinde acu pustulæ,  
 quæcumque sunt, aperiendæ. Tum impo-  
 nenda ea, quæ putrem carnem exedant. 5  
 Ubi inflammatio sublata, ulcusque purga-  
 tum est, imponi lene medicamentum de-  
 bet. In altero autem genere, possunt pro-  
 ficere mala cotonea in vino cocta, atque  
 273. contrita: potest emplastrum vel Heræ, vel 10  
 262. τετραφάρμακον; cui quinta pars thuris  
 adjecta sit; potest nigra hedera ex vino au-  
 stero cocta, ac, si celeriter malum serpit,  
 non aliud magis proficit. Purgato ulcere,  
 quod in summa cute esse proposui, fatis ad 15  
 sanitatem eadem lenia medicamenta pro-  
 ficiunt.

5. De Chironio ulcere. k

Chironium autem ulcus appellatur,  
 quod & magnum est, & habet\* oras duras, 20  
 callosas, tumentes. Exit sanies non multa,  
 sed tenuis: odor malus. neque in ulcere,  
 neque in ejus tumore ulla est inflammatio:  
 dolor modicus est. Nihil serpit, ideoque  
 nullum periculum adfert; sed non facile 25  
 sanescit. Interdum tenuis cicatrix induci-  
 tur, deinde iterum rumpitur, ulcusque  
 renovatur. Fit maxime in pedibus & cru-  
 ribus.

Super id imponi debet, quod & lene ali- 30  
 quid, & vehemens, & reprimens habeat.  
 Quale ejus rei causa fit ex his: squamæ  
 æris, plumbi eloti combusti, singulorum  
 P. VI. \*. cadmiæ, ceræ, singulorum P. VIII.  
 \*. rosæ

k Ægin. IV, 46. \*Pollux IV. c. 25.

\*. rosæ quantum satis est ad ceram simul cum eis molliendam.

6. De Ulceribus, quæ ex frigore in pedibus & manibus oriuntur.

5 Fiunt etiam ex frigore hiberno 1 ulcera, maxime in pueris, & præcipue pedibus, digitisque eorum, nonnunquam etiam in manibus. Rubor cum inflammatione mediocri est. Interdum pustulæ oriuntur, de-  
10 inde exulceratio. Dolor autem modicus: prurigo major est. Nonnunquam humor exit, sed non multus; qui referre vel pus, vel saniem videtur.

In primis multa calida aqua fovendum  
15 est, in qua rapa decocta; aut si ea non sunt, aliquæ verbenæ ex reprimentibus. Si nondum adaperatum ulcus est, æs, quam maxime calidum quis pati potest, admovendum est. Si jam exulceratio est, imponi debet alu-  
20 men, æqua portione cum thure contritum, tum vino adjecto; aut malicorium in aqua coctum, deinde contritum. Si summa detracta pellicula est, hic quoque melius lenia medicamenta proficiunt.

25 7. De Struma. m

Struma quoque est tumor, in quo subter concreta quædam ex pure & sanguine quasi glandulæ oriuntur. Quæ vel præcipue fatigare medicos solent, quoniam & febres  
30 movent, nec unquam facile maturescunt; &, sive ferro, sive medicamentis curantur, plerunque iterum juxta cicatrices ipsas resurgunt; multoque post medicamenta sæpius. quibus id quoque accedit, quod  
X 2 longo

1 Æginet. III, 79. m Aëtius Tetrab. IV. Serm. III. c. 5. Actuarius. Meth. Med. II. 12. Ægin. IV, 33. Oribas. Synops. VII, 29.



324 A. CORN. CELSI Lib. 5:  
longo spatio detinent. Nascuntur maxime  
in cervice; sed etiam in alis, & inguinibus,  
& in lateribus. In mammis quoque foemi-  
narum se reperisse, chirurgus Meges au-  
thor est. 5

Propter hæc & album veratrum recte  
datur, atque etiam sæpius, donec ea dige-  
rantur. Et medicamenta imponuntur, quæ  
humorem vel educant, vel dissipent; quo-  
rum supra mentio facta est. Adurentibus 10  
quoque quidam utuntur, quæ exedunt,  
crustaque eum locum adstringunt: tum  
vero ut ulcus curant. Quæcunque autem  
ratio curandi est, corpus, puro ulcere,  
exercendum atque alendum est, donec ad 15  
cicatricem perveniat. Quæ cum medici  
doceant, ab iis requirenda. Quorundam  
rusticorum experimento cognitum, quem  
struma male habet, eum, si anguem edit, li-  
berari. 20

### 8. De Furunculo. n

Furunculus vero, est tuberculum acutum  
cum \*inflammatione, & dolore; maximeque  
ubi jam in pus vergit. Qui ubi adaper-  
tus est, & exiit pus, subter apparet pars carnis in 25  
pus versa, pars corrupta subalbida, subrubra;  
quem ventriculum quidam furunculi no-  
minant. In eo nullum periculum est, etiam-  
si nulla curatio adhibeatur: maturescit enim  
per se, atque erumpit. Sed dolor efficit, ut 30  
potior medicina sit, quæ maturius liberet.

Proprium ejus medicamentum galba-  
num est. sed alia quoque supra compre-  
hensa sunt. Si cætera defunt, imponi debet,  
pri-

n *Æginet. IV, 23. Seren. Sammon. XXXVIII.*  
\*Edit. Aldi & aliæ *inflatione.*

primum, non pingue emplastrum, ut id reprimat: deinde, si non repressit, quodlibet puri movendo accommodatum. si ne id quidem est, vel resina, vel fermentum.  
f Expressio pure, nulla ultra curatio necessaria est.

9. De Phymate. 396,

Phyma vero nominatur tuberculum furunculo simile, sed rotundius & planius, 20.  
10 sæpe etiam majus. Nam furunculus ovi dimidii magnitudinem raro explet, nunquam excedit. Phyma etiam latius patere confuevit: sed inflammatio dolorque sub eo minores sunt. Ubi divulgum est, pus eodem  
15 modo apparet: ventriculus qui in furunculo, non invenitur: verum omnis corrupta caro in pus vertitur. Id autem in pueris & sæpius nascitur, & facilius tollitur: in juvenibus rarius oritur, & difficilius curatur.  
20 Ubi ætas induravit, ne nascitur quidem. Quibus vero medicamentis discutere-  
retur, supra propositum est. 258,

10. De Phygethlo. k 19.

φύγεθλον autem est tumor, non altus, sed  
25 latus, in quo quiddam pustulæ simile est. Dolor distentioque vehemens est, & major quam pro magnitudine tumoris: interdum etiam febricula. idque tarde maturescit, neque magnopere in pus convertitur. Fit  
30 maxime aut in cervice, aut in alis, aut in inguinibus. Panum, ad similitudinem figuræ, nostri vocant. Atque idipsum quo medicamento tolleretur, supra demon- 255.  
stravi.

## II. De Abscessibus. 1

Sed cum omnes hi nihil nisi minuti abscessus sint, generale nomen trahit latius vitium, totum ad suppurationem spectans. Idque fere fit aut post febres, aut post dolores partis alicujus, maximeque eos, qui ventrem infestarunt. Sæpiusque oculis expositum est, siquidem latius aliquando intumescit ad similitudinem ejus, quod *φύμα* vocari proposui, rubetque cum calore, & paulo post etiam cum duritia, magisque nocenter adolescit, & sitim vigiliamque exprimit. Interdum tamen nihil horum in cute deprehendi potest; maximeque, ubi altius pus movetur: sed cum siti vigiliaque sentiuntur intus aliquæ punctiones. Et, quod de subito durius non est, melius est: & quod, quamvis rubet, coloris tamen in album mutati est. quæ signa jam pure oriente nascuntur: tumor enim ruborque multo ante incipiunt.

Sed, si locus nobilis est, avertendus materiæ aditus est per cataplasmata, quæ simul & reprimunt, & refrigerant: qualia & alias & paulo ante in erysipelate proposui. Si jam durior est, ad ea veniendum est, quæ digerant, & resolvant: qualis est ficus arida contusa: aut fex mista cum cerato, quod ex adipe suilla coactum sit; aut cucumeris silvestris radix, cui ex farina duæ partes adjectæ sint, ante ex mulso decoctæ. Licet etiam miscere æquis portionibus ammoniacum, galbanum, propolim, viscum, pondusque adjicere myrrhæ dimidio minus,

1 Æginet. IV, 18. Aetius Tetrab. IV. Serm. II, 32. Oribas. Synops. VII, 28.

nus, quam in prioribus singulis erit. Atque emplastra quoque & malagmata idem efficiunt, quæ supra explicui.

Quod per hæc discussum non est, necesse est, maturescat. Idque quo celerius fiat, imponenda est farina ordeacea, ex aqua cocta, cui & olerum aliquid recte miscetur. Eadem aut hæc in minoribus quoque abscessibus, quorum nomina proprietatesque supra edidi, recte fiunt. Eademque omnium curatio: tantummodo distat. Crudum est autem, in quo major quasi venarum motus est, & gravitas, & ardor, & distentio, & dolor, & rubor, & durities; & si major abscessus est, horror, atque etiam febricula permanet; penitiusque condita suppuratione pro his, quæ alioqui cutis ostendit, punctiones sunt. Ubi ista se remiserunt, jamque is locus prurit, & aut sublividus, aut subalbidus est, matura suppuratio est. Ex qua, ubi vel per se, vel per medicamenta, vel etiam ferro aperta est, pus debet emitti. Tum, si qua in alis, vel in quinibus sunt, sine linamento nutrienda sunt. In cæteris quoque partibus, si ima plaga exigua est, si mediocris suppuratio fuit, si non alte penetravit, si febris non est, si valet corpus, æque linamenta supervacua sunt. In reliquis, parce tamen, nec, nisi magna plaga est, imponi debent. Commode vero mel super linamenta, vel sine his imponitur lenticula ex melle, aut mallicorium ex vino coctum. quæ & per se & mista idonea sunt.

Si qua circa duriora sunt, ad ea mollienda, vel malva contrita, vel foeni Græci linive semen ex passo coctum superdandum est. Quicquid deinde impositum est, non adstringi, sed modice deligari debet. Illo neminem decipi decet, ut in hoc genere cerato utatur. Cætera, quæ pertinent ad purgandum ulcus, ad implendum, ad cicatricem inducendam, conveniuntque vulneribus, exposita sunt.

10

412.

413.

## 12. De Fistulis. m

Nonnunquam autem ex ejusmodi abscessibus, & ex aliis ulcerum generibus, fistulæ oriuntur. Id nomen est ulceri alto, angusto, calloso. Fit in omni fere parte corporis: habetque quædam in singulis locis propria. Prius de communibus dicam. Genera igitur fistularum plura sunt. siquidem aliæ breves sunt, aliæ altius penetrant: aliæ recta intus feruntur, aliæ multoque plures transversæ: aliæ simplices sunt, aliæ duplices triplicesve; quæ ab uno ore oris intus tres fiunt, aut etiam in plures sinus dividuntur: aliæ rectæ, aliæ flexæ, & tortuosæ sunt: aliæ intra carnem desinunt, aliæ ad ossa aut cartilaginem penetrant; aut, ubi neutrum horum subest, ad interiora perveniunt: aliæ deinde facile, aliæ cum difficultate curantur, atque etiam quædam insanabiles reperiuntur.

30

Expedita curatio est in fistula simplici, recenti, intra \*carnem. Adjuvatque ipsam corpus, si juvenile, si firmum est. Inimica contraria his sunt: itemque, si fistula os, vel

m Aëtius Tetrab. IV. Serm. II, 55. \*Hippocr. Coac. Fran. III, 394.



vel cartilaginem, vel nervum, vel musculos læsit; si articulum occupavit; si vel ad vesicam, vel ad pulmonem, vel ad vulvam, vel ad grandes venas arteriasve, vel ad  
 5 maxillas, guttur, stomachum, thoracem penetravit. Ad intestina quoque eam tendere, semper periculosum, sæpe pestiferum est. Quibus multum mali accedit, si corpus vel ægrum, vel senile, vel mali habi-  
 10 tus est.

Ante omnia autem demitti specillum in fistulam convenit; ut, quo tendat, & quam alte perveniat, scire possimus. Simul etiam, prorsus humida, an ficcior sit: quod extra-  
 15 cto specillo patet. Id quoque dici potest, in osse vitium sit, necne: & si jam eo fistula penetravit, quatenus nocuerit. Nam, si molle est, quod ultimo specillo contingitur, intra carnem adhuc vitium est: si ma-  
 20 gis id renititur, ad os ventum est. Ibi deinde si dilabitur specillum, nondum caries est: si non dilabitur sede, qua innititur, caries quidem, verum adhuc levis est: si inæquale quoque & asperum subest, vehementius os exesum est. At cartilago ubi sub-  
 25 sit, ipsa sedes docet: perventumque esse ad eam, ex renifu patet.

Ex his quidem colliguntur fistularum sedes, spatia, noxæ. Simples vero hæ  
 30 sint, an in plures partes diducantur, cognosci potest ex modo puris. Cujus si plus fertur, quam quod simplici spacio convenit, plures sinus esse manifestum est. Cumque fere juxta sint caro, & nervus, & ali-  
 X 5 qua

qua nervosa, quales fere tunicæ membranæque sunt, genus quoque puris docebit, num plures sinus intus diversa corporis genera perferint. Siquidem ex carne pus læve, album copiosius fertur: at ex nervoso loco, coloris quidem ejusdem, sed tenuius & minus: ex nervo, pingue & oleo non dissimile. Denique etiam corporis inclinatio docet, num in plures partes fistulæ penetrarint, quia sæpe, cum quis aliter decubuit, aliterque membrum collocavit, pus ferri, quod jam defierat, iterum incipit; testaturque, non solum alium sinum esse, ex quo descendat, sed etiam in aliam corporis partem eum tendere. 15

Si in carne & recens & simplex est; ac neque sinuosa neque cava sede; neque in articulo, sed in eo membro, quod per se immobile, non nisi cum toto corpore movetur, satis proficiet emplastrum, quod recentibus vulneribus imponitur, dum habeat vel salem vel alumen, vel squamam æris, vel æruginem, vel ex metallicis aliquid. Exque eo collyrium fieri debet altera parte tenuius, altera paulo plenius. Idque 25 ea parte, qua tenuius est, antecedente demitti oportet in fistulam, donec purus sanguis se ostendat. quæ in omnibus fistularum collyriis perpetua sunt. Idem deinde emplastrum in linteolo superimponendum; supraque injicienda spongia est, in acetum ante demissa: solvique quinto die satis est. Genus victus adhibendum est, quo carnem ali docui. 30

At,

At, si longius à præcordiis fistula est, ex intervallo jejunum radículas esse, deinde vomere, necessarium est.

Quum vetustate callosa fit fistula (callus <sup>300, 9.</sup>  
 5 autem neminem fallit, quia durus est, & aut albus, aut pallidus) tum validioribus medicamentis opus est. Quale est, quod habet papaveris lachrymæ P. I. \*. gummi P. III. \*. cadmiæ P. IIII. \*. atramenti sutorii P. VIII. \*. ex quibus aqua coactis collyrium fit. Aut in quo sunt gallæ P. I. \*. æruginis, sandarachæ, aluminis Ægyptii singulorum P. I. \*. atramenti sutorii combusti P. II. \*. Aut quod constat ex chalcitide, & è saxo calce; quibus adjicitur auripigmenti dimidio minus, quàm in singulis prioribus est; eaque melle cocto excipiuntur. Expeditissimum autem est ex præcepto Megetis, n æruginis rasæ P. II. \*. contere, deinde ammoniaci thymiamatis P. II. \*. aceto liquare, eoque infuso æruginem cogere. Idque ex primis medicamentis est. Sed, ut hæc maximi effectus sunt, si cui ista non adsunt, facile tamen est callum qui-  
 25 buslibet adurentibus medicamentis erodere: satisque est vel papyrus intortum, vel aliquid ex penicillo in modum collyrii adstrictum eo illinere. Scilla quoque cocta & mixta cum calce, callum exest.

30 Si quando vero longior & transversa fistula est, demisso specillo, contra principium hujus incidi commodissimum est, & collyrium, \* quod volueris demitti.

At si duplicem esse fistulam vel multiplicem

n Oribas. Synopf. VII, 30. \* Edit. Aldi, Steph. utramque, alii legunt utrimque.

cem existimamus, sic tamen ut brevis, intraque carnem sit, collyrio uti non debemus; quod unam partem curet, reliquas omittat: sed eadem medicamenta arida in calamum scriptorium conjicienda sunt, isque ori fistulæ aptandus, inspirandumque, ut ea medicamenta intus compellantur. Aut eadem ex vino liquanda sunt; vel, si sordidior fistula est, ex mulso; si callosior, ex aceto; atque intus infundendum, quicquid inditum est. Superponenda sunt, quæ refrigerent & reprimant. nam fere, quæ circa fistulam sunt, habent aliquid inflammationis. Neque alienum est, ubi quis resolverit, antequam rursus alia medicamenta injiciat, per oricularium clysterem fistulam eluere; si plus puris fertur, vino; si callus durior est, aceto; si jam purgatur, mulso, vel aqua, in qua ervum coctum sit, sic ut huic quoque mellis paululum adjiciatur.

Fere vero fit, ut ea tunica, quæ inter foramen & integram carnem est, victa tot medicamentis exeat, infraque ulcus purum sit. Quod ubi contingit, imponenda glutinantia sunt; præcipueque spongia melle cocto illita. Neque ignoro, multis placuisse linamentum in modum collyrii compositum & tinctum melle, implendi causa demitti. sed celerius sic glutinantur, quam impletur. Neque verendum est, ne purum corpus puro corpori junctum non coeat, adjectis quoque medicamentis ad id efficacibus; cum sæpe exulceratio digitorum, nisi magna cura prospeximus, sanescendo in unum eos jungat.

13. De Ulceris genere, quod *κηρίον* nominatur.

Est etiam ulceris genus, quod à favi similitudine *κηρίον* o Græcis nominatur. Idque duas species habet. Alterum est subalbidum, & furunculo simile; sed majus, & cum magno dolore. Quod, ubi maturefcit, habet foramina; per quæ fertur humor glutinosus, & purulentus; nec tamen ad justam maturitatem pervenit. Si divisum est, 10 multo plus intus corrupti, quam in furunculo, apparet, altiusque descendit. Raro fit nisi in capillis.

Alterum est minus, & super caput eminent, durum, latum, subviride, subpallidum, magis exulceratum: siquidem ad 15 singulorum pilorum radices foramina sunt, per quæ fertur humor glutinosus, subpallidus, crassitudinem mellis, aut visci referens, interdum olei: &, si inciditur, viridis 20 intra caro apparet. Dolor autem, & inflammatio ingens est, adeo ut acutam quoque febrem movere consuerint.

Super id, quod minus crebris foraminibus exasperatum est, recte imponitur & ficus arida, & lini semen\* in mulso coctum, & emplastra ac malagmata materiam eductentia, aut quæ proprie huc pertinentia supra posui.

Super alterum, & eadem medicamenta, 30 & farina ex mulso cocta, sic ut ei dimidium refinæ terebinthinæ misceatur; & ficus in mulso decocta, cui paulum hyssopi contriti sit adjectum; & uvæ taminix pars quarta fico adjecta. Quod si parum in utrolibet genere

o Actuar. M. M. II, 12. & IV, 16. Aeginet. III, 3. Trallian, I, 9. \* Al. quod in vino.



genere medicamenta proficiunt, totum  
ulcus usque ad sanam carnem excidi oportet. Ulcere ablato, super plagam medicamenta danda sunt; primum, quæ pus citent; deinde, quæ purgent, tum, quæ impleant.

14. De *Acrochordone*, & *Thymio*,  
& *Myrmeciis*, & *Clavo*.

Sunt vero quædam verrucis p familia; quorum diversa nomina, ut vitia sunt. 10  
*Ἀκροχόρδονα* Græci vocant, ubi sub cute coit aliquid durius, & interdum paulo asperius, coloris ejusdem; infra ad cutem tenue, supra latius. Idque modicum est, quia raro fabæ magnitudinem excedit. Vix 15  
unum tantum eodem tempore nascitur; sed fere plura, maximeque pueris: eaque nonnunquam subito desinunt, nonnunquam mediocrem inflammationem excitant. sunt, quæ etiam in pus convertuntur. 20

*Ἀκροθύμιον* q nominatur, quod super corpus quali verrucula eminet, ad cutem latius, supra tenue, subdurum, & in summo perasperum. Id, qua summum, colorem floris thymi repræsentat; unde ei nomen est; 25  
ibique facile finditur, & cruentatur; nonnunquam aliquantum sanguinis fundit: fereque circa magnitudinem fabæ Ægyptiæ est, raro majus, interdum perexiguum. Modo autem unum, modo plura nascuntur, 30  
vel in palmis, vel in inferioribus pedum partibus: pessima tamen in obscœnis sunt; maximeque ibi sanguinem fundunt.

*Μυρμηκία* r autem vocantur humiliora  
thymio

p Æginet. IV, 15. VI, 87. q Aëtius Tetrab. IV. Serm. II, 3. Oribal. Synopf. VII, 39. r Actuar. M, M. II, 11. Oribal. Synopf. VII, 43.

thymio durioraque. quæ radices altius exigunt, majoremque dolorem movent, infra lata, supra autem tenuia, minus sanguinis mittunt: magnitudine vix unquam lupini modum excedunt. Nascuntur ea quoque aut in palmis aut in inferioribus partibus pedum.

Clavus s autem nonnunquam quidem etiam alibi, sed in pedibus tamen maxime nascitur, præcipue autem ex contuso, quamvis interdum aliter: doloremque, etiamsi non alias, tamen ingredienti movet.

Ex his Acrochordon & acrothymium sæpe etiam per se finiuntur, &, quo minora sunt, eo magis. Myrmecia & clavi sine curatione vix unquam desinunt. Acrochordon, si excisa est, nullam radiculam relinquit, ideoque ne renascitur quidem. Acrothymio clavoque excisis, subrotunda radícula nascitur, quæ penitus descendit ad carnem: eaque relicta, idem rursus exit. Myrmecia latissimis radicibus inhærent: ideoque ne excidi quidem sine magna exulceratione possunt. Clavum subinde radere, commodissimum est. nam sine ulla vi sic mollescit. at, si sanguinis quoque aliquid emissum est, sæpe emoritur. Tollitur etiam, si quis eum circumpurgat, deinde imponit refinam, cui miscuit pulveris paululum, quem ex lapide molari contrito fecit. Cætera vero genera medicamentis adurenda sunt. Aliisque id, quod ex fece vini: myrmeciis id, quod ex alumine & sandaracha fit, aptissimum

336 A. CORN. CELSI Lib. 5.  
simum est. Sed ea, quæ circa sunt, foliis  
contegi debent, ne ipsa quoque exulceren-  
tur: deinde postea lenticula imponi. Tol-  
lit acrothymium etiam ficus in aqua de-  
cocta.

15. De Pustularum generibus.

t At pustulæ maxime vernis temporibus  
oriuntur. Earum plura genera sunt. Nam  
modo circa totum corpus partemve aspre-  
do quædam fit, similis his pustulis, quæ 10  
ex urtica, vel ex sudore nascuntur: v ἐξαιθή-  
ματα Græci vocant. eæque modo rubent,  
modo colorem cutis non excedunt. Non-  
nunquam plures, similes varis oriuntur,  
nonnunquam majores. Pustulæ, lividæ, 15  
sunt, aut pallidæ, aut nigræ, aut aliter na-  
turali colore mutato: subestque illis hu-  
mor. Ubi hæ ruptæ sunt, infra quasi exul-  
cerata caro apparet. φλύκταιναι x ἐλκώδεις  
Græce nominantur. Fiunt vel ex frigore, 20  
vel ex igni, vel ex medicamentis.

Φλυζάκιον autem paulo durior pustula  
est, subalbida, acuta. ex qua ipsa quod ex-  
primitur, humidum est. Ex pustulis vero  
nonnunquam etiam ulcuscula fiunt, aut 25  
aridiora, aut humidiora: & modo tantum  
cum prurigine, modo etiam cum inflam-  
matione ac dolore, exitque aut pus, aut  
sanies, aut utrumque. Maximeque id eve-  
nit in ætate puerili: raro, in medio corpo- 30  
re: sæpe, in eminentibus partibus.

Pessima pustula est, quæ γ ἰπυυκτις voca-  
tur. Ea colore vel sublivida, vel subnigra,  
vel alba esse consuevit. Circa hanc autem  
vehe-

t Aphor. III, 20. v Actuar. M.M. II, 11. Trall. I, 5.  
x Actuar. M.M. VI, 8. y Actuar. M.M. II, 11. Oribas.  
Synopsis. VII, 37. 42.

vehemens inflammatio est; & cum aperta est, reperitur intus exulceratio mucosa, colore humori suo similis. Dolor ex ea supra magnitudinem ejus est: neque enim ea faba  
 5 major est. Atq; hæc quoq; oritur in eminentibus partibus, & fere noctu. unde nomen quoque à Græcis ei *ἰπυυκτις* est impositum.

In omni vero pustularum curatione primum est, multum ambulare, atque exerci:  
 10 ceri: si quid ista prohibet, gestari. Secundum est, cibum minuere: abstinere ab omnibus acribus & extenuantibus. eademque nutrices facere oportet, si lactens puer ita affectus est. Præter hæc, is, qui tam robu-  
 15 stus est, si pustulæ minutæ sunt, desudare in balneo debet; simulque super eas nitrum inspergere; oleoque vinum miscere, & sic ungi; tum descendere in solium. Si nihil sic proficitur, aut si majus pustularum ge-  
 20 nus occupavit, imponenda lenticula est; detractaque summa pellicula, ad medicamenta lenia transeundum. *Ἐπιυυκτις* post lenticulam, recte herba quoque sanguinali, vel viridi coriandro curatur.

25 Ulcera vero ex pustulis facta tollit spuma argenti cum semine foeni Græci mixta sic, ut his invicem rosa atque intubi succus adjiciatur, donec mellis crassitudo ei fiat. Proprie ad eas pustulas, quæ infantes  
 30 male habent, lapidis, quem *περίθω* Græci vocant, P. VIII. \*. cum quinquaginta amaribus nucibus miscetur, adjiciunturque olei cyathi tres. Sed prius ungi ex cerussa pustulæ debent, & tum hoc illini.

Y

16. De

Scabies vero est durities cutis rubicundior. ex qua pustulæ oriuntur, quædam humidiores, quædam sicciore. Exit ex quibusdam sanies; fitque ex his continuata exulceratio pruriens; serpitque in quibusdam cito. Atque in aliis quidem ex toto definit, in aliis vero certo tempore anni revertitur. Quo asperior est, quoque prurit magis, eo difficilius tollitur. Itaque eam, quæ talis est, *αίτη* Græci appellant, id est feram.

340.  
14.

In hac quoque victus ratio eadem, quæ supra, necessaria est. Medicamentum autem ad incipientem hanc idoneum est; quod fit ex spodii, croci, æruginis, singulorum p. i. \*. piperis albi, omphacii, singulorum p. i. \*. cadmiæ p. viii. \*. At, ubi jam exulceratio est, id, quod fit ex sulphuris p. i. \*. ceræ p. iv. \*. picis liquidæ hemina, olei sextariis duobus. quæ simul usque ad consistitudinem mellis incoquantur. Est etiam, quod ad Protarchum authorem refertur. Habet hoc farinæ lupinorum sextarium, nitri cyathos quatuor, picis liquidæ heminam, resinæ humidæ selibram, aceti cyathos tres. Crocum quoque, lyrium, ærugo, myrrha, cinis, æquis portionibus recte miscentur, & ex passo coquantur. Idque omnem utique scabiem sanat. Ac, si nihil aliud est, amurca ad tertiam partem decocta, vel sulphur picis liquidæ mistum, sicut de pecoribus proposui, hominibus quoque scabie laborantibus opitulatur.

355,  
16.

17. De



17. De Impetiginis speciebus. b

Impetiginis vero species sunt quatuor. Minime mala est, quæ similitudine scabiem repræsentat. nam & rubet, & durior est, & exulcerata, & rodit. Distat autem ab ea, quæ magis exulcerata est, & varis similes pustulas habet; videnturque esse in ea quasi bullulæ quædam, ex quibus interposito tempore quasi squamulæ solvuntur, certioribusque hæc temporibus revertitur.

Alterum genus est pejus & simile papulæ fere, sed asperius rubicundiusque, figuras varias habens: squamulæ ex summa cute decidunt, rosio major est, celerius & latius procedit, certioribusque etiam, quam prior, temporibus & fit, & desinit. Rubra cognominatur.

Tertia etiamnum deterior est, nam & crassior est, & durior, & magis tumet; in summa cute finditur, & vehementius rodit. Ipsa quoque squamosa, sed nigra est: proceditque & latet, nec tardat: minus vero errat in temporibus, quibus aut oritur, aut desinit; neque ex toto tollitur. Nigræ cognomen est.

Quartum genus est, quod curationem omnino non recipit, distans colore. nam subalbidum est, & recenti cicatrici simile; squamulasque habet pallidas, quasdam subalbidas, quasdam lenticulæ similes: quibus demptis, profluit sanguis nonnunquam. Alioqui vero humor ejus albidus est, cutis dura atque fissâ est, proceditque latius.

Hæc vero omnia genera maxime oriuntur in pedibus, & manibus; atque un-

938, 23. gues quoque infestant. Medicamentum non aliud valentius est, quam quod ad scabiem quoque pertinere sub auctore Protarcho retuli. Serapion autem, nitri P. II. \* sulphuris P. IV. \* excipiebat resina s copiosa, eoque utebatur.

## 18. De papulis.

938, 11. Papularum vero duo genera sunt. Alterum est, in quo per minimas pustulas cutis exasperatur, & rubet, leviterque roditur, medium habet pauxillo levius: tarde serpit. idque vitium maxime rotundum incipit, eademque ratione in orbem pro-10 cedit. Alterum est, quam *αγρία* Græci appellant. In qua similiter quidem, sed ma-15 gis cutis exasperatur, exulceraturque, ac vehementius & roditur, & rubet, & interdum etiam pilos remittit.

Quæ minus rotunda est, difficilius fanescit: nisi sublata est, in impetiginem vertitur. Sed levis papula etiam, si jejuna saliva quotidie defricetur, fanescit. Major, commodissime murali herba tollitur, si super eadem trita est. Ut vero ad composita medicamenta veniamus, idem illud Protar-25 chi tanto valentius in his est, quanto minus in his vitii est. Alterum ad idem, Miconis: nitri rubri, thuris, singulorum P. I. \*. cantharidum purgatarum P. II. \*. sulphuris ignem non experti tantundem, re-30 sinæ terebinthinæ liquidæ P. XX. \*. farinæ lolii sext. III. git cyathi tres, picis crudæ sext. unum.

19. De Vitiliginis speciebus, id est, de Alphi,  
& Melane, & Leuce. c

Vitiligo quoque, quamvis per se nullum  
periculum adfert: tamen & foeda est, & ex  
5 malo corporis habitu fit. Ejus tres species  
sunt. Α'λφ@ vocatur, ubi color albus est,  
fere subasper & non continuus, ut quaedam  
quasi guttæ dispersæ esse videantur. Inter-  
dum etiam latius, & cum quibusdam in-  
10 termissionibus serpit. Μέλας colore ab hoc  
differt, quia niger est, & umbræ similis.  
cætera eadem sunt. Λεύκη habet quiddam  
simile alphi, sed magis albida est, & altius  
descendit; in eaque albi pili sunt, & lanu-  
15 gini similes. Omnia hæc serpunt; sed in  
aliis celerius, in aliis tardius. Alphos &  
Melas in quibusdam variis temporibus  
oriuntur & desinunt. Leuce, quem occu-  
pavit, non facile dimittit.

20 Priora curationem non difficillimam re-  
cipiunt: ultimum vix unquam sanescit; ac,  
si quid ei vitio demptum est, tamen non  
ex toto sanus color redditur. Utrum autem  
aliquod horum sanabile sit, an non; experi-  
25 mento facile colligitur. Incidi enim cutis  
debet, aut acu pungi. si sanguis exit, quod  
fere fit in duobus prioribus, remedio locus  
est: si humor albidus, sanari non potest.  
Itaque ab hoc quidem abstinendum est.

30 Super id vero, quod curationem recipit,  
imponenda lenticula mixta cum sulphure  
& thure, sic, ut ea contrita ex aceto sit.  
Aliud ad idem, quod ad Irenæum autho-  
rem refertur. Alcyonium, nitrum, cumi-

Y 3 num,

342      A. CORN. CELSI      Lib. 6.  
 num, fici folia arida paribus portionibus  
 contunduntur, adjecto aceto. His in sole  
 vitiligo perungitur · deinde non ita multo  
 post, ne nimis erodatur, eluitur. Proprie  
 quidem, Micone authore, eos, quos Alphos 5  
 vocari dixi, hoc medicamento perungunt:  
 sulphuris P. II. \*. nitri P. IV. \*. myrrhæ  
 aridæ contritæ acetabulum miscent, dein-  
 de in balneo super vitiliginem inspergunt  
 farinam ex faba, tum hæc inducunt. Hi ve- 10  
 ro, quos Melanas vocari dixi, curantur,  
 cum simul contrita sunt alcyonium, thus,  
 hordeum, faba, eaque sine oleo in balneo  
 ante sudorem insperguntur, ac tum genus  
 id vitiliginis defricatur. 15

## LIBER SEXTUS.

### C A P. I.

10

#### *De Vitiis singularum corporis partium.*

**D**IXI de his vitiis, quæ per totum cor-  
 pus orientia, medicamentorum au-  
 xilia desiderant, nunc ad ea veniam,  
 quæ non nisi in singulis partibus incidere 25  
 consueverunt, orsus à capite.

#### *I. De Capillis fluentibus. a*

In hoc igitur capillis fluentibus maxime  
 quidem sæpe radendo succurritur. Adjicit  
 etiam vim quandam ad continendum, la- 30  
 danum cum oleo \* mistum. Nunc de his ca-  
 pillis loquor, qui post morbum fere fluunt.  
 Nam, quo minus caput quibusdam ætate

343,  
 27.

nu-  
 a Trallian. I, 2. Actuar. M. M. II, 5. IV, 9. Oribas.  
 de Loc. Affect. Cur. IV, 5, \* Scil. myrteo. Th. Prif-  
 eian. I, 2.

C A P. II.

5                    De Porrigine. a

PORRIGO autem est, ubi inter pilos  
quædam quasi squamulæ surgunt, eæque  
à cute resolvuntur; & interdum ma-  
10 dent, multo sæpius siccæ sunt. Idque eve-  
nit, modo sine ulcere, modo exulcerato lo-  
co. Huic quoque modo malo odore, modo  
nullo accedente. Fereque id in capillo fit,  
rarius in barba, aliquando etiam in super-  
15 cilio. Ac neque sine aliquo corporis vitio  
nascitur, neque ex toto inutile est. Nam  
bene integro capite, non exit: ubi aliquod  
in eo vitium est, non incommodum est,  
summam cutem potius subinde corrumpi,  
20 quam id, quod nocet, in aliam partem ma-  
gis necessariam verti.

Commodius est ergo subinde peccando  
repurgare, quam id ex toto prohibere. Si  
tamen ea res magis offendit (quod nimium  
25 humore sequente fieri potest; magisque, si  
is etiam mali odoris est) caput sæpe raden-  
dum est; dein id super adjuvandum ali-  
quibus ex leviter reprimentibus. quale est  
nitrum cum aceto, vel ladanum cum myr-  
30 teo & vino, vel myrobalanum cum vino.  
Si parum per hæc proficitur, vehementio-  
ribus uti licet; cum eo, ut sciamus, utique  
in recenti vitio id inutile esse.

\* Priscian. I, 2 a Æginet. III, 3. Trallian. I. 4.  
Oribas. de Loc. Affect. Cur. IV, 9, 10.



## C A P. III.

*De Sycoſi. a*

**E**ST etiam ulcus, quod à fici ſimilitudine  
*σύκωσις* à Græcis nominatur, quia caro 5  
 in eo excreſcit: & id quidem generale  
 eſt. Sub eo vero duæ ſpecies ſunt. Altera,  
 ulcus durum & rotundum eſt: altera, hu-  
 midum & inæquale. Ex duro exiguum  
 quiddam & glutinoſum exit: ex humido 10  
 plus, & mali odoris. Fit utrunque in iis  
 partibus, quæ pilis conteguntur: ſed, id  
 quod calloſum & rotundum eſt, maxime  
 in <sup>b</sup> barba; id vero, quod humidum, præci-  
 pue in capillo. 15

Super utrunque oportet imponere ela-  
 terium, aut lini ſemen contritum & aqua  
 coactum, aut ficum in aqua decoctam, aut  
 emplaſtrum tetrapharmacum ex aceto ſub-  
 actum. Terra quoque Eretria ex aceto li- 20  
 quata recte illinitur.

## C A P. IV.

*De Areis.*

**A**REARUM quoque duo genera ſunt. 25  
 Commune utrique eſt, quod, emor-  
 tua ſumma pellicula, pili primum ex-  
 tenuantur; deinde excidunt: ac, ſi iſtus islo-  
 cus eſt, ſanguis exit liquidus, & mali odoris:  
 increſcitque utrumque in aliis celeriter, in 30  
 aliis tarde. Pejus eſt, quod denſam cutem,  
 & ſubpinguem, & ex toto glabram fecit. Sed  
 ea, quæ *άλωπεκία* <sup>b</sup> nominatur, ſub quali-  
 bet figura dilatatur. Fit & in capillo, & in  
 barba.

<sup>a</sup> *Æginet. III, 3. Aëtuar. M. M. II, 5. Oribaf. de Loc. Affect. Cur. IV, 52. Trall. I, 5. b* *Trallian. I. 1. Prifcian. L. I. c. 6.*

barba. Id vero, quod à serpentis similitudine ὀφίασις c appellatur, incipit ab occipitio: duorum digitorum latitudinem non excedit: ad aures duobus capitibus serpit; 5 quibusdam etiam ad frontem, donec se duo capita in priorem partem committant. Illud vitium in qualibet ætate est: hoc fere in infantibus. Illud vix unquam sine curatione: hoc per se sæpe finitur.

10 Quidam hæc genera arearum scalpello exasperant. quidam illinunt adurentia ex oleo; maximeque chartam combustam. quidam resinam terebinthinam cum thapsia inducunt. Sed nihil melius est, quam 15 novacula quotidie radere: quia, cum paulatim summa pellicula excisa est, adaperiuntur pilorum radiculæ. Neque ante oportet desistere, quam frequentem pilum nasci apparuerit. Id autem, quod subinde raditur, 20 illini atramento sutorio satis est.

C A P. V.

*De Varis, & Lenticulis,  
& Ephelide.<sup>a</sup>*

25 PENE ineptiæ sunt, curare varos, & lenticulas, & ephelidas: sed eripi tamen foeminis cura cultus sui non potest. Ex iis autem, quæ supra proposui, vari lenticulæque vulgo notæ sunt; quamvis rarior 30 ea species est, quam φακίαν Græci vocant, cum sit ea lenticula rubicundior, & inæqualior. Ἐφηλὶς vero à plerisque ignoratur: quæ nihil est, nisi asperitas quædam & durities mali coloris. Cætera non nisi in facie: Y 5

c Oribas. deloc. Affect. Cur. IV, 42. Actuar. M. M. V, 13. a Æginet. III, 1.

cie: lenticulæ etiam in alia parte nonnunquam nasci solent. de qua per se scribere alio loco, visum operæ pretium non est.

Sed vari commodissime tolluntur imposita resina, cui non minus quam ipsa est, 5  
aluminis scissilis, & paulum mellis adjectum est. Lenticulam tollunt galbanum & nitrum, cum pares portiones habent, contritaque ex aceto sunt, donec ad mellis crassitudinem venerint. His corpus illinendum 10  
est, & interpositis pluribus horis, mane eluendum, oleoque leviter unguendum.

Ephelidem tollit resina, cui tertia pars salis fossilis & paulum mellis adjectum est. Ad omnia vero ista atque etiam ad colo- 15  
randas cicatrices, prodest ea compositio, quæ ad Tryphonem patrem authorem refertur. In ea pares portiones sunt myrobalani, crocomagnatis, cretæ cimoliæ subceruleæ, nucum amararum, farinae hordei 20  
atque ervi, struthii albi, fertulæ campanæ seminis. quæ omnia contrita, melle quam amarissimo coguntur, illitumque à vespere usque mane eluitur.

## C A P. V I.

25

*De oculorum morbis : & primo de his,  
qui lenibus medicamentis  
curantur. a*

**S**Ed hæc quidem mediocria sunt. b Ingen- 30  
tibus vero & variis casibus oculi nostri patent. Qui cum magnam partem ad vitæ simul & usum & dulcedinem conferant, summa cura tuendi sunt.

Pro-

a Actuar. M. M. IV, II. VI, 5. III, 22.

b Trallian. II, I.

Protinus autem orta lippitudine, quædam notæ sunt, ex quibus, quid eventurum sit, colligere possimus. Nam, si simul & lacryma & tumor & crassa pituita cœperint; si ea pituita lachrymæ mista est; neque lachryma calida est, pituita vero alba & mollis, tumor non durus, longæ valetudinis metus non est. At si lachryma multa & calida, pituitæ paulum, tumor modicus, idque in uno oculo est; longum id sed sine periculo, futurum est. Idque lippitudinis genus minime cum dolore est; sed vix ante vigesimum diem tollitur; nonnunquam per duos menses durat, quandoque brevius finitur.

Si pituita alba & mollis esse incipit; lachrymæque miscetur, aut, si simul hæ utrunque oculum invaserunt, potest esse brevior, sed periculum ulcerum est. Pituita autem sicca & arida dolorem quidem movet, sed maturius desinit; nisi quid exulceravit.

Tumor magnus si sine dolore est, & siccus, sine ullo periculo est: si siccus quidem, sed cum dolore est, fere exulcerat; & nonnunquam ex eo casu fit, ut palpebra cum oculo glutinetur. Eiusdem exulcerationis timor in palpebris pupillisve est; ubi, super magnum dolorem, lachrymæ falsæ calidæque eunt; aut etiam si, tumore jam finito, diu lachryma cum pituita profluit.

Pejus etiamnum est, ubi pituita pallida aut livida est, lachryma calida aut multa profluit, caput calet, à temporibus ad oculos

los dolor pervenit, nocturna vigilia urget. siquidem sub his oculus plerumque rumpitur, votumque est, ut tantum exulceretur. Intus ruptum oculum febricula juvat. Si foras jam ruptus procedit, sine auxilio est. 5 Si de nigro aliquid albidum factum est, diu manet. At, si asperum, & crassum est, etiam post curationem vestigium aliquod relinquit.

Curari vero oculos sanguinis detractio- 10 ne, medicamento, balneo, fotu, vino, vetustissimus author Hippocrates a memoriae prodidit. Sed eorum tempora & causas parum explicuit: in quibus Medicinæ summa est. Neque minus in \* abstinentia & alvi 15 ductione sæpe auxilii est. Hos igitur interdum inflammatio occupat: ubi cum tumore in his dolor est; sequiturque pituitæ cursus, nonnunquam copiosior vel acrior, nonnunquam utraque parte moderatior. In 20 ejusmodi casu prima omnium sunt quies & abstinentia. Ergo primo die, loco obscuro cubare debet sic, ut à sermone quoque abstineat: nullum cibum assumere; si fieri potest, ne aquam quidem; sin minus, 25 certe quam minimum ejus.

Quod si graves dolores sunt, commodius secundo die; si tamen res urget, etiam primo † sanguis mittendus est; utique si in fronte venæ tument, si firmo corpore ma- 30 teria superest: Si vero minor impetus, minus acrem curationem requirit. Alvum non nisi secundo tertiove die duci oportet. At modica inflammatio neutrum ex his auxi-

a Aphor. VI, 31. \* Marcell. de Medic. c. 8.  
† Idem ibid.



auxilium desiderat: satisque est, uti quiete  
& abstinentia.

Neque tamen in lippientibus longum je-  
junium necessarium est, ne pituita tenuior  
5 atque acrior fiat: sed secundo die dari de-  
bet id, quod levissimum videri potest ex  
iis, quæ pituitam faciunt crassiolem; qua- 360.  
lia sunt ova forbilia: si minor vis urget, 15.  
pulticula quoque, aut panis ex lacte. In se-  
10 quentibus diebus, quantum inflammationi  
detrahetur, tantum adjici cibus poterit; sed  
generis ejusdem: utique ut nihil falsum,  
nihil acre, nihil ex his, quæ extenuant, su-  
matur; nihil potui præter aquam. Et vi-  
15 ctus quidem ratio talis maxime necessaria  
est.

Protinus autem primo die, † croci p. i. \*.  
& farinæ candidæ quam tenuissimæ p. ii. \*.  
excipere oportet ovi albo, donec mellis  
20 crassitudinem habeat: idque in linteolum  
illinere, & fronti agglutinare, ut, compres-  
sis venis, pituitæ impetum cohibeat. Si cro-  
cum non est, thus idem facit. Linteolo an  
lana excipiatur, nihil interest. Superinun-  
25 gi vero oculi debent sic, ut croci quantum  
tribus digitis comprehendi potest, sumat-  
tur, myrrhæ ad fabæ, papaveris lachrymæ  
ad lentis magnitudinem, eaque cum passo  
conterantur, & specillo super oculos indu-  
30 cantur. Aliud ad idem: mirrhæ p. i. \*.  
§ madragoræ succi p. ii. \*. papaveris la-  
chrymæ p. ii. \*. foliorum rosæ, cicutæ se-  
minis, singulorum p. iiii. \*. sacaciæ p. iv.  
\*. gummi p. viii. \*. Et hæc quidem inter-  
diu

† Marcell. de Medic. c. 8.

§ Idem ibid.

diu: noctu vero, quo commodior quies veniat, non alienum est, superimponere candidi panis interiorem partem ex vino subactam. nam & pituitam reprimat, & si quid lachrymæ processit, absorbet, & oculum glutinari non patitur.

Si grave id & durum, propter magnum oculorum dolorem, videtur, ovi & album & vitellus in vas defundendum est; adji-  
ciendumque eo mulsi paulum, idque digi-  
to permiscendum; ubi facta unitas est, de-  
mitti debet lana mollis bene carpta, quæ  
id excipiat, superque oculos imponi. Ea  
res & levis est, & refrigerando pituitam  
coercet, & non exarescit, & glutinari ocu-  
lum non patitur. Farina quoque hordeacea  
cocta, & cum malo cotoneo cocto mixta,  
commode imponitur. Neque ab ratione  
abhorret, etiam penicillo potissimum uti  
expresso, si levior impetus est, ex aqua; si  
major, ex posca. Priora fascia deliganda  
sunt, ne per somnum cadant: at hoc super-  
imponi satis est, quia & reponi ab ipso  
agro commode potest: & quia, cum inar-  
ruit, iterum madefaciendum est. Si tantum  
mali est, ut somnum diu prohibeat, eorum  
aliquid dandum est, quæ *αράδυνα* Græci  
appellant: satisque est puero, quod ervi; vi-  
ro, quod fabæ magnitudinem impleat.  
In ipsum vero oculum primo die, nisi im-  
modica inflammatio est, nihil recte conji-  
citur: sæpe enim potius concitatur eo pi-  
tuita, quam minuitur. At secundo die, gra-  
vi quoque lippitudine per indita medica-  
men-

menta recte succurritur, ubi vel jam sanguis missus, vel alvus ducta est; aut, neutrum necessarium esse, manifestum est.

2. De diversis oculorum collyriis.

5 Multa autem multorumque collyria ad id apta sunt; novisque etiamnum misturis temperari possunt; cum lenia medicamenta, & modice reprimentia, facile & varie misceantur. Ego autem nobilissima ex-  
10 quar.

3. Philonis collyrium.

Est igitur Philonis, quod habet cerusæ elotæ, spodii, gummi, singulorum p.  
1. \*. papaveris lachrymæ combustæ p. i.  
15 \*. Illud scire oportet, hæc quoque omnia medicamenta, singula primum per se teri, deinde mista iterum, adjecta paulatim vel aqua, vel alio humore. Gummi cum quas-  
dam alias facultates habeat, hoc maxime  
20 præstat, ut, ubi collyria diu facta inaruerunt, glutinata sint, neque frientur.

4. Dionysii collyrium.

Dionysii collyrium est: papaveris lachrymæ combustæ, donec tenerescat p. i.  
25 \*. thuris combusti, gummi, singulorum p. i. i. \*. spodii p. i. i. i. \*.

5. Cleonis collyrium. d

Cleonis nobile admodum: papaveris lachrymæ frictæ p. i. \*. croci p. i. \*. gummi p. \*. v. quibus, cum teruntur, adjicitur rosæ succus. Aliud ejusdem valentius: squamæ ferri, quod *σίμαμα* † adpellant, p. i. \*. croci p. ii. \*. spodii p. iv. \*. plumbi & eloti, & combusti p. i. \*. gummi tan-  
tun-

d Oribas. Synops. LIII, de Collyriis. Æginet. VII, 16.  
† Vide Sarracenum in Dioscorid. L. V. c. 90.

tundem. Ejus aliud quoque ad idem est, maxime ubi multa pituita profluit: castorei P. \*. I. aloes P. \*. I. myrrhæ P. \*. II. cadmiæ curatæ P. VIII. \*. stibii tantundem, acaciæ succi P. XII. \*. quod, cum miscueris, in pixidicula fervetur. Theodotus vero huic compositioni adjecit papaveris lachrymæ combustæ P. \*. I. æris combusti & eloti P. II. \*. nucleorum palmarum combustorum P. X. \*. gummi P. XII. \*.

6. *Theodoti collyrium, Acharistum appellatum.* 10

At ipsius Theodoti, quod à quibusdam *αχάριστον* nominatur, ejusmodi est: castorei, nardi Indici, singulorum P. I. \*. lycii P. \*. papaveris lachrymæ tantundem; myrrhæ P. II. \*. croci, cerussæ elotæ, aloes, singulorum P. III. \*. cadmiæ botryitidis elotæ, æris combusti, singulorum P. VIII. \*. gummi P. XVIII. \*. acaciæ succi P. XX. \*. stibii tantundem; quibus aqua pluvialis adjicitur.

7. *Cythion vel Tephron collyrium.* 20

Præter hæc, ex frequentissimis collyriis est id, quod quidam Cythion, quidam à cinereo colore Tephron appellant. Habet amyli, tragacanthæ, acaciæ succi, gummi, singulorum P. I. \*. papaveris lachrymæ P. II. \*. cerussæ elotæ P. IV. \*. spumæ argenti elotæ P. VIII. quæ æque ex aqua pluviali conteruntur.

8. *Euelpidis collyrium, Trygodes nominatum.*

Euelpides autem, qui ætate nostra maximus fuit \*ocularius medicus, utebatur eo, quod ipse composuerat, & *τρυγώδες* nominabat,

e Æginet. VII, 16. Paulo aliter exstat apud Marcellum de Medic. c. VIII, pag. 267. Ed. Steph. Est & aliud Theodotion Dionysianum pag. 274. eodem capite descriptum, nisi malis hoc referre ad mox antecedens Dionysii. Aliud exstat etiam pag. 281. \* Marcell. de Medic. c. 8. p. 267. 274.

nabat. Habet autem hoc, castorei P. II. \*.  
 lycii, nardi, papaveris lachrymæ, singulo-  
 rum P. I. \*. croci, myrrhæ, aloes, singu-  
 lorum P. IV. \*. æris combusti P. VIII. \*.  
 5 cadmiæ, & stibii, singulorum P. XII. \*.  
 acaciæ succi P. XXVI. \*. gummi tantundem.

Quo gravior vero quæque inflammatio  
 est, eo magis leniri medicamento debet,  
 adjecto vel albo ovi, vel muliebri lacte. At,  
 10 si neque medicus, neque medicamentum  
 præsto est, sæpius utrumlibet horum in  
 oculos penicillo ad idipsum facto infusum,  
 id malum lenit. Ubi vero aliquis relevatus  
 est, jamque cursus pituitæ constitit, reli-  
 15 quias fortasse leviores futuras discutunt  
 balneum & vinum. Igitur lavari debet le-  
 viter, ante ex oleo perfricatus, diutiusque  
 in cruribus & feminibus; multaque calida  
 aqua fovere oculos; deinde per caput  
 20 prius calida, tum egelida perfundi: à bal-  
 neo cavere ne quo frigore afflatu læda-  
 tur: posthæc cibo paulo pleniore, quam  
 ex operum consuetudine, uti; vitatis ta-  
 men omnibus pituitam extenuantibus: vi-  
 25 num bibere lene, subausterum, modice  
 vetus; neque effuse, neque timide; ut ne-  
 que cruditas ex eo, & tamen somnus fiat,  
 lenianturque intus latentia acria. Sed, si  
 quis in balneo sensit majorem oculorum  
 30 perturbationem, quam attulerat (quod inci-  
 dere his solet, qui, manente adhuc pituitæ  
 cursu, festinarunt) quamprimum discedere  
 debet: nihil eo die vini assumere; cibi mi-  
 nus etiam, quam pridie. deinde cumpri-  
 mum



354 A. CORN. CELSI Lib. 6.  
mum satis pituita substitit, iterum ad usum  
balnei redire.

Solet tamen evenire nonnunquam, five  
tempestatum vitio, five corporis, ut pluri-  
bus diebus neque dolor, neque inflamma- 5  
tio, & minime pituitæ cursus finiatur.  
Quod ubi incidit, jamque ipsa vetustate  
res matura est, ab his eisdem auxilium pe-  
tendum est, id est balneo ac vino. Hæc enim  
ut in recentibus malis aliena sunt; quia 10  
concitare ea possunt, & accendere: sic in  
veteribus, quæ nullis aliis auxiliis cesserunt,  
admodum efficaciam esse consuerunt.  
videlicet hic quoque, ut alibi\*, cum secun-  
da vana fuerint, contrariis adjuvantibus. 15  
Sed ante tonderi ad cutem convenit: dein-  
de in balneo aqua calida quamplurima ca-  
put atque oculos fovere: tum utrunque  
penicillo detergere, & ungere caput irino  
unguento: continereque in lectulo se; do- 20  
nec omnis calor, qui conceptus est, finia-  
tur; desinatque sudor, qui necessario in  
capite collectus est. Tum ad idem cibi vi-  
nique genus veniendum est sic, uti potiones  
meracæ sint; obtegendumque caput, & 25  
quiescendum. Sæpe enim posthæc gravis  
somnia, sæpe sudor, sæpe alvi dejectio pi-  
tuitæ cursum finit. Si levatum est malum  
(quod aliquando serius fit) per plures  
dies idem fieri oportet, donec ex toto sa- 30  
nitas restituatur. Si diebus eisdem alvus  
nihil reddit, ducenda est; quo magis supe-  
riores partes leventur.

Nonnunquam autem ingens inflamma-  
tio

\* Lib. II. c. 9.

tio tanto impetu erumpit, ut oculos è sua sede propellat. *περὶ πλάσιν* id, quoniam oculi procidunt, Græci appellant. His utique, si vires patiuntur, sanguinem mitti: si id fieri non potest, alvum duci, longioremque inediam induci, necessarium est. Opus autem lenissimis medicamentis est. Ideoque Cleonis collyrio quidam, quod ex duobus ante positum est, utuntur. Sed optimum est Nilei: neque de ullo magis inter omnes authores convenit.

9. *Nilei collyrium, omnium optimum.*

Id habet nardi Indici, papaveris lachrymæ, singulorum P. \*. gummi P. I. \*. croci P. II. \*. foliorum rosæ recentium P. IV. \*. quæ vel aqua pluviali, vel vino levi subaustero coguntur. Neque alienum est, malicorium, vel fertulam campanam ex vino coquere, deinde conterere: aut myrrham nigram cum rosæ foliis miscere: aut hyocyami folia cum ovi vitello cocta: aut farinam cum acaciæ succo, vel passo, aut mulso. Quibus si folia quoque papaveris adjiciuntur, aliquanto valentiora sunt. Horum aliquo præparato, penicillo fovere oculos oportet, ex aqua calida expresso, in qua ante vel myrti vel rosæ folia decocta sint: deinde, ex illis aliquid imponi. Præter hæc, ab occipitio incisa cute, cucurbitula adhibenda est.

Quod si per hæc restitutus oculus in sedem suam non est, eodemque modo prolapsus permanet, scire oportet, lumen esse amissum: deinde futurum, ut indurescat

356 A. CORN. CELSI Lib. 6.  
is, aut in pus vertatur. Si suppuratio se  
ostendit, ab eo angulo, qui temporis pro-  
pior est, incidi oculus debet; ut, effuso pu-  
re, inflammatio ac dolor finiatur, & intus  
tunicæ residant, quo minus foeda postea  
facies sit. Utendum deinde vel iisdem col-  
lyriis ex lacte aut ovo; vel croco, cui al-  
bum ovi misceatur. At, si induruit, & sic  
emortuus est, ut ne in pus verteretur; qua-  
tenus foede prominebit, excidendum erit  
sic, ut hamo summa tunica apprehendatur,  
atque infra id scalpellus incidat: tum ea-  
dem medicamenta erunt injicienda, donec  
omnis dolor finiatur. Iisdem medicamen-  
tis in eo quoque oculo utendum est, qui pri-  
mum procidit; deinde per plura loca fissus  
est.

10. *De Carbunculis oculorum.* f

Solent etiam carbunculi ex inflamma-  
tione nasci, nonnunquam in ipsis oculis,  
nonnunquam in palpebris: & in his ipsis,  
modo ab interiore, modo ab exteriori par-  
te. In hoc casu alvus ducenda est: cibus  
minuendus: lac potui dandum; ut acria, quæ  
læserunt, leniantur. Quod ad cataplasma-  
ta & medicamenta pertinet, his utendum,  
quæ adversus inflammationes proposita  
sunt. Atque hic quoque Nilei Collyrium  
optimum est. Si tamen carbunculus in  
exteriore palpebræ parte est, ad cataplas-  
mata aptissimum est lini semen ex mulso  
coctum; aut, si id non est, tritici farina eo-  
dem modo cocta.

11. *De*

f Scribon. Larg. III. c. 25. Marcell. de Medic. C. VIII.  
Trallian. II, 7.

11. *De Pustulis oculorum.*

Pustulæ quoque ex inflammationibus interdum oriuntur. Quod si inter initia protinus incidit, magis etiam servanda sunt, quæ de sanguine & quiete supra proposui; sin serius, quam ut sanguis mitti possit, alvus tamen ducenda est. Si id quoque aliqua res inhibet, utique victus ratio servanda est. Medicamentis autem hic quoque lenibus opus est; quale Nilei, quale Cleonis est.

12. *Philetis collyrium, ad pustulas oculorum.*

Id quoque, quod Philetis vocatur, huic aptum est. Habet enim myrrhæ, papaveris lachrymæ, singulorum p. i. \*. plumbi eloti, terræ samiæ, quæ αἰγιῆ vocatur, tragacanthæ, singulorum p. iv. \*. stibii cocti †, amyli, singulorum p. vi. \*. spodii eloti, cerussæ elotæ, singulorum p. viii. \*. quæ aqua pluviali excipiuntur. Usus collyrii, vel ex ovo, vel ex lacte est.

13. *De Ulceribus oculorum, & de*

*Ἀγὸ λιβάνου collyrio. \**

Ex pustulis ulcera interdum fiunt; eaque recentia æque lenibus medicamentis nutrienda sunt, & iisdem fere, quæ supræ in pustulis proposui. Fit quoque proprie ad hæc, quod Ἀγὸ λιβάνου vocatur. Habet æris combusti, & eloti, papaveris lachrymæ frictæ singulorum p. i. \*. spodii eloti, thuris, stibii combusti & eloti, myrrhæ, gummi, singulorum p. ii. \*.

14. *De Imminutione oculorum.*

Evenit etiam, ut oculi, vel ambo, vel

Z 3

fin

† Scribon. Largus Comp. XXIII. Rhodius in notis pag. 63. \* Trallian. II, 5. Longè aliter describitur à Marcello de Medic. Cap. VIII. pag. 280. Eâdem paginâ paulo interius aliud ejusdem nominis depromitur.

linguli, minores fiant, quam esse naturaliter debeant. Idque & acer pituitæ cursus in lippitudine efficit, & continuati fletus, & ictus parum bene curati. In his quoque iisdem lenibus medicamentis ex muliebri lacte utendum est: cibus vero his, qui maxime corpus alere, & implere consuerunt: vitandaque omni modo causa, quæ lachrymas excitet, & cura domesticorum. quorum etiam, si quid forte incidit, ejus \* notitiæ subtrahendum: atque acria quoque medicamenta, & acres cibi non alio magis nomine his nocent, quam quod lachrymas movent.

127, 25.

19

## 15. De Pediculis palpebrarum. 8 15

Genus quoque vitii est, qui inter pilos palpebrarum pediculi nascuntur. id *φθειριών* Græci nominant. Quod cum ex malo corporis habitu fiat, raro non ultra procedit: sed fere, tempore interposito, pituitæ cursus acerrimus sequitur; exulceratisque vehementer oculis, aciem quoque ipsam corrumpit.

20

His alvus ducenda est: caput ad cutem tondendum, diuque quotidie jejunis perfricandum. His, ambulationibus aliisque exercitationibus diligenter utendum: gargarizandum ex mulso, in quo nepeta & pinguis ficus decocta sit: sæpe in balneo multa calida aqua fovendum caput: vitandi acres cibi; lacte pingui vinoque utendum: bibendumque liberalius, quam edendum est. Medicamenta vero intus quidem lenia danda sunt; ne quid acrioris pitu-

30

\* Hippocr. de Dec. Orn. XI. 15. g. Aëtuar. M. M. II, 7, & IV, 11. Aëtius Tetr. II, Serm. III, 65. Oribas. de Loc. Aff. IV, 32.



pituitæ concitent: super ipsos vero pediculos alia, quæ necare eos, & prohibere, ne similes nascantur, possint. Ad idipsum spumæ nitri P. I. \*. sandarachæ P. I. \*. uvæ taminis, P. \*. I. simul teruntur, adjiciturque vetus oleum pari portione, atque acetum, donec eis mellis crassitudo sit.

10 16. *De Oculorum gravioribus morbis, qui ex inflammationibus oriuntur, & validioribus medicamentis curantur, & de Andree collyrio, & de Ἀλγ. νέγγι.*

Haftenus oculorum morbi, qui lenibus medicamentis nutriuntur. Genera deinde alia sunt, quæ diversam curationem desiderant; fere ex inflammationibus nata, sed finitis quoque his manentia. atque inprimis in quibusdam perseverat tenuis pituitæ cursus. Quibus alvus ab inferiore parte evocanda est, demendumque aliquid ex 20 cibo. Neque alienum est, illini frontem ex compositione Andree. Quæ habet gummi P. I. \*. cerussæ, stibii, singulorum P. II. \*. spumæ argenti coctæ & clotæ P. IV. \*. sed ea spuma ex aqua pluviali coquitur; & 25 arida hæc medicamenta ex succo myrti conteruntur. His illita fronte, cataplasma quoque superinjiciendum ex farina, quæ frigida aqua coacta sit, cuique aut acaciæ succus, aut cupressus adjecta sit. Curcubitula quoque, inciso vertice, recte accommodatur: aut ex temporibus sanguis emit- 30 titur. Inungi vero eo debet, quod habet squamæ æris, papaveris lachrymæ, singulorum P. \*. cervini cornu combusti & clo-

360 A CORN. CELSI Lib. 6.  
ti, plumbi eloti, gummi, singulorum p. iv,  
\*. thuris p. xii. Hoc vero collyrium quia  
cornu habet, *ἀλά κίρα* nominant. Quo-  
tiescunque non adjicio, quod genus hu-  
moris adjiciendum sit, aquam intelligi s  
volo.

17. *Μεμιγμένον, Euelpidis collyrium.*

Ad idem Euelpidis, quod *μεμιγμένον*  
nominabat. in eo papaveris lachrymæ, &  
albi piperis, singulæ uncia sunt, gummi 10  
libra, æris combusti p. i. \*. Inter has au-  
tem curationes, post intermissionem ali-  
quam, profunt balneum & vinum. Cum-  
que omnibus lippientibus vitandi cibi sint,  
qui extenuant; tum præcipue, quibus te- 15  
nuis humor diu fertur. Quod si jam fasti-  
dium est eorum, quæ pituitam crassio-  
reddunt, sicut in hoc genere materiæ ma-  
xime promptum est; confugiendum est ad  
ea, quæ, quia ventrem, corpus quoque ad- 20  
stringunt.

18. *De Oculorum ulceribus supercrescenti-  
bus, fordidis, cavis, veteribus.*

At ulcera, si cum inflammatione finita  
non sunt, aut supercrescentia, aut sordida, 25  
aut certe vetera esse consuerunt. Ex his su-  
percrescentia collyrio, quod *μεμιγμένον*  
vocatur, optime reprimuntur. Sordida  
purgantur & eodem, & eo, quod Smilion  
nominatur. 30

19. *Smilion collyrium.*

Habet æruginis p. vi. \*. gummi tantun-  
dem, ammoniaci, minii linopici, singu-  
lo-

lorum p. xvi. \*. quæ quidam ex aqua; quidam, quo vehementiora sint, ex aceto terunt.

20. *Phynon collyrium Euelpidis.*

5 Id quoque Euelpidis, quod Phynona appellabat, hic utile est: croci p. i. \*. papaveris lachrymæ, gummi, singulorum p. ii. \*, æris combusti & eloti, myrrhæ, singulorum p. iv. piperis albi p. vi. \*. Sed ante li-  
10 tum, hoc unguendum est.

21. *Sphærian collyrium Euelpidis.*

Id quoque ejusdem, quod Sphærian nominabat, eodem valet. Lapidis hæmatitis eloti p. ii. \*. piperis grana sex, cadmiæ  
15 elotæ, myrrhæ, papaveris lachrymæ, singulorum p. iii. \*. croci p. iv. \*. gummi p. viii. \*. quæ cum vino aminæo conteruntur.

22. *Liquidum Euelpidis collyrium.*

20 Liquidum quoque medicamentum ad idem componebat. in quo erant hæc: æruginis p. \*. minii combusti, atramenti futorii, cinnamomi, singulorum p. iii, \*. croci, nardi, papaveris lachrymæ, singulorum  
25 p. i. \*. myrrhæ p. ii. \*. æris combusti p. iii. \*. cineris ex odoribus p. iv. \*. piperis grana xv. Hæc ex vino austero teruntur; deinde cum passi tribus heminis decoquuntur, donec corpus unum sit. Idque medi-  
30 dicamentum vetustate efficacius fit.

23. *De cavis oculorum ulceribus.*

Cava vero ulcera commodissime implent ex his, quæ supra posita sunt, Sphærian, & id quod Philetis vocatur. Idem

362 A. CORN. CELSI Lib. 6.  
Sphæriion vetustis ulceribus & vix ad cicatricem venientibus optime succurrit.

24. *Hermonis collyrium.*

Est etiam collyrium, quod cum ad plura valeat, plurimum tamen proficere in his ulceribus videtur. Refertur ad Hermonem authorem. Habet piperis longi p. i. z. \* albi p. \*, cinnamomi, costi, singulorum p. i. \*, atramenti futorii, nardi, casia, castorei, singulorum p. ii. \*. gallæ p. v. \*. myrrhæ, croci, thuris, lycii, cerussæ, singulorum p. viii. \*. papaveris lachrymæ p. xii. \*. aloes, æris combusti, cadmiæ, singulorum p. xv. \*. acaciæ, stibii, gummi, singulorum p. xxv. \*

25. *De cicatricibus oculorum, qua ex ulceribus facta sunt, & de Asclepia, & Canopite, & Pyxino, collyriis.*

Factæ vero ex ulceribus cicatrices duobus vitiis periclitantur; ne aut cavæ, aut crassæ sint. Si cavæ sunt, potest eas implere id, quod Sphæriion vocari dixi; vel id, quod † Asclepias nominatur. Habet hoc papaveris lachrymæ p. ii. \*. sagapeni, opopanax, singulorum p. iii. \*. æruginis p. iv. \*. gummi p. viii. \*. piperis p. xii. \*. cadmiæ elotæ, cerussæ, singulorum p. xv. \*. At, si crassæ cicatrices sunt, extenuat vel Smilion, vel Canopite collyrium, quod habet cinnamomi, acaciæ, singulorum p. i. \*. cadmiæ elotæ, croci, myrrhæ, papaveris lachrymæ, gummi, singulorum p. ii. \*. piperis albi, thuris, singulorum p. iii. \*. æris combusti p. ix. \*. cum aqua pluviatili

† Marcell. de Medic. Lib. cap. 8. p. 266.

tili, Vel Euepidis Pyxinum, quod ex his  
constat: salis fossilis p. iv. \*. ammoniaci  
thymiamatis p. viii. \*. papaveris lachry-  
mæ p. xii. \*. cerussæ p. xv. \*. piperis albi,  
5 croci cilicii, singulorum p. l.ii. \*. gum-  
mi p. xiiii. \*. cadmiæ elotæ p. ix. \*. Ma-  
xime tamen tollere cicatricem videtur id,  
quod habet gummi p. iiii. \*. æruginis p.  
i. \*. crocomagmatis p. iv.

10 26. De alio genere Inflammationis oculorum.

Est etiam genus inflammationis, in qua, si  
cui tument ac distenduntur cum dolore  
oculi, sanguinem ex fronte mitti necessa-  
rium est: multaque aqua calida caput atque  
15 oculos fovere: gargarizare ex lenticula, vel  
ex fici cremore: inungi acribus medica-  
mentis, quæ supra comprehensa sunt; ma-  
ximeque eo, quod Sphæriion nominatur, 36r.  
quodque lapidem hæmatiten habet. Atque  
20 alia quoque utilia sunt, quæ ad extenuan-  
dam aspritudinem fiunt; de qua protinus  
dicam.

Hæc autem inflammationem oculorum  
fere sequitur; interdum major, interdum  
25 levior. Nonnunquam etiam ex aspritu-  
dine lippitudo fit, atque ipsam deinde aspri-  
tudinem auget, fitque ea in aliis bre-  
vis, in aliis longa, & quæ vix unquam fi-  
niatur.

30 In hoc genere valetudinis quidam cras-  
sas, durasque palpebras, & ficulneo folio,  
& asperato specillo, & interdum scalpello  
eradunt; versasque quotidie medicamen-  
tis suffricant. Quæ neque nisi in magna  
vetu-



364 A. CORN. CELSI Lib. 6.  
vetustaque aspritudine, neque sæpe facien-  
da sunt. Nam melius eodem ratione vi-  
ctus & idoneis medicamentis pervenitur.  
Ergo exercitationibus utemur, & balneo  
frequentiore; multaue oculorum palpe- 5  
bras aqua calida fovebimus: cibi autem su-  
mendi sunt acres & extenuantes.

27. † *Cæsarianum collyrium*

At medicamentum id, quod Cæsaria-  
num vocatur, habet atramenti sutorii p. 10  
i. \*. misyos p. \*. piperis albi p. v. \*. pa-  
paveris lachrymæ, gummi, singulorum p. ii.  
\*. cadmiæ lotæ p. iii. \*. stibii p. vi. \*.  
Satisque constat, hoc collyrium adversus  
omne genus oculorum valetudinis idoneum 15  
esse; exceptis his, quæ lenibus nutriuntur.

28. *Hieracis collyrium.*

Id quoque, quod Hieracis nominatur, ad  
aspritudinem potest. Habet myrrhæ p. i.  
\*, ammoniaci thymiamatis p. ii. \*. æru- 20  
ginis rasæ p. iv. \*. cum aqua pluviali. Ad  
idem idoneum est etiam id, quod Canopi-  
te, & id quod Smilion vocatur, & id quod  
Pyxinum, & id quod Sphæxion. Si au-  
tem composita medicamenta non adsunt, 25  
felle caprino, vel quam optimo melle satis  
commodo aspritudo curatur.

29. *De arida lippitudine.*

Est etiam genus aridæ lippitudinis, quod  
*ζηροφθαλμία* h Græci appellant. Sub hoc 30  
neque tument, neque fluunt oculi, sed ru-  
bent tantum, & cum dolore quodam fere  
levi ac prurigne graves sunt, & palpebræ  
citra

† Fortè à Cæsare Augusto ita dictum, si illud inde di-  
ctum, quod refert Marcell. de Med. c. 8. p. 266. h Aes-  
tuar. M. M. II, 7. Æginet. III, 22. Aëtius Tetr. II.  
Serm. III. c. 75, 77.

citra duritiem ullam noctu prægravi pituita in hærescunt: quantoque minor generi huic impetus, tanto finis minus expeditior est.

5 In hoc vitio multum ambulare, multum exerceri, lavari sæpe, ibique desudare, multaue fricatione uti necessarium est. Cibi neque qui implent, neque nimium acres, apti sunt, sed inter hos medii. Mane, ubi  
10 concoxisse manifestum est, non est alienum ex sinapi gargarizare, tum deinde caput atque os diutius perfricare.

30. *Rhinion collyrium.*

Collyrium vero hoc aptissimum est,  
15 quod Rhinion vocatur. Habet myrrhæ p. i. \*. papaveris lachrymæ, acaciæ succi, piperis, gummi, singulorum p. i. \*. lapidis hæmatitis, lapidis phrygii, lycii, lapidis scissilis, singulorum p. ii. \*. æris combusti  
20 sti p. iv. \*. Ac Pyxinum quoque eidem accommodatum est.

31. *De Scabris oculis. i*

Si vero scabri oculi sunt, quod maxime in angulis esse consuevit, potest prodesse  
25 Rhinion, id quod supra positum est. Potest similiter prodesse id, quod habet æruginis rasæ, piperis longi, papaveris lachrymæ, singulorum p. ii. \*. piperis albi, gummi, singulorum p. iv. \*. cadmiæ lotæ,  
30 cerussæ, singulorum p. vi. \*. Nullum tamen melius est, quam Euelpidis, quod βασιλικὸν nominabat. Habet papaveris lachrymæ, cerussæ, lapidis Afii, singulorum p. ii. \*. gummi p. xiii. \*. piperis albi p. iv. \*.  
croci

366 A. CORN. CELSI Lib. 6.  
croci p. VI. \*. pforici p. XIII. \*. Nulla  
autem per se materia est, quæ Pforicum  
nominetur; sed chalcitidis aliquid, & cad-  
miæ dimidio plus ex aceto simul conterun-  
tur, idque in vas fictile inditum, & con-  
tectum ficulneis foliis sub terra reponitur  
diebus viginti, & rursus sublatum teritur,  
& sic appellatur pforicum. Verum de ba-  
filico quoque collyrio convenit, ad omnes  
affectus oculorum id esse idoneum, qui 10  
non lenibus medicamentis curantur.

At, ubi non sunt medicamenta compo-  
sita, scabros angulos lævant & mel & vi-  
num. Succurritque & his & aridæ lippi-  
tudini, si quis panem ex vino subactum 17  
super oculum imponit. Nam, cum fere sit  
humor aliquis, qui modo ipsum oculum,  
modo angulos, aut palpebras exasperat,  
sic &, si quid prodit humoris, extrahitur;  
&, si quid juxta est, repellitur. 23

32. De Caligine oculorum.

Caligare vero oculi nonnunquam ex lip-  
pitudine, nonnunquam etiam sine hac,  
propter senectutem, imbecillitatemve aliam,  
consueverunt. Si ex reliquiis lippitu- 25  
dinis id vitium est, adjuvat collyrium,  
quod Asclepias nominatur. Adjuvat & id,  
quod ex crocomagmate fit.

362,  
23.

33. Διὰ πόνου collyrium. k

Proprie etiam ad id componitur, quod 30  
διὰ πόνου vocant. Habet piperis p. I. \*.  
croci cilicii, papaveris lachrymæ, ceruffæ,  
singulorum p. II. \*. pforici, gummi, singu-  
lorum p. IV. \*.

34. De

34. De Caligine propter senectutem, aut aliam imbecillitatem. l

At, si ex senectute aliave imbecillitate id est, recte inungi potest, & melle quam optimo, & cyprino, & oleo vetere. Commo-  
 5 diffimum tamen est, balsami partem unam, & olei veteris, aut ciprini partes duas, mel-  
 lis quam acerrimi partes tres miscere. Uti-  
 lia quoque huic medicamenta sunt, quæ ad  
 10 caliginem proxime, quæque ad extenuan-  
 das cicatrices supra comprehensa sunt. 362.

Cuicumque vero oculi caligabunt, huic opus erit multa ambulatione, atque exerci-  
 tatione, frequenti balneo, ubi totum qui-  
 15 dem corpus perfricandum est, præcipue tamen caput ex irino, donec infudet; ve-  
 landumque postea, nec detegendum, ante-  
 quam sudor & calor domi conquierint. Tum cibus utendum acribus, & extenuan-  
 20 tibus: interpositisque aliquibus diebus, ex sinapi gargarizandum.

35. De Suffusione oculorum. m

Suffusio quoque, quam Græci *ὑπόχυσις* nominant, interdum oculi pupillæ, qua  
 25 cernit, se opponit. Quod si inveteraverit, manu curandum est. Inter initia nonnun-  
 quam certis observationibus discutitur. Sanguinem ex fronte vel naribus mittere; 348, 29  
 in temporibus venas adurere; gargarizan-  
 30 do pituitam evocare; suffumigare; oculos acribus medicamentis inungere, expedit. Victus optimus est, qui pituitam extenuat.

36. De resolutione oculorum.

At ne resolutio quidem oculorum  
 (quam

l Oribas. de Loc. Affect. IV, 16. m Actuar. M. M. II, 7. IV, 11. Aënius Tetr. II, Serm. III, 49. Æginet. III, 22.

(quam *παράλυσις* Græci nominant) alio vitio modo, vel aliis medicamentis curanda est. Exposuisse tantum genus vitii satis est. Igitur interdum evenit, modo in uno oculo, modo in utroque, aut ex ictu aliquo, aut ex morbo comitiali, aut ex distentione nervorum, qua vehementer ipse oculus convulsus est, ut is neque quoquam intendi possit, neque omnino consistat; sed huc illucve sine ratione moveatur, ideoque ne conspectum quidem rerum præstet.

37. *De Mydriasi oculorum.* n

Non multum ab hoc malo distat id, quod *μυδρίασις* Græci vocant. Pupilla diffunditur & dilatatur, aciesque ejus hebescit, ac pene caligat. Difficillime genus id imbecillitatis eliditur. In utraque vero, id est paralyfi & mydriasi, pugnandum est per eadem omnia, quæ in caligine oculorum præcepta sunt paucis tantum mutatis: siquidem ad caput irino interdum acetum, interdum nitrum adjiciendum est; oculos vero melle inungi satis est. Quidam in posteriore vitio calidis aquis usi relevatique: quidam sine ulla manifesta causa subito obcæcati sunt. Ex quibus nonnulli, cum aliquandiu nihil vidissent, repentina profusione alvi, lumen receperunt. Quo minus alienum videtur, & recenti re & interposito tempore, medicamentis quoque moliri dejectiones, quæ omnem noxiam materiam in inferiora depellant.

38. *De imbecillitate oculorum.*

Præter hæc imbecillitas oculorum est,

cx

n Coel. Aurel. II, 1. p. 344. Aetuar. M. M. II, 7. & IV, 11. Æginet. III, 22. \* Aph. VI, 17.

366,  
21.

69, 21.  
354,  
27.



ex qua quidem interdum fatigati, o noctu nihil cernunt. quod in foeminam bene respondentibus menstruis non cadit. Sed sic laborantes inungi oportet sanguine jacinoris § (maxime hircini; sin minus, caprini) ubi id assum coquitur, excepto: atque edi quoque ipsum jecur debet. Licet tamen etiam iisdem medicamentis non inutiliter uti, quæ vel cicatrices, vel aspritudinem exte-  
 10 nuant. Quidam contrito femine portulacæ mel adjiciunt eatenus, ne id ex specillo distillet, eoque inungunt. Utendum vero est exercitationibus, balneo, & fricationibus.

15 39. *Ad Oculos, qui extrinsecus offenduntur, & sanguine suffusi sunt.*

Et hæc quidem in ipsis corporibus oriuntur. Extrinsecus vero interdum sic ictus oculum lædit, ut sanguis in eo suffundatur. Huic nihil commodius est, quam  
 20 sanguine vel columbæ, p vel palumbæ, vel hirundinis inungere. Neque id sine causa fit; cum harum acies extrinsecus læsa, interposito tempore in antiquum statum redeat, celerrimeque hirundinis. Unde etiam  
 25 locus fabulæ factus est, per parentes id herba restitui, quod per se sanescit. Eorum ergo sanguis nostros quoque oculos ab externo casu commodissime tuetur, hoc ordine, ut sit hirundinis optimus, deinde palumbæ, minimum efficax columbæ, & sibi ipsi, & nobis.

Supra percussum vero oculum, ad inflammationem leniendam, non est alienum

Aa

impo-

o *νικτάλωπας* vocant *Æginet. III, 21. Aëtiar. M. M. II, 7. IV, 11. Trallian. II, 6. Aëtius Tetr. II. Serm. III, 46. p Æginet. III, 22.*

imponere etiam cataplasmata. Sed sal armeniacus, vel quilibet alius quam optime teri debet, sic, ut ei paulatim oleum adjiciatur, donec crassitudo strigmenti fiat. Id deinde miscendum est cum hordeacea farina, quæ ex mulso decocta sit. Facile autem, recognitis omnibus, quæ medici quoque prodiderunt, apparere cuilibet potest, vix ullum ex iis, quæ supra comprehensa sunt, oculi vitium esse, quod non simplicibus quoque, & promptis remediis subinde removeri possit.

## C A P. VII.

## De aurium morbis. 9

15

**H**ACTENUS in oculis ea reperiuntur, in quibus medicamenta plurimum possunt: ideoque ad aures transeundum est; quarum usum proximum à luminibus natura nobis dedit. Sed in his aliquanto majus periculum est. nam vitia oculorum intra ipsos nocent: aurium inflammationes doloresque, interdum etiam ad demerentiam mortemque præcipitant. Quo magis inter initia protinus succurrendum est, ne majori periculo locus sit.

Ergo, ubi primum dolorem aliquis sensit, abstinere & continere se debet. Postero die, si vehementius malum est, caput tondere, idque irino unguento calido perungere, & operire. At magnus cum febre vigiliaque dolor exigit, ut sanguis quoque mittatur. Si id aliquæ causæ prohibent, alvus solvenda est. Cataplasmata quoque calida,

9 Seren. Sammon. XII. Æginet. III, 23. Trallian. III, 1. Aetuar. M. M. II, 6. IV, 10 Cœl. Aurelian. Tardar. Pass. L. II. c. 3.

calida, subinde mutata, proficiunt; sive foeni græci, sive lini, sive alia farina ex mulso decocta. Recte etiam subinde admoventur spongiæ, ex aqua calida expressæ.

5 Tum, levato dolore, ceratum circumdari debet ex irino, aut cyprino factum. In quibusdam tamen melius, quod ex rosa est, proficit. Si vehemens inflammatio somnum ex toto prohibet, adjici cataplasmati debent pa-  
10 paveris cortices fricti atque contriti sic, ut ex his pars dimidia sit; eaque tum simul ex passo vel mulso decoquuntur. In aurem vero infundere aliquod medicamentum oportet: quod semper ante \* tepesceri convenit,  
15 commodissimeque per † strigilem instillatur. ubi auris repleta est, super lana mollis addenda est, quæ humorem intus contineat. Et hæc quidem communia sunt.

Medicamentum vero est & rosæ, & ra-  
20 dicum arundinum succus, & oleum, in quo lumbrici cocti sunt, & humor ex amaribus nucibus, aut ex nucleo mali perfici expressus. Composita vero ad inflammationem doloremque leniendum hæc fere sunt: casto-  
25 rei, papaveris lachrymæ, pares portiones conteruntur, deinde adjicitur his passum. Vel papaveris lachrymæ, croci, myrrhæ par modus sic teritur, ut invicem modo rosa, modo passum instilletur. Vel id, quod  
30 amarum in ‡ Ægyptia faba est, conteritur, rosa adjecta. Quibus myrrhæ quoque paululum à quibusdam miscetur, vel papaveris lachrymæ, aut thus cum muliebri lacte, vel amararum nucum cum rosa succus. Vel ca-

Aa 2 storei,

\* Plin. de Re Med. L. 1. c. 9. † Formam exhibet Mercurial. in Art. Gymnast. ‡ Marcell. p. 284.

storei, myrrhæ, papaveris lachrymæ pares portiones cum passo. Vel croci p. i. \*. myrrhæ, aluminis scissilis, singulorum p. iiii. \*. quibus, cum teruntur, paulatim miscentur passi cyathi tres, mellis minus 5 cyatho. Idque ex primis medicamentis est. Vel papaveris lachryma ex aceto. Licet etiam compositione uti Themisonis; quæ habet castorei, opopanax, papaveris lachrymæ ex aceto, singulorum p. ii. \*. 10 spumæ nitri p. iv. \*. quæ contrita passo excipiuntur, donec cerati crassitudinem habeant; atque ita reponuntur. Ubi usus requirit, rursus id medicamentum, adjecto passo, pistillo teritur. Illud perpetuum 15 est, quotiescunque crassius medicamentum est, quam ut in aurem instillari possit, adjiciendum cum esse humorem, ex quo id componi debet, donec satis liquidum sit.

2. De Pure & malo odore aurium r. 20

Si vero pus quoque aures habent, recte lycium per se infunditur; aut irinum unguentum; aut porri succus cum melle; aut centaureæ succus cum passo; aut succus mali punici in ipsius cortice tepesfactus, 25 adjecta myrrhæ exigua parte. Recte etiam miscentur myrrhæ, quam *σαρκώ* cognominant, p. i. \*. croci tantundem, nuces amaræ xxv. mellis sesquicyathus. quæ contrita, cum utendum est, in cortice ma- 30 li punici tepesfiant. Ea quoque medicamenta, quæ oris exulcerati causa componuntur, æque ulcera aurium sanant. Quæ si vetustiora sunt, & multa sanies fluit, a-  
pta

r' Æginet. III, 23. Oribas. de Loc. Affe&. IV, 37. Aëtius Tetr. II. Serm. II. c. 83. Plin. de Re Medic. L. I. c. 111

pta compositio est, quæ ad authorem Erasistratum refertur. habet piperis, croci, singulorum, p. i. \*. myrrhæ, misy cocti, singulorum p. ii. \*. æris combusti p. ii. \*.  
5 hæc ex vino teruntur: deinde ubi inaruerunt, adjiciuntur passi heminæ tres, & simul incoquantur. Cum vero utendum est, adjicitur his mel & vinum. Est etiam Ptolemæi chirurgi medicamentum, quod habet lentisci, gallæ, singulorum p. i. \*. omphacii p. i. \*. succum punici mali. Est & Menophili validum admodum, quod ex his constat: piperis longi p. i. \*. castorei p. ii. \*. myrrhæ, croci, papaveris lachrymæ,  
15 nardi Syriaci, thuris, malicorii, ex Ægyptia faba partis interioris, nucum amararum, mellis quam optimi, singulorum p. iv. \*. Quibus, dum conteruntur, adjicitur acetum quam acerrimum, donec crassitudo in his passi fiat. Est & Cratonis: cinnamomi, cassiæ, singulorum p. i. \*. nardi, lycii myrrhæ, singulorum p. i. \*. aloes p. ii. \*. mellis cyathi tres, vini sextarius. Ex quibus lycium cum vino decoquitur; deinde  
25 de his alia miscentur. At si multum puris, malusque odor est, æruginis rasæ, thuris, singulorum p. ii. \*. mellis cyathi duo, aceti quatuor simul incoquantur. ubi utendum est, dulce vinum miscetur. Aut  
30 aluminis scissilis, papaveris lachrymæ, acaciæ succi par pondus miscetur, hisque adjicitur hyoscyami succi dimidio minor, quam unius ex superioribus, portio; eaque trita ex vino diluuntur. Per se quoque



que hyoscyami succus satis proficit.

3. *s* *Compositiones ad omnia aurium vitia.*

Commune vero auxilium aduersus omnes aurium casus, jamque usu comprobatum Asclepiades composuit. In eo sunt cinamoni, casia, singulorum p. i. \*. floris junci rotundi, castorei, piperis albi & longi, amomi, myrobalani, singulorum scrupuli duo, thuris masculi, nardi Syriaci, myrrhæ pinguis, croci, spumæ nitri, singulorum p. ii. \*. Quæ separatim contrita, rursus mixta, ex aceto conteruntur; atque ita condita, ubi utendum est, aceto diluuntur. Eodem modo commune auxilium auribus laborantibus est Polybi sphragis ex dulci vino liquata. Quæ compositio priori libro continetur.

268, 28.

Quod si & sanies profluit, & tumor est, non alienum est, mixto vino per oricularium clysterem eluere; & tum infundere vinum austerum cum rosa mixtum, cui spodii paululum sit adjectum, aut lycium cum lacte, aut herbæ sanguinalis succum cum rosa, aut mali punici succum cum exigua parte myrrhæ.

4. *De Ulcere sordido aurium.*

Si sordida quoque ulcera sunt, melius mulso eluuntur; & tum aliquod ex his, quæ supra scripta sunt, quod mel habeat, infunditur. Si magis pus profluit, & caput utique tondendum, & multa calida aqua perfundendum, & gargarizandum; & usque ad lassitudinem ambulandum, & cibo modico utendum est. Si cruor quoque ex ulceribus

*s* Scribon. Larg. c. V. Marcell. Empi. Cap. 9.

ceribus apparet, lycium cum lacte debet infundi; vel aqua, in qua rosa decocta sit, succo aut herbæ sanguinalis, aut acaciæ adjecto.

- 5 Quod si super ulcera caro t increvit, ea-  
que mali odoris, & sanguinem fundit, aqua  
tepida elui debet; tum infundi id, quod  
ex thure & ærugine, & aceto, & melle fit,  
aut mel cum ærugine incoctum. Squama  
10 quoque æris cum sandaracha contrita per  
fistulam recte instillatur.

5. *De Vermibus aurium.* u

- Ubi vero vermes orti sunt, si juxta sunt,  
protrahendi oriculario specillo sunt: si  
15 longius, medicamentis enecandi; caven-  
dumque, ne postea nascantur. Ad utrun-  
que proficit album veratrum cum aceto  
contritum. Elui quoque aurem oportet vi-  
no, in quo marrubium decoctum sit. Sic  
20 emortui vermes in primam auris partem  
prolabuntur, unde facillime educi possunt.

6. *Ad Compressa aurium foramina.*

- Si foramen auris compressum est, & in-  
tus crassa sanies subest, mel quam optimum  
25 indendum est. Si id parum proficit, mellis  
cyatho & dimidio, æruginis rasæ p. ii. \*.  
adjiciendum est, incoquendumque, & eo  
utendum. Iris quoque cum melle ad idem  
proficit. Item mellis & rosæ scrupuli duo.  
30 Item galbani p. ii. \*. myrrhæ cum melle,  
& fellis taurini, singulorum p. ii. \*. vini  
quantum satis est ad myrrham diluendam.

7. *Ad Gravem auditum.* x

Ubi vero gravius aliquis audire coepit

A a 4 (quod

t Aëtius Tetr. II. Serm. II. c. 84. u Aëtius Tetr. II.  
Serm. II. c. 85. de Locis Affect. IV, 40. x Aëtius Tetr.  
II, Serm. II, c. 79. Plin. de Re Medic. L. 1, c. 12.

(quod maxime post longos capitis dolores evenire consuevit) in primis aurem ipsam considerare oportet. Apparebit enim aut crusta, qualis super ulcera innascitur, aut sordium coitus. Si crusta est, infundendum est aut oleum calidum, aut cum melle ærugo, vel porri succus, aut cum mulso nitri paulum. Atque, ubi crusta ex auricula procidit, eluenda est aqua tepida; quo facilius ea per se diducta oriculario specillo protrahat. Si sordes exque molles sunt, eodem specillo eximendæ sunt. At, si duræ sunt, acetum & cum eo nitri paululum injiciendum est; cumque emollitæ sunt, eodem modo elui aurem, purgarique oportet. Quod si capitis gravitas manet, attondendum idem; & leniter, sed diu perfri- candum est, adjecto vel irino vel laureo oleo, sic ut utrilibet paululum aceti misceatur: tum diu ambulandum, leniterque post unctionem aqua calida caput fovendum: cibisque utendum ex imbecillissima & media materia; magisque assumendæ dilutæ potiones: nonnunquam gargari- zandum est \*. Infundendum autem in aurem castoreum cum aceto & laureo oleo & succo radiculæ corticis: aut cucumeris agrestis succus, adjectis rosæ foliis contritis. Immaturæ quoque uvæ succus cum rosa instillatus, adversus surditatem satis proficit.

#### 8. De Sonitu aurium. y

Aliud vitii genus est, ubi aures intra se ipsæ sonant. Atque hoc quoque fit, ne exter-

\* Aceto scil. Marcellus de Medic. p. 287. y A&uar. M. M. II, 6. IV, 10. Aëtius Tetr. II, Serm. II, c. 77. Trall. III, 3.

ternum sonum accipiant. Levissimum est,  
 ubi id ex gravedine est: pejus, ubi ex mor-  
 bo, capitivæ longis doloribus incidit: pes-  
 simum, ubi, magnis morbis venientibus,  
 5 maximeque comitali, provenit. Si ex  
 gravedine est, purgare aurem oportet, &  
 spiritum continere, donec inde humor ali-  
 quis exspumet. Si ex morbo vel capitis do-  
 lore, quod ad exercitationem, fricationem,  
 10 perfusionem, gargarizationemque pertinet,  
 eadem faciendæ sunt; cibis non utendum  
 nisi extenuantibus: in aurem dandus radi-  
 culæ succus cum rosâ, vel cum succo ra-  
 dicis ex cucumere agresti, vel castoreum  
 15 ex aceto, & laureo oleo. Veratrum quo-  
 que cum aceto conteritur, deinde mel-  
 le cocto excipitur, & deinde collyrium fa-  
 ctum in aurem demittitur. Si sine his cœ-  
 pit, ideoque novo metu terret, in aurem  
 20 dari debet castoreum cum aceto, vel irino,  
 vel laureo oleo; aut huic mistum casto-  
 reum cum succo nucum amararum; aut  
 myrrha & nitrum cum rosâ & aceto. Plus  
 tamen in hoc quoque proficit victus ratio:  
 25 eademque faciendæ sunt, quæ supra com-  
 prehendi, cum majore quoque diligentia:  
 & præterea, donec is sonus finiatur, à vino  
 abstinendum.

Quod si simul & sonus est, & inflamma-  
 30 tio, laureum oleum conjecisse abunde est,  
 aut id, quod ex amaris nucibus exprimi-  
 tur; quibus quidam vel castoreum, vel  
 myrrham miscent.

9. *Ad ea, quæ in aurem inciderunt, extrahenda.* z

Solet etiam interdum in aurem aliquid incidere, ut calculus, aliquodve animal. Si pulex intus est, compellendum eo lanæ paululum est; quo ipse si subit, & simul extrahitur. Si non est secutus, aliudve animal est, specillum lana involutum in resinam quam glutinosissimam, maximeque terebinthinam demittendum, idque in aurem injiciendum, ibique vertendum est. utique enim comprehendet & eximet. Sin aliquid exanime est, specillo oriculario protrahendum est, aut hamulo retuso paululum recurvato. Si ista nihil proficiunt, potest eodem modo resina protrahi. Sternutamenta quoque admota id commode elidunt, aut oriculario clystere aqua vehementer intus compulsa. Tabula quoque collocatur media, inhærens capitibus utrinque pendentibus, superque eam homo deligatur in id latus versus, cujus auris eodem modo laborat, sic ut extra tabulam non emineat: tum malleo caput tabulæ, quod à pedibus est, feritur; atque ita concussa aure, id quod inest, excidit.

## C A P. VIII.

### *De Narium morbis. a*

**N**ARES vero exulceratas fovere oportet vapore aquæ calidæ Id & \* spongia expressa atque admota fit, & subjecto vase oris angusti, calida aqua repleto. Post id fomentum, illinenda ulcera sunt, aut plumbi recremento, aut cerussa,

z Aëtius Tetr. II, Serm. II, c. 87. a Trallian. III, 8. Aëtuar. M. M. VI, 12. Aëtius Tetr. II, Serm. II, c. 90. \* Marcell. de Medic. C. x. pag. 288.



russa, aut argenti spuma. cum quodlibet horum aliquis conterit, ei, dum teritur, invicem vinum & oleum myrteum adjiciat donec mellis crassitudinem fecerit. Sin autem ea  
 5 ulcera circa os sunt, pluresque crustas & odorem foedum habent, quod genus Græci ἄζαινας appellunt; sciri quidem debet, vix ei malo posse succurri. Nihilominus tamen hæc  
 10 tentari possunt; ut caput ad cutem tondeatur, assidueque vehementer perfricetur, multaque calida aqua perfundatur: multa eidem ambulatio sit; cibus modicus, neque acer, neque valentissimus. Tum in narem ipsam  
 15 mæl cum exiguo modo resinæ terebinthinæ conjiciatur (quod specillo quoque involuto lana fit) attrahaturque spiritu is succus, donec in ore gustus ejus sentiatur. Sub his enim crustæ resolvuntur, quæ tum per  
 20 sternutamenta elidi debent. Puris ulceribus vapor aquæ calidæ subjiciendus est: deinde adhibendum aut lycium ex vino dilutum, aut amurca, aut omphacium, aut menthæ, aut marrubii succus; aut atramentum futorium, quod candefactum,  
 25 deinde contritum sit; aut interior scillæ pars contrita; sic ut horum cuilibet mel adjiciatur. Cujus in cæteris admodum exigua pars esse debet; in atramento futorio tanta; ut ea mistura liquida sit; cum scilla  
 30 utique pars major; involvendumque lana specillum est, & in eo medicamentum tingendum, eoque ulcera implenda sunt. Rursusque linamentum involutum & oblon-

b Oribas. de Loc. affect. IV, 45. Aëtius Tetrab. II, Serm. II, 91. Marcellus de Medic. Cap. x. *Odorem gravem vertit.* Vide H. F. ab Aquapendente Oper. Chir. P. I, c. 26.

380 A. CORN. CELSI Lib. 6.  
longum eodem medicamento illinendum,  
demittendumque in narem, & ab inferiore  
parte leniter deligandum. Idque per hie-  
mem & ver bis die; per æstatem & autum-  
num, ter fieri debet. 5

2. De Carnosis carunculis narium.

Interdum vero in naribus carunculæ  
quædam similes muliebribus mammis na-  
scuntur, hæque imis partibus, quæ car-  
tilaginosæ sunt, inhærent. Has curare o- 10  
portet medicamentis adurentibus; sub qui-  
bus ex toto consumuntur. Πρυπίς c vero  
est caruncula, modo alba, modo subrubra,  
quæ narium ossibus inhæret; & modo ad  
labra tendens narem implet, modo retro 15  
per id foramen, quo spiritus à naribus ad  
fauces descendit, adeo increscit, ut post  
uvam conspici possit; strangulatque homi-  
nem, maxime austro aut euro flante; fere-  
que mollis est, raro dura; eaque magis spi- 20  
ritum impedit, & nares dilatat; fereque  
καρκινώδης est, itaque attingi non debet. Il-  
lud aliud genus fere quidem ferro cura-  
tur; interdum tamen inarescit, si addita in  
narem per linamentum aut penicillum ea 25  
compositio est, quæ habet minii sinopici,  
chalcitidis, calcis, sandarachæ, singulorum  
P. I. \*. atramenti futorii P. II. \*.

441,  
30.

C A P I X.

d De Dentium dolore.

30

**I**N dentium autem dolore, qui ipse quo-  
que maximis tormentis annumerari po-  
test, vinum ex toto circumcidendum  
est;

c Æginet. III, 24. VI, 25. Actuar. M. M. II, 8. Aë-  
tius Tetrab. II. Serm. II. c. 92. d Trallian, III, 10. Coel.  
Aurelian. Morb. Chron. II, 4.

est: cibo quoque primo abstinendum, deinde eo modico mollique utendum, ne mandentis dentes irriter; tum extrinsecus admovendus per spongiam vapor aquæ calidæ; imponendumque ceratum ex cypri-  
 5 no aut irino factum, lanaque id comprehendendum, caputque velandum est. Quod si gravior dolor est, utiliter & alvus ducitur, & calida cataplasmata super maxillam  
 10 injiciuntur, & ore humor calidus cum medicamentis aliquibus continetur, sæpiusque mutatur. Cujus rei causa & \*quinquefolii radix in vino mixto coquitur; & hyocyami radix vel in posca, vel in vino mix-  
 15 to coquitur sic, ut paululum his salis adjiciatur; & papaveris non nimium aridi cortices, & mandragoræ radix, eodem modo. Sed in his tribus utique vitandum est, ne, quod haustum erit, devoretur. Ex populo  
 20 quoque alba cortex radicis in hunc usum in vino mixto recte coquitur, aut in aceto cornu cervini ramentum & nepeta cum teda ac ficu pingui: item ficus pinguis vel in mulso, vel in aceto & melle; ex quibus  
 25 cum ficus discocta est, is humor percolatur. † Specillum quoque lana involutum in calidum oleum demittitur, eoque ipse dens fovetur. Quinetiam quædam quasi cataplasmata in dentem ipsum induntur.  
 30 in quem usum ex malo punico acido atque arido malicorii pars interior cum pari portione & gallæ & pinei cortices conteritur, misceturque his minium; eaque contrita aqua pluviatili coguntur: aut panacis, pa-  
 paveris

\* Marcell. de Medic. C. XII. p. 293. 297.

† Auriscalpium dicit Marcell. de Medic. Cap. XII. p. 293.

paveris lachrymæ, peucedani, uvæ taminæ  
 sine feminibus pares portiones conterun-  
 tur: aut galbani partes tres, papaveris la-  
 chrymæ pars quarta. Quicquid dentibus  
 admotum est, nihilo minus supra maxil-  
 lam ceratum (quale supra posui) esse debet  
 lana obtectum. Quidam etiam myrrhæ,  
 cardamomi, singulorum P. I. \*. croci, pyre-  
 thri, ficorum, piperis, singulorum P. IV. \*.  
 sinapis P. VIII. \*. contrita linteolo illinunt, 10  
 imponuntque in humero partis ejus, [qua  
 dens dolet; si is superior est, à scapulis; si  
 inferior, à pectore: idque dolorem levat;  
 & cum levavit, protinus submovendum  
 est. 15

Si vero exesus e est dens, festinare ad exi-  
 mendum eum, nisi res coegit, † non est ne-  
 cesse: sed tum omnibus fomentis, quæ su-  
 pra posita sunt, adjiciendæ quædam valen-  
 tiores compositiones sunt, quæ dolorem 20  
 levant. quales hæ sunt, quæ habent papa-  
 veris lachrymæ P. I. \*. piperis P. II. \*. foreos  
 P. X. \*. quæ contrita galbano excipiuntur,  
 idque circumdatur: aut Menemachi, maxi-  
 me ad maxillares dentes; in qua sunt, croci 25  
 P. I. \*. cardamomi, thuris fuliginis, ficorum,  
 piperis, pyrethri, singulorum P. IV. \*. sinapis  
 P. VIII. \*. Quidam autem miscent pyrethri,  
 piperis, elaterii, singulorum P. I. \*. alumi-  
 nis scissilis, papaveris lachrymæ, uvæ ta- 30  
 minæ, sulphuris ignem non experti, bi-  
 tuminis, lauri baccarum, sinapis, singulo-  
 rum P. II. \*. Quod si dolor eximi eum co-  
 git, piperis semen cortice liberatum, & eo-  
 dem

e Oribas. de Loc. Affect. IV. 58. Aëtius Tetrab. II.  
 Serm. IV, c. 33. 34. † Ita sentit Marcellus de Medic.  
 Cap. XII, p. 293.

dem modo bacca \* hederæ coniecta in ejus  
 foramen, dentem findit, isque per testas ex-  
 cidet. Plani quoque piscis (quem nos pa-  
 stinacam, Græci *τρυγόν* vocant) aculeus tor-  
 5 retur, deinde conteritur, refinaque exci-  
 pitur, quæ denti circumdata hunc solvit.  
 Alumen quoque scissile in foramen conje-  
 ctum dentum citat. Sed id tamen involu-  
 tum in lanula demitti commodius est; quia  
 10 sic & dentem servat, & dolorem levat.  
 Hæc à Medicis accepta sunt: sed agrestium 324,  
 experimento cognitum est, cum dens do- 18.  
 luerit, herbam † mentastrum cum suis radi-  
 cibus evelli debere, & in pelvem mitti, su-  
 15 præque aquam infundi, collocarique juxta  
 sedentem hominem undique veste conte-  
 ctum; tum in pelvem candentes filices de-  
 mitti, sic, ut aqua tegantur, hominemque  
 eum hiante ore vaporem excipere, ut su-  
 20 pra dictum est, undique inclusum. Nam &  
 sudor plurimus sequitur; & per os conti-  
 nens pituita defluit; idque longiorem, sæpe  
 annuam valetudinem bonam præstat.

C A P. X.

25

De Tonsillis. a

445.

**S**I vero tonsillæ sine exulceratione per  
 inflammationem intumescunt, caput  
 quoque velandum est, & extrinsecus is  
 30 locus vapore calido fovendus; multa am-  
 bulatione utendum; caput in lecto subli-  
 me habendum; gargarizandumque reprimen-  
 tibus medicamentis. Radix quoque ea,  
 quam dulcem appellant, contusa & in passo mul-

\* Marcell. de Medic. Cap. XII. p. 296. † Idem eodem cap. p. 293. a Oribas. de Loc. Affect. IV, 70.



mulsove decocta, idem præstat. Leniter-  
 que quibusdam medicamentis eas illini  
 non alienum est; quæ hoc modo fiunt. Ex  
 malo b punico dulci succus exprimitur, &  
 ejus sextarius ad lenem ignem decoquitur, 5  
 donec ei mellis crassitudo sit; tum croci,  
 myrrhæ, aluminis scissilis, singulorum ꝑ.  
 ii. \*. per se conteruntur, paulatimque his  
 adjiciuntur vini lenis cyathi duo, mellis  
 unus; deinde priori succo ista miscentur, 10  
 & rursus leniter incoquantur: aut ejusdem  
 succi sextarius eodem modo coquitur, at-  
 que eadem ratione trita hæc adjiciuntur;  
 nardi ꝑ. \*. omphacii ꝑ. i. \*. cinnamomi,  
 myrrhæ, casia, singulorum ꝑ. i. \*. Ea- 15  
 dem autem hæc & auribus & naribus pu-  
 rulentis accommodata sunt. Cibus in  
 hac quoque valetudine lenis esse debet, ne  
 exasperet.

Quod si tanta inflammatio est, ut spiri- 20  
 tum impediatur, in lecto conquiescendum;  
 cibo abstinendum, neque assumendum  
 quicquam præter aquam calidam est: alvus  
 quoque ducenda est: gargarizandumque  
 ex fico & mulso: illinendumque mel cum 25  
 omphacio. extrinsecus admovendus, sed  
 aliquanto diutius, vapor calidus, donec ea  
 supparent, & per se aperiantur. Si pure  
 substantive non rumpuntur hi tumores, in-  
 cidendi sunt. deinde mulso calido garga- 30  
 rizandum.

At, si modicus quidem tumor, sed exul-  
 ceratio est, furfurum cremori ad gargari-  
 zandum paulum mellis adjiciendum est,  
 illi-

illinendaque ulcera hoc medicamento: passi quam dulcissimi tres heminæ ad unam coquuntur; tum adjicitur thuris p. i. \*. croci, myrrhæ, singulorum, p. \*. iterumque omnia ferveſcunt. Ubi pura ulcera sunt, eodem furfurum cremore, vel lacte gargarizandum est. Atque hic quoque cibus lenibus opus est; quibus adjici dulce vinum potest.

10

C A P. XI.

De Oris Ulceribus. 2

ULCERA autem oris, si cum inflammatione sunt, & parum pura ac rubicunda sunt, optime his medicamentis curantur, quæ supra posita ex malis punicis fiunt. Continendusque sæpe ore reprimens cremor est, cui paulum mellis sit adjectum: utendumque ambulationibus, & non acri cibo. Cum vero pura ulcera esse cœperunt, lenis humor, interdum etiam quam optima aqua ore continenda est. Prodestque assumptum purum vinum, pleniorque cibus, dum acribus, vacet: inspergigue ulcera debent alumine scissili, cui dimidio plus gallæ immaturæ sit adjectum.

Si jam crustas habent, quales in adustis esse consuerunt, adhibendæ sunt compositiones, quas Græci *αισθησις* nominant. † Habent hæ junci quadrati, myrrhæ, sandarachæ, aluminis, pares portiones: aut croci, myrrhæ singulorum p. ii. \*. iridis, aluminis scissilis, sandarachæ, singulorum p. iv. \*: junci quadrati p. viii. \*. aut gallæ,

B b

myr-

a Aëtius Tetrab. II. Serm. IV, c. 22. † Simile medicamentum vide apud Marcell. Cap. XI. p. 292. Plin. de Re Med. L. i. c. 31.

myrrhæ, singulorum p. 11. \*. aluminis scissilis p. 11. \*. rosæ foliorum p. 1v. \*. Quidam autem croci p. \*. aluminis scissilis, myrrhæ, singulorum p. 1. \*. sandarachæ p. 11. \*. junci quadrati p. 1v. \*. miscent. Priora arida insperguntur: hoc cum melle illinitur; neque ulceribus tantum, sed etiam tonsillis.

46. 17. Verum ea longe periculosissima sunt ulcera, quas ἀφθαῖς b Græci appellant; sed in c pueris, hos enim sæpe consumunt. in viris 10 & mulieribus idem periculum non est. Hæc ulcera à gingivis incipiunt; deinde palatum, totumque os occupant; tum ad uvam faucesque descendunt, quibus obsessis, non facile fit, ut puer convalescat. ac 15 98, 23. miserius etiam est, si lactens adhuc infans est; quo minus imperari remedium aliquod potest. Sed imprimis nutrix cogenda est exerceri ambulationibus, & his operibus, quæ superiores partes movent: mittenda 20 in balneum, jubendaque ibi calida aqua mammas perfundere: tum alenda cibus lenibus, & his qui non facile corrumpuntur: potione, si febricitat puer, aquæ: si sine febre est, vini diluti. ac, si alvus nutrici 25 subsistit, ducenda est. Si pituita in os ejus coit, vomere debet. Tum ipsa ulcera perungenda sunt melle, cui \* rhus quem Syriacum vocant, aut amaræ nuces adjectæ sunt: vel mistis inter se rosæ foliis aridis, nucleis 30 pini, mentha, collectis cum melle: vel eo medicamento, quod ex moris fit: quorum succus eodem modo, quo punici mali, ad mellis

b Æginet. I, 10. Aretæus Morb. Acut I, 9. Oribas. de Loc. Affect. Cur. IV. c. 68. Actuarius. M. M. II, 10. IV, 14. Aët. Tetr. II, Serm. I, 39. c Aph. III, 24. \* Salmas. de Homonym. Hyles Jatric. Cap. 58.

mellis crassitudinem coquitur, eademque ratione ei crocum, myrrha, alumen, vinum, & mel miscetur. Neque quicquam dandum, à quo humor evocari possit. Si vero jam firmior puer est; gargarizare debet his fere, quæ supra comprehensa sunt. Ac, si leniora medicamenta in eo parum proficiunt, adhibenda sunt ea, quæ adurendo crustas ulceribus inducant. Valens quoque est scissile alumen, vel chalcitis, vel atramentum sutorium. Prodest etiam fames & abstinentia, quanta maxima imperari potest. Cibus debet esse lenis. Ad purganda tamen ulcera, interdum caseus ex melle recte datur.

C A P. XII.

*De Lingua ulceribus. a*

LINGUAE quoque ulcera non aliis medicamentis egent, quam quæ prima parte superioris capitis exposita sunt. Sed quæ in latere ejus nascuntur, diutissime durant. Videndumque est, num contra dens aliquis acutior sit, qui sanescere sæpe ulcus eo loco non finit, ideoque limandus est.

C A P. XIII.

*a De Parulidibus & ulceribus gingivarum.*

SOLENT etiam interdum juxta dentes in gingivis tubercula quædam oriri dolentia; *παρυλίδα* Græci appellant. Hæc initio leuiter sale contrito perfricare oportet; aut inter se mixtis sale fossili com-

B b 2 busto,

a Actuar. M. M. II, 10. a Oribas. de Loc. Affect. IV, 66. Actuar. M. M. II, 10. IV, 14. Aëtius Tetr. II, Serm. IV, 24. Æginet. VI, 27.

busto, cupresso, nepeta; deinde eluere  
 os cremore lenticulæ, & inter hæc hiare,  
 donec pituitæ satis profluat. In majore  
 vero inflammatione iisdem medicamentis  
 utendum est, quæ ad ulcera oris supraposi- 5  
 ta sunt: & mollis linamenti paululum invol-  
 vendum aliqua compositione ex his, quas  
 385. *αινθηγες* b vocari dixi; demittendumque id  
 inter dentem & gingivam. Quod si durior  
 erit, & id prohibebit, extrinsecus admo- 10  
 vendus erit spongiæ vapor calidus, impo-  
 nendumque ceratum. Si suppuratio se offen-  
 det, diutius eo vapore utendum erit: erit &  
 continendum ore calidum mulsum, in quo  
 ficus decocta sit. Idemque subcrudum in- 15  
 cidendum, ne, si ibi diutius pus perman-  
 ferit, os lædat. Quod si major is tumor est,  
 commodius totus exciditur, sic ut ex utra-  
 que parte dens liberetur. Pure exempto,  
 si levis plaga est, satis est ore calidam aquam 20  
 continere, & extrinsecus fovere eodem  
 vapore: si major est, lenticulæ cremore uti,  
 iisdemque medicamentis, quibus cætera ul-  
 cera oris curantur.

Alia quoque ulcera in gingivis plerun- 25  
 que oriuntur, quibus eadem, quæ in reli-  
 quo ore, succurrunt. Maxime tamen man-  
 dere ligustrum oportet, succumque eum  
 ore continere. Fit etiam interdum, ut ex  
 gingivæ ulcere, sive *παρελίς* fuit, sive non 30  
 fuit, diutius pus feratur, dente aut corru-  
 pto, aut fracto, vel aliter vitiato osse:  
 maximeque id per fistulam evenire con-  
 suevit. Quod ubi incidit, locus aperiendus,

b Scribon. Larg. C. XII, c. 61.



dus, dens eximendus; testa ossis, si qua decessit, recipienda est; si quid vitiosi est, radendum. Post quæ, quid fieri debeat, supra in aliorum ulcerum curatione comprehensum est. Si vero à dentibus gingivæ recedunt, eadem antheræ succurrunt. Utile est etiam pira aut mala non permatura mandere, & ore eum humorem continere. Idemque præstare non acre acetum in ore retentum potest.

C A P. X V I,

*De Uvæ morbo. a*

**U**VÆ vehemens inflammatio terrere quoque debet. Itaque in hac abstinentia necessaria est, & sanguis recte mittitur; &, si id aliqua res prohibet, alvus utiliter ducitur: caputque super hæc velandum, & sublimius habendum est: tum aqua \* gargarizandum, in qua simul rubus & lenticula decocta sit. Illinenda autem ipsa uva vel omphacio, vel galla *b*, vel alumine scissili, sic ut cuilibet eorum mel adjiciatur. Est etiam medicamentum huic aptum, quod Andronium *c* appellatur. constat ex his; alumine scissili, squama æris rubri, atramento sutorio, galla, myrrha, misy. quæ per se contrita, mixtaque rursus paulatim adjecto vino austero, teruntur, donec his mellis crassitudo sit. Chelidoniæ quoque succo per cochlear illita uva maxime prodest. Ubi horum aliquo illita uva est, fere multa pituita decurrit: cumque ea quievit, ex vino calido gargarizandum.

Bb 3

Quod

*a* Oribaf. de Loc. Affect. Cur. IV, 73. \* Marcell. de Medic. Cap. XIV. pag. 299. *b* Scribon. Larg. C. XVII. c. 71. *c* Scribon. Larg. C. XIII. 63. Longe aliter existat apud Marcelli. de Medic. Cap. XI. pag. 292.

Quod si minor in ea inflammatio, laeserere, eique adjicere frigidam aquam satis est, eamque aquam cochleari exceptam ipsi uvæ subjicere. Ac mediocriter eam tummentem aqua quoque frigida, eodem modo subjecta, reprimit. Ex eadem autem aqua gargarizandum quoque est, vel cum laesere, vel sine eo. At curationis uvæ productæ per manum, ratio subjecta est.

## C A P. XV.

*De Cancro oris a*

SI quando autem ulcera oris cancer invasit, primo considerandum est, num malus corporis habitus sit, eique occurrendum: deinde ipsa ulcera curanda. Quod si in summa parte id vitium est, satis proficit anthera, humido ulceri arida inspersa; sicciore, cum exigua parte mellis illita. Si paulo altius, chartæ combustæ partes duæ, auripigmenti pars una. Si penitius malum descendit, chartæ combustæ partes tres, auripigmenti pars quarta aut pares portiones salis fricti, & iridis frictæ: aut etiam pares portiones chalcitidis, calcis, auripigmenti. Necessarium autem est linamentum in rosa tingere, & super adurentia medicamenta imponere; ne vicinum & sanum locum lædant. Quidam etiam in acris aceti heminam frictum salem conjiciunt, donec tabescere desinat; deinde id acetum coquunt, donec exiccetur; eumque salem contritum inspergunt. Quoties autem medicamentum injicitur, & ante & post

post os diluendum est vel cremore lenticulæ, vel aqua, in qua aut ervum, aut \*oleæ, aut verbenæ decoctæ sint, sic, ut cuilibet eorum paululum mellis misceatur. Acetum quoque ex scilla retentum ore, satis adversus hæc ulcera proficit: & ex aceto cocto sali, sicut supra demonstratum est, rursus mistum acetum sed & diu continere utrumlibet, & id bis aut ter die facere, prout vehemens malum est, necessarium est. Quod si puer est, cui id incidit, specillum lana involutum in medicamentum demittendum est, & super ulcus tenendum; ne per imprudentiam adurentia devoret. At, si dolor in gingivis est, moventurque aliqui dentes, refigi eos oportet. nam curationem vehementer impediunt. Si nihil medicamenta proficient, ulcera erunt adurenda. Quod tamen in labris ideo non est necessarium, quoniam excidere commodius est. Et id quidem, æque adustum, atque excisum, sine ea curatione, quæ corpori manu adhibetur, impleri non potest. Gingivarum vero ossa, quæ hebetia sunt, in perpetuum ustione nudantur. neque enim postea caro increfcit. Imponenda tamen adustis lenticula est, donec sanitatem, qualis esse potest, recipiant.

30 C A P. XVI.

De Parotidibus. a

**H**ÆC in capite tere medicamentis Hegent. Sub ipsis vero auribus oriri *παρωτίδης* solent; modo in secunda Bb 4 vale-

\* Marcell. de Medic. Cap. XI. pag. 292. a Oribas. de Loc. Affect. Cur. c. 44. Trallian. III, 7.

392 A. CORN. CELSI Lib. 6.  
valetudine, ibi inflammatione orta; modo  
post longas febres, illuc impetu morbi con-  
verso. Id abscessus genus est. Itaq; nullam  
novam curationem desiderat: animadversio-  
nem tantummodo hanc habet necessariam, 5  
ut, si sine morbo id intumuit, primum re-  
primentibus experimentum fiat: si ex ad-  
versa valetudine, illud inimicum est, ma-  
turarique & quam primum aperiri com-  
modius est. 10

### C A P. XVII.

#### *De Umbilico prominente. a*

**A**D umbilicos vero prominentes, ne  
manu ferroque utendum sit, ante 15  
tentandum est, ut abstineant. alvus  
his ducetur: imponatur super umbilicum  
id, quod ex his constat; cicutæ & fuliginis,  
singulorum p. i. \*. cerussæ elotæ p. iv. \*.  
plumbi eloti p. viii. \* ovis duobus; quibus 20  
etiam solani succus adjicitur. Hoc diutius  
impositum esse oportet; & interim conquie-  
scere hominem; cibo modico uti, sic ut vi-  
tentur omnia infantia.

### C A P. XVIII.

25

#### *De Obscœnarum partium vitiis.*

**P**ROXIMA sunt ea, quæ ad partes  
obscœnas pertinent. quarum apud  
Græcos vocabula & tolerabilius se ha- 30  
bent, & accepta jam usu sunt; cum in omni  
fere medicorum volumine atque sermone  
jactentur: apud nos foediora verba, ne con-  
suetudine quidem aliqua verecundius lo-  
quen-

a Æginet. VI, 51. Aëtius Tetr. I. Serm. IV, c. 26.  
& Tetr. IV, Serm. IV, 111. Oribas, de Loc. Affect. IV,  
c. 117.

quentium <sup>a</sup> commendata sunt: ut difficilis hæc explanatio sit, simul & pudorem, & artis præcepta servantibus. Neque tamen ea res à scribendo deterrere me debuit. Primum, ut omnia, quæ salutaria accepi, comprehenderem: dein, quia in vulgus eorum curatio etiam præcipue cognoscenda est, quæ invitissimus quisque alteri ostendit.

2. De Colis morbis.

10 Igitur si ex inflammatione <sup>b</sup> coles intumuit, reduciq; summa cutis, aut rursus induci non potest, multa calida aqua fovendus locus est. Ubi vero glans contacta <sup>472.</sup> est, oriculario quoque clystere inter eam <sup>22.</sup>  
 15 cutemque aqua calida inferenda est. si mollita sic & extenuata cutis reducenti paruit, expeditior reliqua curatio est: si tumor vicit, imponenda est vel lenticula vel marrubium, vel oleæ folia ex vino co-  
 20 cta, sic ut cuilibet eorum, dum teritur, mellis paululum adjiciatur: sursumque coles ad ventrem deligandus est: quod in omni curatione ejus necessarium est: isque homo continere se, & abstinere à cibo debet,  
 25 & potione aquæ tantum à siti vindicari. Postero die rursus adhibendum iisdem rationibus aquæ fomentum est, & tum vi quoque experiendum, an cutis sequatur: Eaque, si non parebit, leviter summa scal-  
 30 pello concidenda erit. nam, cum sanies profluxerit, extenuabitur is locus, & facilius cutis ducetur.

Sive autem hoc modo victa erit, sive nunquam repugnaverit; ulcera vel in cutis

B b 5 ulte-

<sup>a</sup> Alii *accommodata*. <sup>b</sup> Aëtius Tetr. IV, Serm. II, 16.



394      A. CORN. CELSI      Lib. 6.  
 ulteriore parte, vel in glande, ultrave eam  
 in cole reperientur: quæ necesse est, aut  
 pura siccaque sint, aut humida & purulen-  
 ta. Si sicca sunt, primum aqua calida fo-  
 venda sunt: deinde imponendum licium <sup>5</sup>  
 ex vino est, aut amurca cocta cum eodem,  
 aut cum rosa butyrum. Si tenuis iis hu-  
 mor inest, vino eluenda sunt; tum butyro  
 rosæ & mellis paululum, & resinæ terebin-  
 thinæ pars quarta adjicienda est, eoque <sup>10</sup>  
 utendum. At, si pus ex iis profluit, ante  
 omnia elui mulso calido debent: tum im-  
 poni piperis P. I. \*. myrrhæ P. II. \*. croci,  
 misyos cocti, singulorum P. II. \*. quæ ex <sup>15</sup>  
 vino austero coquantur, donec mellis cras-  
 situdinem habeant. Eadem autem compo-  
 sitio tonsillis, uvæ madenti, oris narium-  
 que ulceribus accommodata est. Aliud ad  
 idem, piperis P. I. \*. myrrhæ P. I. \*. croci  
 P. II. \*. misyos P. I. \*. æris combusti P. II. \*. <sup>20</sup>  
 quæ primum ex vino austero conteruntur;  
 deinde, ubi inaruerunt, iterum teruntur ex  
 passi tribus cyathis, & incoquantur, donec  
 visci crassitudinem habeant. Ærugo quo- <sup>25</sup>  
 que cum cocto melle, & ea, quæ ad oris ul-  
 cera supra comprehensa sunt, curant. At  
 Erasistrati compositio, aut Cratonis, recte  
 super purulenta naturalia imponitur. Folia  
 quoque oleæ ex novem cyathis coquan- <sup>30</sup>  
 tur; his adjicitur aluminis scissilis P. IV. \*.  
 lycii P. VIII. \*. mellis sesquicyathus: ac, si  
 plus puris est, id medicamentum ex mel-  
 le: si minus, ex vino diluitur. Illud perpe-  
 tuum est; post curationem, dum inflam-  
 matio

matio manet, quale suprapositum est, cataplasma super dare, & quotidie ulcera eadem ratione curare. Quod si pus & multum, & cum malo odore cœpit profluere, 5 elui cremore lenticulæ debet, sic, ut ei mellis paululum adjiciatur: aut oleæ aut lentisfolii, vel marrubium decoquendum est, eoque humore eodem modo cum melle utendum: imponendaque eadem; aut 10 etiam omphacium cum melle; aut id, quod ex ærugine & melle ad aures fit; aut compositio Andronis; aut anthera, sic, ut ei paululum mellis adjiciatur. Quidam ulcera omnia, de quibus adhuc dictum est, 15 lycio ex vino curant.

Si vero ulcus latius atque altius serpit, eodem modo elui debet: imponi vero, aut ærugo, aut omphacium cum melle; aut Andronis compositio; aut marrubii, myrrhæ, croci, 20 aluminis scissilis cocti, rosæ foliorum aridorum, gallæ, singulorum p. i. \*. minii finopici p. ii. \*. quæ per se singula primum teruntur; deinde juncta iterum, melle adjecto, donec liquidi cerati crassitudinem 25 habeant tum in æneo vase leniter coquuntur, ne superfluant; cum jam guttæ indurescunt, vas ab igne removetur: idque medicamentum tum prout opus est, aut ex melle aut ex vino liquatur. Idem autem per 30 se etiam ad fistulas utile est.

Solet etiam interdum ad nervos c ulcus descendere; profluitque multa pituita, sanies tenuis malique odoris, non coacta, at aquæ similis, in qua caro recens lota est: dolo-

doloresque is locus, & punctiones habet. Id genus quamvis inter purulenta est, tamen lenibus medicamentis curandum est; quale est emplastrum *τετραφάρμακον* ex rosa liquatum, sic, ut thuris quoque paululum ei misceatur: aut id, quod ex butyro, rosa, resina, melle fit; supra vero à me positum est. Præcipueque id ulcus multa calida aqua fovendum est, velandumque, neque frigori committendum. 10

Interdum autem per ipsa ulcera coles sub cute exesus est sic, ut glans excidat. Sub quo casu cutis ipsa circumcidenda est. Perpetuumque est, quoties glans, aut ex cole aliquid, vel excidit, vel abscinditur, illam esse servandam, ne confidat, ulcerique agglutinetur, ac neque reduci possit postea, & fortasse fistulam quoque urinæ intercludat. 15

Tubercula etiam, d quæ *φύμαλα* Græci vocant, circa glandem oriuntur; quæ vel medicamentis, vel ferro aduruntur; & cum crustæ exciderunt, squama æris inspergitur, ne quid ibi rursus increascat. 20

3. De Cancro, qui in Cole nascitur. 25

Hæc citra cancrum sunt; qui cum in reliquis partibus, tum in his quoque vel præcipue ulcera infestat. Incipit à nigritie, quæ si cutem occupavit, protinus specillum subjiciendum, eaque incidenda est; 30 deinde oræ yulsellaprehendendæ, tum, quicquid corruptum est, excidendum, sic, ut ex integro quoque paulum dematur, idque adurendum. Quoties quid ustum est, 1d

id quoque sequitur, ut imponenda lenticula sit: deinde, ubi crustæ exciderunt, ulcera sicut alia curentur.

At, si cancer ipsum colem occupavit, in-  
 5 spargenda aliqua sunt ex adurentibus, ma-  
 ximeque id, quod ex calce, chalcitide, au-  
 ripigmento componitur. Si medicamenta  
 vincuntur, hic quoque scalpello, quicquid  
 corruptum est, sic, ut aliquid secum inte-  
 10 gri trahat, præcidi debet. Illud quoque  
 æque perpetuum est; exciso cancro, vulnus  
 esse adurendum. Sed si ex medicamen-  
 tis, si ex ferro crustæ occalluerint, ma-  
 gnum periculum est, ne his decidentibus,  
 15 ex cole profusio sanguinis insequatur. Er-  
 go longa quiete & immobili pene corpore  
 opus est, donec ex ipso crustæ maturæ le-  
 niter resolvantur. At si vel volens aliquis,  
 vel imprudens, dum ingreditur immature,  
 20 crustas diduxit, & fluit sanguis, frigida 293,  
 aqua adhibenda est. Si hæc parum valet 20.  
 decurrendum est ad medicamenta, quæ  
 sanguinem supprimunt. Si ne hæc quidem  
 succurrunt, aduri diligenter & timide de-  
 25 bet: neque ullo postea motu dandus eidem  
 periculo locus est.

4. De Phagedana in Cole nascente.

Nonnunquam etiam id genus ibi cancri,  
 quod *Φαγιδάνα* à Græcis nominatur, oriri  
 30 solet. In quo minime differendum, sed pro-  
 tinus iisdem medicamentis occurrendum  
 est; & si parum valent, ferro adurendum.  
 Quædam etiam nigrities est, quæ non sen-  
 titur, sed serpit, ac, si sustinuerimus, usque  
 ad

ad vesicam tendit: neque succurri postea potest. Sed, si in summa glande circa fistulam urinæ est, prius in eam tenue specillum demittendum est, ne claudatur; deinde id ferro adurendum: si vero alte penetravit, quicquid occupatum est, præcidendum est. Cætera eadem, quæ in aliis cancriis facienda sunt.

5. *De Carbunculo, qui in Cole nascitur.*

Occallescit etiam in cole interdum aliquid; idque omni pene sensu caret. quod ipsum quoque excidi debet. Carbunculus autem ibi natus, ut primum apparet, oriculario clystere eluendus est: deinde ipse quoque medicamentis urendus, maximeque chalcitide cum melle, aut ærugine cum cocto melle, aut ovillo stercore fricco & contrito cum eodem melle. Ubi is excidit, liquidis medicamentis utendum est, quæ ad oras ulceris componuntur.

6. *De Testiculorum morbis.*

In testiculis vero, si qua inflammatio sine ictu orta est, sanguis ex talo mittendus est: à cibo abstinendum: imponendum, quod est ex fabæ farina ex mulso cocta, & cum cumino contrito ex melle coacta; aut contritum cuminum cum cerato ex rosa facta; aut lini semen frictum, contritum, & in mulso coctum; aut tritici farina ex mulso cocta cum cupresso; aut lilii radix contrita. At, si iidem induruerunt, imponi debet lini vel fœni Græci semen ex mulso coctum; aut ex cyprino ceratum; aut similia ex vino contrita, cui paululum croci sit adjectum.

e Aëtius Tetrab. IV. Serm. II, 18. f. Æginet. III, 54. Aëtius Tetr. IV, Serm. II, c. 21.



adjectum. Si vetustior jam durities est, maxime proficit cucumeris agrestis radix ex mulso cocta, deinde contrita.

Si ex ictu tument, sanguinem mitti necessarium est; magisque, si etiam livent. Imponendum vero utrumlibet ex his, quæ cum cumino componuntur, supraque posita sunt; aut ea compositio, quæ habet nistri cocti p. i. \* resinæ pineæ, cumini, singulorum p. ii. \*. uvæ taminæ sine seminibus p. iv. \*. mellis quantum satis sit ad ea cogenda. Quod si ex ictu testiculus aliquid defuit, fere quoque pus increfcit; neque aliter succurri potest, quam si, inciso scroto, & pus emissum, & ipse testiculus excisus est.

*7. De Ani morbis.*

*De Rhagadiis.*

Anus quoque multa tædiique plena mala recipit, nec à se multum abhorrentes curationes habet. Ac primum in eo sæpe, & quidem pluribus locis, cutis scinditur; ἡ ῥαγὰς Græci vocant. Id si recens est, quiescere homo debet, & in aqua calida desidere. Columbina quoque ova coquenda sunt, &, ubi induruerunt, purganda: deinde alterum jacere in aqua bene calida debet, altero calido foveri locus, sic, ut invicem utroque aliquandiu utatur. Tum tetrapharmacum, aut rhyodes rosa diluendum est; aut œsypum recens miscendum cum cerato liquido ex rosa facto; aut eidem cerato liquido plumbum elotum adjiciendum; aut resinæ terebinthinæ myrrha; aut

400 A. CORN. CELSI Lib. 6.  
aut spumæ argenti vetus oleum; & quo-  
libet ex his id perungendum. Si, quicquid  
læssum est, extra est, neque intus recondi-  
tum, eodem medicamento tinctum lina-  
mentum superdandum est, & quicquid an-  
te adhibuimus, cerato contegendum. In  
hoc autem casu, neque acris cibis uten-  
dum, neque asperis, nec alvum compri-  
mentibus: ne aridum quidem quicquam  
fatis utile est, nisi admodum paulum. Li-  
quida, lenia, pingua, glutinosa, meliora  
sunt. Vino leni uti nihil prohibet.

8. *De Condylomate.* h

494, 5. Condyloma autem est tuberculum,  
quod ex quadam inflammatione nasci solet. 15  
Id ubi ortum est, quod ad quietem, cibos,  
potionesque pertinet, eadem servari de-  
bent, quæ proxime scripta sunt. Iisdem  
etiam ovis recte tuberculum id fovetur.  
sed desiderare ante homo in aqua debet, in 20  
qua verbenæ decoctæ sunt ex reprimenti-  
bus: tum recte imponitur lenticula cum  
exigua mellis parte, fertula campana ex vi-  
no cocta, & rubi folia contrita cum cerato  
ex rosa facta; & cum eodem cerato con- 25  
tritum vel cotoneum malum, vel malico-  
rii ex vino cocti pars interior: & chalcitis  
cocta atque contrita, deinde cefypo ac ro-  
sa excepta; & ex ea compositione, quæ ha-  
bet thuris p. i. \*. aluminis scissilis p. ii. \*. 30  
cerussæ p. iii. \*. spumæ argenti p. v. \*.  
quibus, dum teruntur, invicem rosa & vi-  
num instillatur. Vinculum autem ei loco  
linteolum aut panniculus quadratus est,  
qui

h Aëtius Terr. IV, Serm. II, c. 3. Scribon. Larg. C.  
XC. Æginet. VI, 80.

qui ad duo capita duas ansas, ab altera vero parte totidem fascias habet: cumque subjectus est, ansis ad ventrem datis, à posteriore parte in eas adductæ fasciæ congiuntur, atque, ubi artatæ sunt, dexterior sinistra, sinisterior dextra procedit, circumdatæque circa alvum inter se novissime nodo deligantur. Sed, si vetus condyloma jam induruit, neque sub his curationibus desit, aduri medicamento potest, quod ex his constat; æruginis P. II. \* myrrhæ P. IV. \* gummi P. VIII. \* thuris P. XII. \* stibii, papaveris lachrymæ, acaciæ, singulorum P. XVI. \*. Quo medicamento quidam etiam ulcera, de quibus proxime dixi, renovant. Si id nondum in condylomate proficit, adhiberi possunt etiam vehementius adurentia. Ubi consumptus est tumor, ad medicamenta lenia transeundum est.

## 9. De Hemorrhoidibus. i

Tertium autem ani vitium est, ora venarum tanquam capitulis quibusdam turgentia, quæ sæpe sanguinem fundunt; *αιμορροΐδες* Græci vocant. Idque etiam in ore vulvæ foeminarum incidere consuevit. Atque in quibusdam parum tuto supprimitur; qui sanguinis profluvio imbecilliores non fiunt. habent enim purgationem hanc, non morbum. Ideoque curati quidam, cum sanguis exitum non haberet, inclinata in præcordia ac viscera materia, subitis & gravissimis morbis correpti sunt. Si cui vero id nocet, is desiderare in aqua ex

C c

ver-

verbenis debet : imponere maxime mali-  
 corium cum aridis rosæ foliis contritum ;  
 aut ex his aliqua , quæ sanguinem suppri-  
 munt. Solet autem oriri inflammatio, ma-  
 xime ubi dura alvus eum locum læsit. Tum 5  
 in aqua dulci desidendum est, & id foven-  
 dum ovis, imponendi vitelli cum rosæ fo-  
 liis ex passo k subactis: idque, si intus est,  
 digito illinendum ; si extra, superillitum  
 panniculo imponendum est. Ea quoque 10  
 medicamenta, quæ recentibus scissuris po-  
 sita sunt, hic idonea sunt. Cibis vero in  
 hoc casu iisdem, quibus in prioribus, uten-  
 dum est. Si ista parum juvant, solent im-  
 posita medicamenta adurentia ea capitula 15  
 absumere. At, si jam vetustiora sunt, sub  
 authore Dionysio inspergenda sandaracha  
 est : deinde imponendum, quod ex his  
 constat ; squamæ æris, auripigmenti, sin-  
 gulorum p. v. \*. saxi calcis p. viii. \*. po- 20  
 stero die acu compungendum. Aduftis ca-  
 pitulis fit cicatrix, quæ sanguinem fundi  
 prohibet. Sed, quoties is suppressus est, ne  
 quid periculi afferat, multa exercitatione  
 digerenda materia est: prætereaque & vi- 25  
 ris, & foeminis, quibus menstrua non pro-  
 veniunt, interdum ex brachio sanguis  
 mittendus est.

10. Si Anus, vel Os vulvæ procidit, qua  
 l. curatione utendum sit. 30

At, si anus ipse, vel os vulvæ procidit  
 (nam id quoque interdum fit) considerari  
 debet, purum ne id sit, quod provolutum  
 est, an humore mucoso circumdatum. Si  
 purum

k Alii subacto. l. Aeginet. III, 89. Aëtius Tetrab.  
 IV. Serm. II. 6. 7.

purum est, in aqua desidere homo debet, aut salsa, aut cum verbenis vel malicorio incocta. Si autem humidum, vino austero sublavandum est, illinendumque fece vini  
 5 combusta. Ubi utrolibet modo curatum est, intus reponendum est; imponendaque plantago contrita, vel folia salicis in aceto cocta; tum linteolum lana, eaque super deliganda sunt, cruribus inter se devinctis.

10 11. *De Fungo ani aut vulva.*

Fungo quoque simile ulcus in eadem sede nasci solet. Id, si hiems est, egelida; si aliud tempus, frigida aqua fovendum est; dein squama æris inspergenda, supraque  
 15 ceratum ex myrteo factum, cui paululum squamæ, fuliginis, calcis sit adjectum. Si hac ratione non tollitur, vel aliis medicamentis similibus, vel vehementioribus, ferro adurendum est.

10 C A P. XIX.

*De Digitorum ulceribus.*

**D**IGITORUM autem vetera ulcera commodissime curantur, aut lycio,  
 25 aut amurca cocta, cum utrilibet vinum adjectum est. In iisdem recedere caruncula ab unguibus cum magno dolore consuevit; *πτερύγιον* a Græci appellant. Oportet alumen Melium rotundum in  
 30 aqua liquare, donec mellis crassitudinem habeat: tum, quantum ejus aridi fuit, tantundem mellis infundere, & rudicula miscere, donec similis croco color fiat, eoque illinere. Quidam ad eundem usum deco-  
 C c 2 quere

a Æginet. IV, 81. VI, 85. Aëtius Tetrab. IV. Serm. II, c. 74.



464 A. CORN. CELSI Lib. 6.  
quere simul malunt, cum paria pondera  
aluminis aridi & mellis miscuerunt. Si  
hac ratione ea non exciderunt, excidenda  
sunt: deinde digiti fovendi aqua ex ver-  
benis, imponendumque super medicamen- 5  
tum ita factum: chalcitis, malicorium,  
squama æris excipiuntur fico pingui le-  
viter cocta & melle; aut chartæ combustæ,  
auripigmenti, sulphuris ignem non exper-  
ti par modus cerato miscetur ex myrteo 10  
facto; aut æruginis rasæ P. I. \*. squamæ  
æris P. II. \*. mellis cyatho coguntur; aut  
pares portiones miscentur, saxi calcis,  
chalcitidis, auripigmenti. Quicquid ho-  
rum impositum est, tegendum linteolo 15  
aqua madefacto est. Tertio die digitus re-  
solvendus, & si quid aridi est, iterum ex-  
cidendum, similisque adhibenda curatio  
est. Si non vincitur, purgandum est scal-  
pello, tenuibusque ferramentis adurendum, 20  
& sicut reliqua usta, curandum.

At, ubi scabriæ ungues sunt, circum ape-  
riri debent, qua corpus contingunt: tum  
super eos ex hac compositione aliquid im-  
poni; sandarachæ, sulphuris, singulorum 25  
P. II. \*. nitri, auripigmenti, singulorum  
P. IV. \*. resinæ liquidæ P. VIII. \*. tertio-  
que id die resolvendum est. Sub quo me-  
dicamento vitiosi ungues cadunt, & in  
eorum locum meliores renascuntur. 30

## LIBER

e Aëtius Tetrab. IV. Serm. II. c. 79.

## LIBER SEPTIMUS.

## P R Æ F A T I O.

5 *De Chirurgica, & qui in ea claruerint, & qualis esse Chirurgus debeat, & quid hoc in libro describatur.*

10 **T**ertiam esse medicinæ partem, quæ manu curet, & vulgo notum, & à me propositum est. Ea non quidem medicamenta atque victus rationem omittit; sed manu tamen plurimum præstat. estque ejus effectus inter omnes medicinæ partes  
 15 **e**videntissimus. Si quidem in morbis cum multum a fortuna conferat †, eademque sæpe salutaria, sæpe vana sint; potest dubitari, secunda valetudo medicinæ, an corporis beneficio contigerit. In his quoque, in quibus  
 20 medicamentis maxime utimur, quamvis profectus evidentior est, tamen sanitatem & per hæc frustra quæri, & sine his reddi sæpe, manifestum est. Sicut in oculis quoque deprehendi potest; qui à medicis diu vexati, sine his interdum sanescunt. At in ea  
 25 parte, quæ manu curat, evidens est, omnem profectum, ut aliquid ab aliis adjuvetur, hinc tamen plurimum trahere. Hæc autem pars, cum sit vetustissima, magis ta-  
 30 **m**en ab illo parente omnis medicinæ Hippocrate, quam à prioribus exulta est. Deinde, posteaquam diducta ab aliis habere professores suos cœpit, in Ægypto quoque increvit, Philoxeno maxime authore, qui  
 C c 3 plu-

a Hippocrat. de Arte. V. † remedia quidam adscripsit margini edit. Cæsar.

pluribus voluminibus hanc partem diligentissime comprehendit. Gorgias quoque & Softratus, & Herones & Apollonii duo, & Ammonius Alexandrinus, multique alii celebres viri, singuli quædam repererunt. § Ac Romæ quoque non mediocres professores, maximeque nuper \* Tryphon pater, & Euelpistus Phlegetis filius, &, ut ex scriptis ejus intelligi potest, horum eruditissimus Meges, quibusdam in melius mutatis, aliquantum ei disciplinæ adjecerunt. 10

Esse autem Chirurgus debet adolescens, aut certe adolescentiæ propior; manu strenua, stabili, nec unquam intremiscente, eaque non minus sinistra, quam dextra 15 promptus; acie oculorum acri, claraque; animo intrepidus, b immisericors, sic, ut sanari velit eum, quem accepit, non ut clamore ejus motus, vel magis, quam res desiderat, properet, vel minus, quam necesse est, 20 fecet; sed perinde faciet omnia, ac si nullus ex vagitibus alterius affectus oriretur.

Potest autem requiri, quod huic parti proprie vindicandum sit: quia vulnerum quoque ulcerumque multorum curationes, 25 quas alibi executus sum, Chirurgi sibi vendicant. Ego eundem quidem hominem posse omnia ista præstare concipio: atque, ubi se diviserunt, eum laudo, qui quamplurimum percipit. Ipse autem huic parti 30 ea reliqui, in quibus vulnus facit medicus, non accipit; & in quibus vulneribus ulceribusve plus profici manu, quam medicamento, credo: tum, quicquid ad ossa pertinet.

\* Rhod. ad Scrib. Larg. pag. 291. b Theodorat. Græc. Affect. I. pag. m, 4.

tinet. Quæ deinceps exequi aggrediar, dilatatisque in aliud volumen ossibus, in hoc cætera explicabo: præpositisque his, quæ in qualibet parte corporis fiunt, ad ea, quæ  
5 proprias sedes habent, transibo.

C A P. I.

*De Vexatis. a*

10 **V**EXATA igitur in quacunque parte corporis sint, quamprimum sic curari debent, ut, qua dolor est, ea scalpello cutis crebro incidatur, de-  
15 tergeaturque eodem adverso profluens sanguis. quod si paulo tardius subvenitur, jamque etiam rubor est; qua rubet corpus: si tumor quoque accessit, quacunque is est, id idem optimum auxi-  
20 lium est. Tum superdanda reprimentia sunt; maximeque lana succida ex b aceto & oleo. Quod si levior is casus est, possunt etiam, sine scalpello, imposita eadem m-  
25 deri. Et, si nihil aliud est, cinis quoque; maxime ex sarmentis: si is non est, quilibet alius ex aceto, vel etiam ex aqua coactus.

C A P. II.

30 *De his, quæ per se intumescunt, quomodo incidenda, & curanda sint.*

**V**ERUM hoc quidem promptum est. In his autem negotium majus est, quæ per se, vitio intus orto, intumescunt, & ad suppurationem spectant.

Cc 4

Ea

a Aëtius Tetrab, IV, Serm, II, 68. b Aëtuar. M. M. IV, 16.

Ea omnia genera abscessuum esse alias proposui, medicamentaque his idonea executus sum: nunc superest, ut dicam, quæ in iis manu fieri debeant. Ergo, priusquam indurescant, cutem incidere, & cucurbitulam accommodare oportet; quod, quicquid illud malæ corruptæque materiæ coit, extrahat; idque iterum, tertioque recte fit, donec omne indicium inflammationis excedat. Neque tamen fas est, nihil à cucurbitula agere.

Interdum etiam fit, sed raro, ut quicquid abscedit, velamento suo includatur, id antiqui tunicam nominabant. Meges, quia tunica omnis nervosa est, dixit, non nasci sub eo vitio nervum, quo caro consumeretur, sed subjecto jam vetustiore pure, callum circumdari. Quod ad curationis rationem nullo modo pertinet; quia quicquid, si tunica est, idem, si callus est, fieri debet: neque ulla res prohibet, etiam si callus est, tamen, quia cingit, tunicam nominari: tum, pure quoque maturiore, hæc interdum esse consuevit. ideoque, quod sub ea est, extrahi per cucurbitulam non potest. sed facile id intelligitur, ubi nihil admota illa mutavit. Ergo, si id incidit, si jam durities est, in hac auxilii nihil est: sed, ut alias scripsi, vel avertenda concurrens eo materia, vel digerenda, vel ad maturitatem perducenda est. Si priora contigerunt, nihil præterea necessarium est. Si pus maturuit, in alis quidem & inguinibus raro secandum est: item ubicunque



que mediocris abscessus est: item quoties  
 in summa cute, vel etiam carne vitium est;  
 nisi festinare curandi imbecillitas cogit.  
 Satisque est cataplasmatibus efficere, ut per  
 5 se pus aperiatur. nam fere sine cicatrice po-  
 test esse is locus, qui expertus ferrum non  
 est. Si autem altius malum est, considera-  
 ri debet, nervosusne is locus sit, an non  
 sit. Nam, si sine nervis est, candenti ferra-  
 10 mento aperiari debet. cujus hæc ratio est,  
 quod exigua plaga diutius ad pus evocan-  
 dum pateat, parvaque postea cicatrix fit.  
 At, si nervi juxta sunt, ignis alienus est; ne  
 distendantur & membrum debilitent: ne-  
 15 cessaria vero opera \* scalpelli est. Sed cætera  
 etiam subcruda aperiari possunt; inter ner-  
 vos ultima expectanda maturitas est, quæ  
 cutem extenuet, eique pus jungat, quo  
 propius reperiatur. Jamque alia rectam  
 20 plagam desiderant, ut in carne: alia vero  
 vehementer cutem extenuant, in quibus  
 tota ea super pus excidenda est. Semper au-  
 tem, ubi scalpellus admovetur, id agendum  
 est, ut & quam minimæ & quam paucissimæ  
 25 plagæ sint: cum eo tamen, ut necessitati  
 succurramus, & in modo, & in numero.  
 Nam majores sinus, latius; interdum etiam  
 duabus, aut tribus lineis incidendi sunt. Dan-  
 daque opera, ut imus sinus exitum habeat;  
 30 ne quis humor intus subsidat, qui proxima  
 & adhuc sana rodendo finuet. Est etiam in  
 rerum natura, ut cutis latius excidenda sit.  
 Nam, ubi post longos morbos totius corpo-  
 ris habitus vitiatus est, lateque se sinus sus-

\* H. F. ab Aquapend. Chirurg. p. 442.

410 A. CORN. CELSI Lib. 7  
 fudit, & in eo jam cutis pallet; scire licet, eam  
 jam emortuam esse, & inutilem futuram.  
 Ideoque excidere commodius est: maxime,  
 si circa articulos majores id evenit, cuban-  
 temque ægrum fluens alvus exercuit, ne-  
 que per alimenta quicquam corpori acce-  
 dit. Sed excidi ita debet, ut plaga ad simi-  
 litudinem myrtei folii fiat, quo facilius sa-  
 nescat. Idque perpetuum est; ubicunque  
 medicus & quacunque de causa cutem ex-  
 cidit. Pure effuso, in alis vel inguinibus lina-  
 mento opus non est; sed spongia ex vino  
 imponenda est. In cæteris partibus, si æque  
 ea linamenta supervacua sunt, purgationis  
 causa paulum mellis infundendum; dein  
 glutinantia superdanda: si illa necessaria  
 sunt, super ea quoque similiter dari spon-  
 gia eodem modo ex vino expressa debet.  
 Quando autem linamentis opus sit, quan-  
 do non sit alias dictum est. Cætera eadem,  
 incisa suppuratione, facienda sunt, quæ,  
 ubi per medicamenta rupta est, facienda  
 esse proposui.

### C A P. III.

*De bonis, malisve signis Suppurationum.*

**P**ROTINUS autem, quantum curatio effi-  
 ciat, quantumque aut sperari aut time-  
 ri debeat, ex quibusdam signis intelli-  
 gi potest; fereque iisdem, quæ in vulneri-  
 bus exposita sunt. Nam bona signa sunt,  
 somnum capere, facile spirare, siti non con-  
 fici, cibum non fastidire, si febricula fuit, ea  
 vacare: itemque habere pus album, læve,  
 non

295,  
30.

25

30

non foedi odoris. Mala sunt, vigilia, spiritus gravitas, sitis, cibi fastidium, febris; pus nigrum, aut feculentum, <sup>a</sup> & foedi odoris: item procedente curatione eruptio  
 5 sanguinis; aut si, antequam sinus carne impleatur, oræ callosæ<sup>b</sup> fiunt, illa quoque ipsa <sup>300,</sup>  
 carne hebetæ, nec firma. Deficere tamen <sup>10.</sup>  
 animam vel in ipsa curatione, vel postea, pessimum omnium est. Quinetiam mor-  
 10 bus ipse, sive subito solutus est, dein suppuratio exorta est; sive effuso pure permanet, non injuste terret. Estque inter causas timoris, si sensus in vulnere rodentium non est. Sed ut hæc ipsa fortuna huc illucve  
 15 discernit; sic medici partium est, eniti ad reperiendam sanitatem. Ergo, quoties ulcus resolverit, eluere id, si reprimendus humor videbitur, vino & aqua pluviali mixto, vel aqua, in qua lenticula cocta sit,  
 20 debeat: si purgandum erit, mulso, rursusque imponere eadem. Ubi jam repressus videbitur humor, ulcusque purum erit, produci carnem conveniet, & foveri ulcus pari portione vini ac mellis, superque im-  
 25 poni spongiam ex vino & rosa tinctam. per quæ caro producitur. Plus tamen, ut alias quoque dixi, victus ratio eo confert. Ea est, solutis jam febribus & cibi cupiditate red-  
 30 gestatio; cibi portionesque corpori faciendo aptæ. Quæ omnia, per medicamenta quoque suppuratione rupta, sequuntur. Sed, quia magno malo vix sine ferro mederi licet, in hunc locum reservata sunt.

C A P.

<sup>a</sup> Aphor. VII, 44. <sup>b</sup> Aphor. VI, 4.

*De Fistulis.*

**A**DVERSUS fistulas quoque, si altius penetrant, ut ad ultimas demitti  
 a collyrium non possit, si tortuosæ sunt, si multiplices, majus in manu, quam in medicamentis, præsidium est; minusque operæ est, si sub cute transversæ feruntur, quam si recta intus tendunt. Igitur, si sub  
 10 cute transversa fistula est, demitti b specillum debet, supraque id ea incidi. Si flexus reperiuntur, hi quoque simul specillo & ferro persequendi sunt. Idemque faciendum, si plures se quasi rivuli ostendunt. 15  
 Ubi ad fines fistulæ ventum est, excidendus ex ea totus callus est, superque fibulæ dandæ, & medicamentum, quo glutinetur. At, si recta subter tendit, ubi, quo maxime ferat, specillo exploratum est; excidi is sinus  
 20 debet: dein fibula oris cutis injicienda est, eique glutinantia medicamenta superdanda sunt; aut, si corruptius ulcus est (quod interdum osse vitiato fit) ubi id quoque curatum est, pus moventia. 25

*2. De Costarum fistulis.*

Solent autem inter costas fistulæ subter ire. Quod ubi incidit, eo loco costa ab utraque parte præcidenda † & eximenda est, ne quid intus corruptum relinquatur. Solent  
 30 quoque, ubi costas transierunt, septum id, quod transversum à superioribus visceribus intestina discernit, violare. Quod intelligi potest & ex loco, & ex magnitudine doloris,

a *Æginet. IV. 49*, b *Aëtius Tetrab. IV, Serm. II, c 59*. † *H. F. ab Aquapendente Oper. Chirurg. P. I. c. 4.*

ris, & quia nonnunquam spiritus eò cum humore quasi bullante prorumpit, maximeque, si hunc ore ille continuit. In eo medicinæ locus nullus est. In cæteris vero, quæ circa costas sanabilia sunt, pingua medicamenta inimica sunt; cæteris, quæ ad vulnera accommodantur, uti licet: optime tamen sicca linamenta, vel, si purgandum aliquid videtur, in melle tincta imponuntur.

3. *De Ventris fistulis.*

Ventri nullum os subest; sed ibi perniciosæ admodum fistulæ fiunt: adeo ut Solstratus insanabiles esse crediderit. Id non ex  
 15 toto ita se habere usus ostendit. Et quidem, quod maxime mirum videri potest, tutior fistula est contra jecur, & lienem, & ventriculum, quam contra intestina: non  
 20 quo perniciosior ibi res sit; sed quo alteri periculo locum faciat. Cujus experimento moti quidam authores parum modum rei cognoverunt. Nam venter sæpe etiam telo perforatur, prolapsaque intestina conduntur, & oras vulneris futuræ comprehen-  
 25 dunt. quod quemadmodum fiat, mox indicabo. Itaque, etiam ubi tenuis fistula abdomen perripit, excidere eam licet, futuraque oras conjungere. Si vero ea fistula intus patuit, excisa necesse est latius  
 30 foramen relinquat. quod nisi permagna vi sui non potest; utique ab interiore parte, qua quasi membrana quædam finit abdomen, quam *περιτόναιον* Græci vocant. Ergo, ubi aliquis ingredi ac moveri coepit,  
 rum-



414 A. CORN. CELSI Lib. 7.  
rumpitur illa futura, atque intestina solvuntur. quo fit, ut pereundum homini fit. Sed non omnimodo res ea desperationem habet: ideoque tenuioribus fistulis adhibenda curatio est.

493.

4. De Ani fistulis. c

Propriam etiamnum animadversionem desiderant cæ, quæ in ano sunt. In has demisso specillo, ad ultimum ejus caput incidi cutis debet: dein novo foramine specillum educi lino sequente, quod in aliam ejus partem, ob id ipsum perforatam, coniectum fit. Ibi lino apprehendendum ligandumque cum altero capite est, ut laxa cutem, quæ super fistulam est, teneat. Idque \* lino debet esse crudum, & duplex triplexve, sic tortum, ut unitas in eo facta fit. Interim autem licet negocia agere, ambulare, lavare, cibum capere, perinde atque sanissimo. Tantummodo id lino bis in die, soluto nodo, ducendum est sic, ut subeat fistulam pars, quæ superior fuit. Neque committendum est, ut id lino putrescat: sed tertio quoque die nodus resolvendus est, & ad caput alterum recens lino alligandum, ductoque vetere, id in fistula cum simili nodo relinquendum. Sic enim id paulatim cutem, quæ supra fistulam est, incidit: simulque & id sanescit, quod à lino relictum est; & id, quod ab eo mordetur, inciditur. Hæc ratio curationis longa, sed sine dolore est.

Qui festinant, adstringere cutem lino debent, quo celerius secetur; noctuque ex peni-

c Æginet. VI. 78. H. F. ab Aquapendente Operat. Chirurg. P. 1. c. 93. Petr. de Marchettis Observ. Medic. Chirurgic. in fine multa. \* Quid sit docet H. F. ab Aquapend. Oper. Chirurg. Part. I. C. 93.

penicillo tenuia quædam intus demittere, ut cutis hoc ipso extenuetur, quo extenditur. sed hæc dolorem movent. Adjicitur celeritati, sicut tormento quoque, si & linum, & id, quod ex penicillo est, aliquo medicamento illinitur ex iis, quibus calum exedi proposui. Potest tamen fieri, ut ad scalpelli curationem etiam illo loco veniendum sit, si intus fistula fert, si multiplex est. Igitur in hæc genera demisso specillo, duabus lineis incidenda cutis est; ut media inter eas habenula tenuis admodum injiciatur, ne protinus oræ coeant; sitque locus aliquis linamentis, quæ quam paucissima superinjicienda sunt; omniaque eodem modo facienda, quæ in abcessibus posita sunt. Si vero ab uno ore plures sinus erunt, recta fistula scalpello erit incidenda; ab eo cæteræ, quæ jam patebunt, lino excipiendæ. Si intus aliqua procedet, quo ferrum tuto pervenire non poterit, collyrium demittendum erit.

Cibus autem in omnibus ejusmodi casibus, sive manu, sive medicamentis agetur, dari debet humidus; potio liberalis, diuque aqua. ubi jam caro increfcit, tum demum & balneis raris utendum erit, & cibis corpus implentibus.

C A P. V.

30 *De Telis è corpore extrahendis. a*

**T**ELA quoque, quæ illata corporibus intus hæserunt, magno negotio sæpe ejiciuntur. Sunt enim quædam difficultates

a Aeginet. VI, 88.

tates ex generibus eorum; quædam ex his  
 sedibus, in quas illa penetrarunt. Omne au-  
 tem telum extrahitur, aut ab ea parte, qua  
 venit, aut ab ea, in quam tetendit. illic  
 viam, qua redeat, ipsum sibi fecit: hic, à  
 scalpello accepit. nam contra mucronem  
 caro inciditur. Sed si non alte telum inse-  
 dit, & in summa carne est, aut certe ma-  
 gnas venas & loca nervosa non transit, ni-  
 hil melius est, quam, qua venit, id revelle-  
 re. Si vero plus est, per quod telo rever-  
 tendum, quam quod perrumpendum est;  
 jamque venas nervosque id transiit, com-  
 modius est aperire quod superest, b eaque  
 extrahere. nam & propius petitur, & tu-  
 tius evellitur. Et in majore membro, si  
 medium mucro transiit, facilius sanescit,  
 quod pervium est; quia utrinque medica-  
 mento fovetur. Sed, si retro telum reci-  
 piendum, amplianda plaga est; quo faci-  
 lius id sequatur, quoque minor oriatur in-  
 flammatio: quæ major fit, si ab illo ipso  
 telo, dum redit, corpus laniatur. Item, si  
 ex alia parte vulnus aperitur, laxius esse de-  
 bet, quam ut telo postea transeunte amplie-  
 tur. In summa autem utraque parte ista  
 habenda cura est, ne nervus, ne vena ma-  
 jor, ne arteria incidatur. Quorum ubi ali-  
 quid detectum est, excipiendum hamo re-  
 tuso est, abducendumque à scalpello. Ubi  
 autem incisum est satis, telum eximendum  
 est: tunc quoque eodem modo, & eadem  
 cura habita, ne sub eo, quod eximitur, ali-  
 quid eorum lædatur, quæ tuenda esse pro-  
 posui.

2. De

b Alii itaque.

## 2. De Sagittis recipiendis.

Hæc communia sunt: præter quæ propria quædam in singulis telorum generibus sunt, quæ protinus subjiciam. Nihil  
 5 tam facile in corpus, quam sagitta, conditur; eademque altissime insidit. Hæc autem eveniunt, & quia magna vi fertur illa, & quia ipsa angusta est. Sæpius itaque ab altera parte, quam ex qua venit, recipienda  
 10 est; præcipueque, quia fere spiculis cingitur; quæ magis laniant, si retro, quam si contra trahuntur. Sed inde, aperta via, caro diduci debet ferramento facto ad similitudinem Græcæ literæ *v*: deinde, ubi appa-  
 15 ruit mucro, si ei arundo inhæret, propelenda est, donec ab altera parte apprehendi & extrahi possit. Si jam illa decidit, solumque intus ferrum est; mucro vel digitis apprehendi, vel forcipe, atque ita educi  
 20 debet. Neque alia ratio extrahendi est, ubi ab ea parte, qua venit, evelli magis placuit. nam, ampliato magis vulnere, aut arundo, si inest, evellenda est; aut, si ea non est, ferrum ipsum. Quod si spicula apparue-  
 25 runt, eaque brevia & tenuia sunt, forcipe ibi comminui debent, vacuumque ab his telum educi: si ea majora valentioraque sunt, fissis scriptoriis calamis contegenda, ac, ne quid dilacerent, sic evellenda sunt.  
 30 & in sagittis quidem hæc observatio est.

## 3. De Latis telis educendis.

Latum vero telum, si aliquis intus in carne habuerit, ab altera parte educi non expedit; ne ingenti vulnere ipsi quoque

418 A. CORN. CELSI Lib. 7.  
ingens vulnus adjiciamus. Evellendum est  
ergo quodam genere ferramenti, quod  
*Διοκλής γροφίσκον* Græci vocant; quo-  
niam authorem Dioclem habet: quem in-  
ter priscos maximosque medicos fuisse, jam  
posui. Lamina est ferrea, vel ænea etiam,  
ab altero capite duos utrinque deorsum  
conversos uncas habens; ab altero duplica-  
ta lateribus, leviterque extrema eam in  
partem inclinata, quæ sinuata est; insuper  
etiam ea parte inclinata, quæ perforata est.  
Hæc juxta telum transversa demittitur:  
deinde, ubi ad manum mucronem ventum  
est, paululum torquetur, ut telum foramine  
suo excipiat: cum in cavo mucro est, illico  
duo digiti, subjecti partis alterius uncis, si-  
mul ferramentum id extrahunt, & telum.

4. De alio telorum genere.

Tertium genus telorum, quod inter-  
dum evelli debet, est plumbea glans, aut  
lapis, aut simile aliquid, quod, perrupta  
cute, integrum intus infedit. In omnibus  
his latius vulnus aperiendum, idque, quod  
inest, ea, qua venit, forcipe extrahendum  
est. Accedit vero aliquid difficultatis sub  
omni ictu, si telum vel ossi inhæsit, vel in  
articulo se inter duo ossa demersit. In osse  
usque eo movendum est, donec laxetur is  
locus, qui mucronem momordit; & tunc  
vel manu vel forcipe telum extrahendum est.  
quæ ratio quoque in dentibus ejiciendis est.  
Et vix unquam ita telum non sequitur.  
sed, si morabitur, excuti quoque cum ali-  
quo ferramento poterit. Ultimum est, ubi  
non



non evellitur, terebra juxta forare, & ab eo foramine, ad speciem literæ, contra telum os excidere sic, ut lineæ, quæ diducuntur, ad telum spectent: eo facto, id necesse est labet, & facile auferatur.

Inter duo vero ossa si per ipsum articulum perruperit, circa vulnus duo membra fasciis habenisve deliganda, & per has in diversas partes diducenda sunt, ut nervos distendant: quibus extentis, laxius inter ossa spatium est, ut sine difficultate telum recipiatur. Illud videndum est, sicut in aliis locis posui, ne quis nervus, aut vena, aut arteria à telo lædatur, dum id extrahitur: eadem scilicet ratione, quæ supra posita est.

5. *De venenato telo evellendo.*

At, si venenato quoque telo quis ictus est, iisdem omnibus, si fieri potest, etiam festinantius actis, adjicienda curatio est, quæ vel epoto veneno c, vel à serpente ictis adhibetur. Vulneris autem ipsius, extracto telo, medicina non alia est, quam quæ esset, si corpore icto nihil inhæssisset. de qua satis alio loco dictum est.

3051

C A P. VI.

*De Gangliis, & Meliceride, & Atheromate, a & Steatomate, capitis tuberculis.*

30

**H**Æc evenire in qualibet parte corporis possunt: reliqua certas sedes habent de quibus dicam, orsus à capite. In hoc multa variaque tubercula

D d 2

oriun-

oriuntur <sup>b</sup> γάγγλια, μελικηρίδας, & αἰθέρια  
μαῖα nominant; aliisque etiamnum voca-  
bulis quædam alii discernunt; quibus ego  
σκατάμαῖα quoque adjiciam. quæ quàmvis  
& in cervice, & in alis, & in lateribus ori- 5  
ri solent; per se tamen non posui; cum ista  
omnia mediocres differentias habeant, ac  
neque periculo terreant, neque diverso  
genere curentur. Omnia autem ista & ex  
parvulo incipiunt, & diu paulatimque in- 10  
crescunt, & tunica sua includuntur. Quæ-  
dam ex his dura ac renitentia, quædam  
mollia cedentiaque sunt: quædam spatio  
nudantur, quædam tecta capillo suo per-  
manent, fereque sine dolore sunt. Quid 15  
intus habeant, ut conjectura præfagiri po-  
test; sic ex toto cognosci, nisi cum ejecta  
sunt, non potest. Maxime tamen in his,  
quæ renitentur, aut lapillis quædam simi-  
lia, aut concreti confertique pili reperiu- 20  
tur. In his vero, quæ cedunt, aut melli si-  
mili aliquid, aut tenui pulticulæ, aut qua-  
si rasæ cartilagini, aut carni hebeti & cruen-  
tæ, quibus alii alique colores esse consue-  
verunt. Fereque ganglia renitentur: athe- 25  
romati subest quasi tenuis pulticula: meli-  
ceridi liquidior humor; ideoque pressu  
circumfluit: steatomati pingue quiddam,  
idque latissime patere consuevit, resolvit-  
que totam cutem superpositam sic, ut ea la- 30  
bet; cum in cæteris sit adstrictior. Omnia,  
derasa ante, si capillis conteguntur, per  
medium oportet incidere. ut effundatur,  
quicquid intus coit. Sed steatomatis tuni-

ca

288,  
32.

<sup>b</sup> Æginet. IV, 16, & VI, 39, Actuar. M. M. II, 11.

ca quoque secanda est: quia non e facile à cute & subjecta carne ea separatur. At in cæteris ipsa tunica inviolata servanda est. Protinus autem, cum ista alba & intenta se ostendit, tum scalpelli manubriolo diducenda à cute & carne est, ejiciendaque cum eo, quod intus tenet. Si quando tamen ab inferiore parte tunicæ musculus inhæsit, ne is lædatur, superior pars illius decidenda, alia ibidem relinquenda est. Ubi tota exempta est, committendæ oræ, fibulaque his injicienda, & super medicamentum glutinans dandum est. Ubi vel tota tunica, vel aliquid ex ea relictum est, pus moventia adhibenda sunt,

C A P. VII.

*De Oculorum vitiis, quæ scalpello & manu curantur.*

20 **S**ED ut hæc neque genere vitii, neque ratione curationis inter se multum distant: sic in oculis, quæ manum postulant, & ipsa diversa sunt, & aliter aliterque curantur. Igitur in superioribus palpebris vesicæ \* nasci solent, pingues gravesque; quæ vix attollere oculos sinunt, levesque pituitæ cursus, sed assiduos, in oculis movent. Fere vero in pueris nascuntur. Oportet, compresso digitis duobus oculo, atque ita cute intenta, scalpello transversâ linea incidere, suspensâ leviter manu, ne vesica ipsa vulneretur, & ut, loco ei patefacto, ipsa prorumpat; tum digitis eam apprehendere, & evellere. facile enim sequitur.

Dd 3 tur.

c Actuar. M. M. IV, 16. \* De hisce agit H. F. ab Aquapend. Oper. Chirurg. Part. 1. c. 9.

422 A CORN. CELSI Lib. 7.  
tur. Dein superinungi collyrio debet ex  
iis aliquo, quo lippientes oculi superinun-  
guntur: quo paucissimis diebus cicatricula  
inducitur. Molestius est, ubi incisa vesica  
est. effundit enim humorem; neque po-  
stea, quia tenuis admodum est, potest col-  
ligi. Si forte id incidit, eorum aliquid im-  
ponendum est, quæ puri movendo sunt.

2. De Crithe. a

In eadem palpebra super pilorum lo-  
cum tuberculum parvulum nascitur, quod  
à similitudine \* hordei, à Græcis κριθη no-  
minatur. Tunica quiddam, quod difficul-  
ter maturescit, comprehensum est. Id vel  
calido pane, vel cera subinde calefacta fo-  
veri oportet sic, ne nimius is calor sit, sed  
facile à parte sustineatur. hac enim ratio-  
ne sæpe discutitur, interdum concoquitur.  
Si pus se ostendit, scalpello dividi debet, &  
quicquid intus humoris est, exprimi: eo-  
dem deinde vapore postea quoque foveri,  
& superinungi, donec ad sanitatem perve-  
niat.

3. De Chalazio. b

Alia quoque quædam in palpebris huic  
non dissimilia nascuntur; sed neque utique  
figuræ ejusdem, & mobilia, simulatque di-  
gito huc vel illuc impelluntur. Quæ, quia  
grandini similia sunt, χαλαζια Græci vo-  
cant. Hæc incidi debent, si sub cute sunt,  
ab interiore parte; si sub cartilagine, ab  
interiore: dein scalpelli manubriolo dedu-  
cenda ab integris partibus sunt. Ac, si intus  
plaga est, inungendum primo lenibus,  
dein-

a Æginet. III, 22. A&uar. M. M. II, 7. \* Varulus  
dicitur Marcell. de Med. C. VIII. pag. 279. b A&uar.  
M. M. II, 7.

Cap. 7. MEDICINA. 423  
deinde acrioribus si extra, superdandum  
emplastrum, quo id glutinetur.

4. De Ungue oculorum. c

Unguis vero, quod *πτερόν* Græci vo-  
cant, est membranula nervosa, quæ oriens  
ab angulo, nonnunquam ad pupillam quo-  
que pervenit, eique officit. Sæpius à narium,  
interdum etiam à temporum parte nasci-  
tur. Hunc recentem non difficile est discu-  
tere medicamentis, quibus cicatrices in  
oculis extenuantur. Si inveteravit, jamque  
ei crassitudo quoque accessit, excidi debet.  
Post abstinentiam vero unius diei, vel ad-  
versus in sedili contra medicum is homo  
collocandus est, vel sic averfus, ut in gre-  
mium ejus caput resupinus effundat. Qui-  
dam, si in sinistro oculo vitium est, adver-  
sum: si in dextro, resupinum collocari  
volunt. Alteram autem palpebram à mini-  
stro diduci oportet, alteram à medico: sed  
ab hoc, si ille adversus est, inferiorem; si  
supinus, superiorem. Tum idem medicus  
hamulum acutum, paulum mucrone intus  
recurvato, subjicere extremo ungui debet,  
eumque infigere; atque eam quoque pal-  
pebram tradere alteri: ipse, hamulo appre-  
hensio, levare unguem, eumque acu traji-  
cere linum trahente: deinde acum ponere,  
lini duo capita apprehendere, & per ea  
erecto ungue, si qua parte oculo inhæret,  
manubriolo scalpelli diducere, donec ad an-  
gulum veniat: deinde invicem modo remit-  
tere, modo attrahere, ut sic & initium ejus, &  
finis anguli reperiatur. Duplex enim pericu-  
lum

D d 4

lum



424 A. CORN. CELSI Eib. 7.  
lum est; ne vel ex ungue aliquid relinqua-  
tur, quod exulceratum vix ullam recipiat  
curationem; vel ex angulo quoque carun-  
cula abscindatur, quæ, si vehementius un-  
guis ducitur, sequitur quoque ac decidit. §  
Si abscissa est, patet foramen, per quod  
postea semper humor descendit: d *πυκνάδα*  
Græci vocant. Verus ergo anguli finis uti-  
que noscendus est; qui ubi satis constitit;  
non nimium adducto ungue scalpellus ad- 10  
hibendus est; deinde sic excidenda mem-  
branula, ne quid ex angulo lædatur. Ei de-  
inde ex melle linamentum superdandum est,  
supraque linteolum, & aut spongia aut lana  
succida: proximisque diebus diducendus 15  
quotidie oculus est, ne cicatrice inter se pal-  
pebræ glutinentur (siquidem id quoque ter-  
tium periculum accedit) eodemque modo  
linamentum imponendum, ac novissime  
inungendum collyrio, quo ulcera ad cica- 20  
tricem perducuntur.

Sed ea curatio vere esse debet, aut  
certe ante hiemen. De qua re, ad plu-  
ra loca pertinente, semel dixisse satis erit.  
Nam duo genera curationum sunt: alia, 25  
in quibus eligere tempus non licet, sed  
utendum est eo, quod incidit; sicut in  
vulneribus, & fistulis: alia, in quibus nul-  
lus dies urget, & expectare tutissimum &  
facile est; sicut evenit in iis, quæ & tarde 30  
increscunt, & dolore non cruciant. In his  
ver expectandum est: aut, si quid magis pres-  
fit, melior tamen autumnus quam hiems vel  
æstas est; atque is ipse medius, jam fra-  
ctis

285, 5.

d *πυκνάδα* alii. Trallian. II, 8.

Etis æstibus, & nondum ortis frigoribus. Quo magis autem necessaria pars erit, quæ tractabitur, hoc quoque majori periculo subjecta est. & sæpe, quo major plaga facienda, eo magis hæc temporis ratio servabitur.

5. De Encanthide. \*

Ex curatione vero unguis, ut dixi, vitia nascuntur, quæ ipsa aliis quoque de causis  
 10 oriri solent. Interdum enim fit in angulo, parum ungue exciso, vel aliter, tuberculum, quod palpebras parum diduci patitur: *ἰγκανθίς* e Græce nōminatur. Excipi hamulo, & circumcidi debet: hic quoque dili-  
 15 genter temperata manu, ne quid ex ipso angulo abscindatur. Tum exiguum linamentum respergendum est vel cadmia, vel atramento sutorio; inque eum angulum, ductis palpebris, inserendum, supraque eodem modo deligandum: proximisque die-  
 20 bus similiter nutriendum, ut primo tantum aqua egelida, vel etiam frigida foveatur.

6. De Ancyloblepharo. †

Interdum inter se palpebræ coalescunt,  
 25 aperiri que non potest oculus. Cui malo solet etiam illud accedere, ut palpebræ cum albo oculi cohærescant; scilicet, cum in utrovis fuit ulcus negligenter curatum, sanescendo enim, quod diduci potuit &  
 30 debuit, glutinabitur; *ἀγκυλοβλέφαρον* sub utroque vitium Græci vocant. Palpebræ tantum inter se cohærentes, non difficulter diducuntur; sed interdum frustra. nam rursus glutinantur. Experiri tamen oportet;

\* Tulpius Observ. lib. 1. cap. 29. H.F. ab Aquapend. Oper. Chirurg. Part. 1. c. 19. e Æginet. III, 22. Actuar. M. M. IV, 11. † Æginet. III, 22. VI, 15.

tet; quia bene res sæpius cedit. Igitur † ad-  
 versum \* specillum inferendum, diducendæ-  
 que eo palpebræ sunt: deinde exigua peni-  
 cilla interponenda, donec exulceratio ejus  
 loci finiatur. At, ubi albo ipsius oculi palpe-  
 bra inhæsit, Heraclides Tarentinus author est,  
 adverso scalpello subsecare, magna cum mo-  
 deratione, ut neque ex oculo, neque ex pal-  
 pebra quicquam abscindatur; ac, si necesse  
 est, ex palpebra potius. Post hæc, inungatur 19  
 oculus medicamentis, quibus aspritudo cura-  
 tur: quotidieque palpebra vertatur, non so-  
 lum ut ulceri medicamentum inducatur, sed  
 etiam ne inhæreat: ipsique etiam ægro præ-  
 cipiatur, ut sæpe eam duobus digitis attollat. †  
 Ego sic restitutum esse neminem memini.  
 Meges se quoque multa tentasse, neque um-  
 quam profuisse, quia semper iterum oculo  
 palpebra inhæserit, memoriæ prodidit.

## 7. De Ægilope. 8

29

Etiamnum in angulo, qui naribus propior  
 est, ex aliquo vitio quasi parva fistula aperit-  
 tur, per quam pituita assidue destillat: *αιγιλωπα*  
 Græci vocant. Idque assidue male habet ocu-  
 lum: nonnunquam etiam exeso osse, usque 25  
 ad nares penetrat. Idque interdum naturam  
 carcinomatis habet: ubi intentæ venæ & re-  
 curvatæ sunt, color pallet, cutis dura est, &  
 levi tactu irritatur, inflammationemque in  
 eas partes, quæ conjunctæ sunt, evocat. Ex 30  
 his eos, qui quasi carcinoma habent, curare  
 periculosum est. nam mortem quoque ea res  
 ma-

† *Aversum* legendum esse constat ex H. F. ab Aquap.  
 Chirurg. Oper. Part. I, c. 7. qui meretur inspicere. \* Quid  
 sit docet H. F. ab Aquapend. Oper. Chir. Part. I. c. 7. p.  
 46. 2 Actuar. M. M. IV. 11. Aësius Terr. II. Serm. III,  
 86. H. F. ab Aquap. Oper. Chirurg. Part. I. c. 21.

maturat. Eos vero, quibus ad nares tendit, supervacuum. neque enim sanescunt. At, quibus id in angulo est, potest adhiberi curatio; cum eo, ne ignotum sit, esse difficilem. quanto autem angulo propius id foramen est, tanto difficilior est; quoniam perangustum est, in quo versari manus possit: recenti tamen re mederi facilius est. Hamulo autem summum ejus foraminis  
 10 excipiendum; deinde totum id cavum, sicut in fistulis dixi, usque ad os excidendum; oculoque & cæteris junctis partibus bene obtectis, os ferramento adurendum est vehementius. quod si jam carie vexatum est, quo crassior huic squama abscedat, quidam adurentia imponunt; ut atramentum sutorium, vel chalcitidem, vel æruginem rasam. quod & tardius & non idem facit. Os adusto, curatio sequitur  
 20 eadem, quæ in cæteris uestis.

8. *De Pilis palpebrarum oculum irritantibus.*

Pili vero, qui in palpebris sunt, duabus de causis oculum irritare consueverunt. Nam modo palpebræ summa cutis relaxatur, &  
 25 procidit; quo fit, ut ejus pili ad ipsum oculum convertantur, quia non simul cartilago quoque se remittit: modo sub ordine naturali pilorum alius ordo subcrefcit, qui protinus intus ad oculum tendit. Curationes vero hæ sunt. Si pili nati sunt, qui non debuerunt, tenuis acus h terrea ad similitudinem spathæ lata, in ignem conjicienda est: deinde candens, sublata palpebra sic, ut ejus perniciosi pili in conspectum curantis

h Æginet. VI, 13. H. F. ab Aquapend. Operat. Chir. Part. I, c. 12.



428            A. CORN. CELSI            Lib. 7.  
rantis veniant, sub ipsis pilorum radicibus  
angulo immittenda est, ut ea tertiam par-  
tem palpebræ transvehat: deinde iterum,  
tertioque ad alterum angulum. quo fit, ut  
omnes pilorum radices adustæ emorian- 5  
tur. Tum superimponendum medicamentum  
est, quod inflammationem prohibeat: at-  
que ubi crustæ exciderunt, ad cicatricem  
perducendum. Facillime autem id genus  
sanescit. Quidam aiunt, acu i transsui' juxta 10  
pilos exteriorem partem palpebræ oportere,  
eamque transmitti duplicem capillum mu-  
liebrem ducentem; atque ubi acus transit,  
in ipsius capilli finem, qua duplicatur, pi-  
lum esse injiciendum, & per eum in superio- 15  
rem palpebræ partem attrahendum, ibique  
corpori adglutinandum, & imponendum  
medicamentum, quo foramen glutinetur. sic  
enim fore, ut is pilus in exteriorem partem  
postea spectet. Id primum fieri non potest, 20  
nisi in pilo longiore; cum fere breves eo  
loci nascantur. Deinde si plures pili sunt,  
necesse est longum tormentum sit, & toties  
acus transiens magnam inflammationem  
moveat. Novissime, cum humor aliquis 25  
ibi subsit, oculo & ante per pilos & tum  
per palpebræ foramina affecto, vix fieri  
potest, ut gluten, quo vinctus est pilus, non  
resolvatur: eoque fit, ut is eo, unde vi  
abductus est, redeat. Ea vero curatio, quæ 30  
palpebræ laxioris ab omnibus frequenta-  
tur, nihil habet dubii. Siquidem oportet  
contecto oculo mediam palpebræ cutem,  
sive ea superior, sive inferior est, apprehen-  
dere



dere digitis, ac levare. tum considerare, quantulo detracto futurum fit, ut naturaliter se habeat. Siquidem hic quoque duo pericula circumstant: si nimium fuerit excisum, ne contegi oculos non possit; si parum, ne nihil actum sit, & frustra sectus aliquis sit. Quod deinde incidendum videbitur, per duas lineas atramento notandum est sic, ut inter oram, quæ pilos  
5 continet, & propiorem ei lineam, aliquid relinquatur, quod apprehendere acus postea possit. His constitutis, scalpellus adhibendus est: &, si superior palpebra est, ante; si inferior, postea propius ipsis pilis  
15 incidendum: initiumque faciendum in sinistro oculo, ab eo angulo, qui tempori; in dextro, ab eo, qui naribus propior est: idque, quod inter duas lineas est, excidendum. deinde oræ vulneris inter se simplici  
20 futura committendæ, operiendusque oculus est: &, si parum palpebra descendet, laxanda utique; si nimium, aut adstringenda, aut etiam rursus tenuis habenula ab ulteriore ora excidenda. Ubi secta est, aliæ  
25 turæ adjiciendæ, quæ supra tres esse non debent. Præter hæc, in superiore palpebra sub pilis ipsis incidenda linea est, ut ab inferiore parte diducti pili sursum spectent. Idque, si levis inclinatio est, etiam solum  
30 satis tuetur. Inferior palpebra eo non eget. His factis, spongia, ex aqua frigida expressa, super deliganda est. Postero die glutinans emplastrum injiciendum. Quarto sutura tollenda est, & collyrio, quod inflam-

matio-

mationes reprimat, superinungendum.

9. De Lagophthalmo. k

Nonnunquam autem, nimium sub hac  
 curatione excisa cute, evenit, ut oculus  
 non contegatur. Idque interdum etiam 5  
 alia de causa fit. *λαγώφθαλμιον* Græci appel-  
 lant. In quo si nimium palpebræ deest,  
 nulla id restituere curatio potest: si exi-  
 guum, mederi licet. Paulum infra super-  
 cilium cutis incidenda est lunata figura, 10  
 cornibus ejus deorsum spectantibus. Alti-  
 tudo esse plagæ usque ad cartilaginem \* de-  
 bet, ipsa illa nihil læsa. nam, si ea incisa est,  
 palpebra concidit, neque attolli postea po-  
 test. Cute igitur tantum diducta sit, ut pau- 15  
 lulum in ima oculi ora descendat; hiante  
 scilicet super plaga. in quam linamentum  
 injiciendum est, quod & conjungi didu-  
 ctam cutem prohibeat, & in medio carun-  
 culam creet: quæ ubi eum locum imple- 20  
 vit, postea recte oculus operitur.

10. De Entropio. l

Ut superioris autem palpebræ vitium  
 est, quo parum descendit, ideoque oculum  
 non contegit: sic inferioris, quo parum 25  
 sursum attollitur, sed pendet & hiat, neque  
 potest cum superiore committi. Atque id  
 quoque evenit interdum ex simili vitio  
 curationis, interdum etiam senectute. *εν-  
 τρόπιον* Græci vocant. si ex mala curatione 30  
 est, eadem ratio medicinæ est, quæ su-  
 pra posita est: plagæ tantum cornua ad  
 maxillas, non ad oculum convertenda  
 sunt. Si ex senectute est, tenui feramento  
 id

k *Æginet. VI, 10. Aëtius Tetr. II. Serm. III, c. 73.*

\* Vide H. F. ab Aquapend, *Oper. Chir. Part. I, c. 14.*  
 l *Actuar. M. M., II. 7.*

id totum extrinsecus adurendum est; deinde melle inungendum à quarto die, vapore aquæ calidæ fovendum, inungendumque medicamentis ad cicatricem perducentibus.

5

11. *De Staphylomate.*

Hæc fere circa oculum in angulis palpebrisque incidere consueverunt. In ipso autem oculo nonnunquam summa attollitur tunica, sive ruptis intus membranis aliquibus, sive  
10 laxatis †; & similis figura <sup>m</sup> acino fit. unde id *σάφυλωμα* Græci vocant. Curatio duplex est. Altera, ad ipsas radices per medium transfluere acu duo lina ducente; deinde alterius lini duo capita ex superiore parte, alterius ex inferiore adstringere inter se, quæ  
15 paulatim secando id excidant. Altera, in summa parte ejus ad lenticulæ magnitudinem excidere; deinde spodium aut cadmiam infricare. Utrolibet autem facto, album ovi  
20 lana excipiendum & imponendum; posteaque vapore aquæ calidæ fovendus oculus, & lenibus medicamentis unguendus est.

12. *De Clavis oculorum.*

Clavi autem vocantur callosa <sup>n</sup> in albo  
25 oculi tubercula; quibus nomen à figuræ similitudine est. Hos ad imam radicem perforare acu commodissimum est, infraque eam excidere, deinde lenibus medicamentis inungere.

30

13. *De Oculorum natura.*

Suffusionis jam alias feci mentionem; <sup>367,</sup>  
quia cum recens incidit, medicamentis <sup>23.</sup>  
quo-

† H. F. ab Aquapend. Oper. Chir. Part. I. c. 17. <sup>m</sup> Æginet. III, 22. VI, 19. Actuar. M. M. II, 7. Aëtius Tetrab. II. Serm. III. 34. 35. Aliud proidentiz genus observavit Tulpus Observ. L. I. cap. 28. <sup>n</sup> Actuar. M. M. II, 7.

432 A. CORN. CELSI Lib. 7.  
quæque sæpe discutitur. sed, ubi vetustior  
facta est, manus curationem desiderat. quæ  
inter subtilissimas haberi potest. De qua  
antequam dico, paucis ipsius oculi naturam  
indicanda est. Cujus cognitio, cum ad  
plura loca pertineat, tum vel præcipue ad  
hunc pertinet. Is igitur summam habet  
duas tunicas: ex quibus superior à Græcis  
*κεραλοειδης* vocatur; eaque, qua parte alba  
est, satis crassa, pupillæ loco extenuatur. 10  
Huic interior adjuncta est media parte, qua  
pupilla est, modico foramine concava, cir-  
ca tenuis, ulterioribus partibus ipsa quo-  
que plenior. quæ *χοειοειδης* à Græcis no-  
minatur. Hæ duæ tunicæ, cum inte- 15  
riora oculi cingant, rursus sub his coeunt;  
extenuatæque & in unum coactæ per fora-  
men, quod inter ossa est, ad membranam  
cerebri perveniunt, eique inhærescunt.  
Sub his autem, qua parte pupilla est, locus 20  
vacuus est: deinde infra rursus tenuissima  
tunica, quam Herophilus *αεραχνοειδης* nomi-  
navit. Ea media subsidit; eoque cavo con-  
tinet quiddam, quod, à vitri similitudi-  
ne, *υαλοειδης* Græci vocant. Id neque li- 25  
quidum, neque aridum est; sed quasi con-  
cretus humor. Ex cujus colore pupillæ  
color vel niger est, vel cæsius, cum summa  
tota tunica alba sit. Id autem superveniens  
ab interiore parte membranula includit. 30  
Sub his gutta humoris est, ovi albo similis:  
à qua videndi facultas proficiscitur. *κρυκαλοειδης*  
à Græcis nominatur.

## 14. De Suffusione.

369,  
18.

Igitur vel ex morbo, vel ex ictu concre-  
 scit humor sub duabus tunicis\*, qua locum  
 vacuum esse proposui; isque paulatim in-  
 5 durefcens, interiori potentia se opponit.  
 Vitii ejus plures species sunt, quaedam sana-  
 biles, quaedam quae curationem non ad-  
 mittunt. Nam si exigua suffusio est, si im-  
 mobilis, colorem vero habet marinae aquae,  
 10 vel ferri nitentis, à latere sensum aliquem  
 fulgoris relinquit, spes superest. Si magna  
 est, si nigra pars oculi, amissa naturali fi-  
 gura, in aliam se vertit, si suffusioni color  
 coeruleus est, aut auro similis, si labat, &  
 15 hac atque illac movetur, vix unquam suc-  
 curritur. Fere vero peior est, quo ex gra-  
 viore morbo, majoribusve capitis dolori-  
 bus, vel ictu vehementiore orta est. Neque  
 idonea curationi senilis aetas est; quae sine  
 20 novo vitio, tamen aciem hebetem habet:  
 ac ne puerilis quidem; sed inter has media  
 aetas. Oculus quoque curationi neque exi-  
 guus, neque concavus, satis opportunus  
 est. Atque ipsius quoque suffusionis quae-  
 25 dam maturitas est. Expectandum igitur est,  
 donec jam non fluere, sed duritie quadam  
 concrevisse videatur.

Ante curationem autem modico cibo  
 uti, bibere aquam triduo debet; pridie, ab  
 30 omnibus abstinere. Post hæc in adverso  
 sedili collocandus est loco lucido, lumine  
 adverso, sic ut contra medicus paulo altius  
 sedeat; à posteriore autem parte caput ejus,  
 qui curabitur, minister contineat, & im-

E e

mo-

\* Hoc non usque adeo veritati consentire putat H.  
 F. ab Aquapend. Oper. Chir. Part. 1. C. 16.



434 A. CORN. CELSI *Lib. 7.*  
mobile id præstet: nam levi motu eripi  
acies in perpetuum potest. Quin etiam ip-  
se oculus, qui curabitur, immobilior fa-  
ciendus est, super alterum lana imposita &  
deligata. Curari vero sinister oculus dex- 5  
tra manu, dexter sinistra debet. Tum acus  
admovenda est, aut acuta, aut certe non  
nimium tenuis, eaque demittenda, sed re-  
cta, est per summas duas tunicas medio  
loco inter nigrum oculi & angulum tem- 10  
pori propiorem, è regione mediæ suffusio-  
nis sic, ne qua vena lædatur. Neque ta-  
men timide demittenda est, quia inani lo-  
co excipitur, Ad quem cum ventum est,  
ne mediocriter quidem peritus falli potest; 15  
quia prementi nihil renititur. Ubi eo ven-  
tum est, inclinanda acus ad ipsam suffu-  
sionem est, leniterque ibi verti & paulatim  
eam deducere infra regionem pupillæ de-  
bet; ubi deinde eam transiit, vehementius 20  
imprimi, ut inferiori parte insidat. Si hæ-  
sit, curatio expleta est. Si subinde redit,  
eadem acu magis concidenda, & in plures  
partes dissipanda est: quæ singulæ & faci-  
lius conduntur, & minus late efficiunt. 25  
Post hæc educenda acus recta est, impo-  
nendumque est lana molli exceptum ovi  
album, & supra, quod inflammationem  
coerceat, atque ita devinciendum.

348,  
21.

Post hæc opus est quiete, abstinentia, 30  
lenium medicamentorum inunctionibus,  
cibo (qui postero die satis mature datur)  
primum liquido, ne maxillæ laborent;  
deinde, inflammatione finita, tali, qualis in  
vul-

Cap. 7. MEDICINA: 435  
vulneribus propositus: Quibus, ut aqua  
quoque diutius bibatur, necessario accedit.

15. De Pituita oculorum.. 347.

De pituitæ quoque tenuis cursu, qui  
5 oculos infestat, quatenus medicamentis  
agendum est, jam explicui. Nunc ad ea  
veniam, quæ curationem ex manu postu-  
lant. Animadvertimus autem quibusdam  
nunquam siccescere oculos, sed semper hu-  
10 more tenui madere: quæ res aspritudinem  
continuat, & ex levibus momentis inflam-  
mationes & lippitudines excitat, totam  
denique vitam hominis infestat. Idque in  
quibusdam nulla ope adjuvari potest, in  
15 quibusdam sanabile est. Quod primum dif-  
crimen nosse oportet, ut alteris succurra-  
tur, alteris manus non injiciatur.

Ac primum supervacua curatio est in  
his, qui ab infantibus id vitium habent;  
20 quia necessario mansurum est usque mor-  
tis diem. Deinde non necessaria etiam in  
his, quibus non multa, sed acris pituita est:  
siquidem manu nihil adjuvantur; medica-  
mentis, & victus ratione, quæ crassio-  
25 pituitam reddit, ad sanitatem perveniunt.  
Lata etiam capita vix medicinæ patent.  
Tum interest, pituitam emittant venæ,  
quæ inter calvariam & cutem sunt, an quæ  
inter membranam cerebri & calvariam:  
30 superiores enim per tempora oculos rigant;  
inferiores, per eas membranas, quæ ab  
oculis ad cerebrum tendunt. Potest autem  
adhiberi remedium his, quæ supra os fluunt;  
non potest his, quæ ab osse. Ac ne his qui-

436 A. CORN. CELSI *Lib. 7.*  
dem succurritur, quibus pituita utrinque  
descendit: quia levata altera parte, nihilo-  
minus altera infestat.

Quid sit autem, hac ratione cognoscitur.  
Raso capite ea medicamenta, quibus in lip- 5  
pitudine pituita suspenditur, à superciliis  
usque ad verticem illini debent: si ficci  
oculi esse cœperunt, apparet per eas venas,  
quæ sub cute sunt, irrigari: si nihilomi-  
nus madent, manifestum est sub osse de- 10  
scendere: si est tumor, sed levior, duplex  
vitium est. Plurimi tamen ex laborantibus  
reperiuntur, quos superiores venæ exerce-  
ant; ideoque pluribus etiam opitulari  
licet. Idque non in Græcia tantummodo, 15  
sed in aliis quoque gentibus celebre est:  
adeo ut nulla medicinæ pars magis per na-  
tiones quasque exposita sit.

Reperti in † Græcia sunt, qui novem li-  
neis cutem capitis inciderent: duabus in 20  
occipitio rectis, una super eas transversa:  
dein duabus super aures, una inter eas item  
transversa: tribus denique inter verticem  
& frontem rectis. Reperti sunt, qui à ver-  
tice recta eas lineas ad tempora deduce- 25  
rent; cognitisque, ex motu maxillarum,  
musculorum initiis, leviter super eos cu-  
tem inciderent, diductisque per retusos  
hamos oris, infererent linamenta sic, ut  
neque inter se cutis antiqui fines commit- 30  
terentur, & in medio caro increfceret, quæ  
venas, ex quibus ad oculos transfiret, adstrin-  
geret. Quidam etiam atramento duas li-  
neas duxerunt à media aure ad mediam al-  
teram

† H. F. ab Aquapendente Operat. Chirurgic.  
Part. I. c. 4.

teram aurem ; deinde à naribus ad verticem : tum ubi lineæ committebantur, scalpello inciderunt ; & post sanguinem effusum , os ibidem adufferunt. Nihilominus  
5 autem & in temporibus, & inter frontem atque verticem eminentibus venis idem candens ferrum admoverunt.

Frequens curatio est, venas in temporibus adurere, quæ fere quidem in ejusmodi  
10 malo tument: sed tamen, ut inflentur magisque se ostendant, cervix ante modice deliganda est. Tenuibus autem ferramentis, & retusis venæ adurendæ; donec in oculos pituitæ cursus conquiescat. Id enim signum  
15 est quasi excæcatorum itinerum, per quæ humor ferebatur.

Valentior tamen medicina est, ubi tennes conditæque venæ sunt, ideoque legi non possunt, eodem modo cervice deli-  
20 gata †, retentoque ab ipso spiritu, quo magis venæ prodeant, atramento notare eas contra tempora, & inter verticem ac frontem: deinde cervice resoluta, qua notæ sunt, venas incidere, & sanguinem mittere:  
25 ubi satis fluxit, tenuibus ferramentis adurere. contra tempora quidem, timide: ne subjecti muscoli, qui maxillas tenent, sentiant: inter frontem vero & verticem, vehementer sic, ut squama ab osse recedat.

30 Efficacior tamen etiamnum est Afrorum curatio, qui verticem usque ad os adurunt sic, ut squamam remittat. Sed nihil melius est, quam quod in Gallia quoque Comata fit, ubi venas in temporibus & in su-

Ec 3 periore

† H. F. ab Aquapendente Operat. Chirurg. Part. I. c. 3.

438 A. CORN. CELSI Lib. 7.  
periore capitis parte legunt. Aduſta quo mo-  
do curanda ſint, jam explicui. Nunc illud  
adjicio; neque ut cruſtæ decidant, neque ut  
ulcus impleatur, aduſtis venis, eſſe prope-  
randum; ne vel ſanguis erumpat, vel cito ſ  
pus ſupprimatur: cum per hoc ficceſcere  
eas partes opus ſit; per illud exhauriri  
opus non ſit. Si quando tamen ſanguis eru-  
perit, infrianda medicamenta eſſe, quæ  
ſic ſanguinem ſupprimant, ut ne adurant. 10  
Quemadmodum autem venæ deligendæ  
ſint, quidque lectis his faciendum ſit, cum  
uenero ad crurum varices, dicam.

#### C A P. VIII.

*De Aurium morbis, qui manu &  
ſcalpello curantur.* 15

**V**ERUM ut oculi multiplicem cu-  
rationem, etiam manus exigunt:  
ſic in auribus admodum pauca ſunt, 20  
quæ in hac medicinæ parte tractentur. So-  
let tamen evenire vel à prima natali die  
protinus, vel poſtea facta exulceratione,  
deinde per cicatricem aure repleta, ut fo-  
ramen <sup>a</sup> in ea nullum ſit, ideoque audiendi 25  
uſu careat. Quod ubi incidit, ſpecillo ten-  
tandum eſt, alte ne id repletum, an in ſum-  
mo tantum glutinatum ſit. Nam ſi alte  
eſt, prementi non cedit: ſi in ſummo, ſpe-  
cillum protinus recipit. Illud attingi non 30  
oportet; ne ſine effectus ſpe oriatur diſten-  
tio nervorum, & ex ea mortis periculum  
ſit: hoc facile curatur. Nam qua cavum  
eſſe debet, vel medicamentum aliquod  
impo-

<sup>a</sup> *Æginet. VI, 23.*



imponendum est ex adurentibus, vel candente ferro aperiendum, vel etiam scalpello incidendum. Cumque id patefactum, & jam ulcus purum est, injicienda eo pinna  
 5 est, illita medicamento cicatricem inducente: circaque id, medicamentum dandum, ut cutis circa pinnam sanescat; quo fit, ut ea remota, postea facultas audiendi sit.

- 10 At ubi aures perforatæ sunt, & offendunt, trajicere id cavum celeriter candente acu satis est, ut leniter ejus oræ exulcerentur; aut etiam adurente medicamento idem exulcerare: postea deinde imponere  
 15 id quod purget; tum quod eum locum repleat, & cicatricem inducat. Quod si magnum id foramen est, sicut solet esse in his, qui majora pondera auribus gesserunt, incidere, quod super est, ad extremum  
 20 oportet: supra deinde oras scalpello exulcerare, & postea fuere, ac medicamentum, quo id glutinetur, imponere. Tertium est, si quid ibi curti est, sarcire. quæ res cum in labris quoque & naribus fieri possit,  
 25 eandem autem curationem habeat, simul explicanda est.

C A P. I X.

30 *Curta in auribus, labrisque ac naribus, quomodo sarciri & curari possint. a*

CURTA igitur in his tribus, ac si qua parte parva sunt, curari possunt: si qua majora sunt, aut non accipiunt curationem, aut ita per hanc ipsam defor-

E e 4 man-

mantur, ut minus indecora ante fuerint. Atque in aure quidem & naribus deformitas sola timeri potest: in labris vero, si nimium contracta sunt, usus quoque necessario jactura fit; quia minus facile & cibibus assumitur, & sermo explicatur. Neque enim creatur ibi corpus; sed ex vicino adducitur. quod etsi in levi mutilatione, & nihil eripere, & fallere oculum potest; in magna, non potest. Neque senile autem corpus, neque quod mali habitus est, neque in quo difficulter ulcera sanescunt, huic medicinæ idoneum est; quia nusquam aut celerius cancer occupat, aut difficilius tollitur.

Ratio curationis ejusmodi est: id quod curtatum est, in quadratum redigere; ab interioribus ejus angulis lineas transversas incidere, quæ citeriorem partem ab ulteriore ex toto diducant; deinde ea, quæ sic <sup>b</sup> resolvimus, in unum adducere. Si non satis junguntur, ultra lineas, quas ante fecimus, alias duas lunatas, & ad plagam conversas immittere, quibus summa tantum cutis diducatur: sic enim fit, ut facilius quod adducitur, sequi possit. quod non vi cogendum est; sed ita adducendum, ut ex facili subsequatur, & dimissum non multum recedat.

Interdum tamen ab altera parte cutis haud omnino adducta deformem, quem reliquit locum, reddit. Hujusmodi loci altera pars incidenda, altera intacta habenda est. Ergo neque ex imis auribus, neque ex

me-

<sup>b</sup> Al. *repositimus.*

medio naso imisve narium partibus, neque  
 ex angulis labrorum quicquam attrahere  
 tentabimus. Utrinque autem petemus, si  
 quid summis auribus, si quid imis aut me-  
 5 diis naribus, aut mediis labris deerit. Quæ  
 tamen interdum etiam duobus locis curta-  
 ta esse consuerunt: sed eadem ratio curan-  
 di est. Si cartilago in eo, quod incisum est,  
 eminet, excidenda est: neque enim aut  
 10 glutinatur, aut acu tuto trajicitur. Neque  
 longe tamen excidi debet, ne inter duas  
 oras liberæ cutis utrinque coitus puris fie-  
 ri possit. Tum junctæ oræ inter se suendæ  
 sunt, utrinque cute apprehensa; & qua  
 15 priores lineæ sunt, ea quoque futuræ inji-  
 ciendæ sunt. Siccis locis, uti naribus illi-  
 ta spuma argenti, satis proficit. In interio-  
 res vero, lunatasque plagas, linamentum  
 dandum est; ut caro increfcens vulnus im-  
 20 pleat. Summaque cura, quod ita sutum est,  
 tuendum esse, apparere ex eo potest, quod  
 de cancro supra posui. Ergo etiam tertio  
 quoque die fovendum erit vapore aquæ  
 calidæ: rursusque idem medicamentum  
 25 injiciendum. quo fere septimo die glutina-  
 tum est. Tum futuræ eximi, & ulcus ad  
 sanitatem perduci debet.

C A P X.

30

*De Polypo. a*

**P**OLYPUM vero, qui in naribus nasci-  
 tur, præcipue ferro curari jam alias  
 posui. Ergo etiam hunc ferramento  
 acuto, in modum \* spathæ facto, resolvere

E e 5

ab

a Æginet. VI, 25. H. F. ab Aquapend. Oper. Chi-  
 rurg. Part. I, c. 24. 25. \* De hac consule Rhodium, ad  
 Scribon, Largum, pag. 46.

38a.

442 A. CORN. CELSI Lib. 7.  
ab offe oportet: adhibita diligentia, ne in-  
fra cartilago lædatur; in qua difficilis cu-  
ratio est. Ubi abscissus est, unco ferramen-  
to extrahendus est. Tum implicitum lina-  
mentum, vel aliquid ex penicillo resper- 5  
gendum est medicamento, quo sanguis  
supprimitur, eoque nares leniter implen-  
dæ. Sanguine suppresso, linamento ulcus  
purgandum est. Ubi purum est, eo pinna,  
eodem modo, quo in aure supra positum 10  
est, medicamento illita, quo cicatrix in-  
ducitur, intus demittenda, donec ex toto  
id sanescat.

439, 5.

## C A P. XI.

15

### De Ozæna.

379.

**I**D autem vitium, quod *ὄζαινα* à Græcis  
vocatur, si medicamentis non cederet,  
quemadmodum manu curandum esset, 20  
apud magnos Chirurgos non reperi. Cre-  
do, quia res raro ad sanitatem fatis proficit;  
cum aliquod in ipsa curatione tormentum  
habeat. Apud quosdam tamen positum est,  
vel subtilem † fistulam, vel eodem scripto- 25  
rium calamum \* in narem esse conjicien-  
dum, donec sursum ad os perveniat: tum  
per id tenue ferramentum candens dan-  
dum esse ad ipsum os: deinde adustum lo-  
cum purgandum esse ærugine & melle: 30  
ubi purus est, lycio ad sanitatem perdu-  
cendum. Vel narem incidendam esse ab  
ima parte ad os, ut & conspici locus possit,  
& facilius candens ferramentum admoveri.  
Tum sui narem debere; & adustum qui-  
dem

† *Fistilem* legit H. F. ab Aquapend. Oper. Chir. P. I. cap. 26. pag. 104. & 106. \* Hodierni Chirurghi ar-  
genteum habent. H. F. ab Aquap. Oper. Chirur. P. I. c. 26.

Cap. 12. MEDICINA. 443  
dem ulcus eadem ratione curari: futuram ve-  
ro illini vel spuma argenti, vel alio glutinante,

C A P. X I I.

5 De Oris vitiis, quæ manu &  
ferro curantur.

1. De Dentibus. a

381.

**I**N ore quoque quædam manu curantur.  
Ubi in primis dentes nonnunquam mo-  
10 ventur, modo propter radicum imbecil-  
litate, modo propter gingivarum mar-  
cescentium vitium. Oportet in utrolibet  
candens ferramentum gingivis admovere,  
ut leviter attingat, non ut infidat. Adustæ  
15 gingivæ melle illinendæ, & mulso eluen-  
dæ sunt. Ut pura ulcera esse cœperunt,  
arida medicamenta infrianda sunt ex his,  
quæ reprimunt.

Si vero dens dolores movet, eximique  
20 cum, quia medicamenta nihil adjuvant,  
placuit, circumradi debet, ut gingiva ab  
eo \* resolvatur; tum is concutiendus est.  
Eademque facienda, donec bene moveatur.  
nam dens hærens cum summo periculo  
25 evellitur, ac nonnunquam maxilla loco  
movetur †. Idque etiam majore periculo in  
superioribus dentibus fit; quia potest tem-  
pora oculosve concutere. Tum, si fieri po-  
test, manu; si minus, forcipe § dens exci-  
30 piendus est.

At si exesus est ante, id foramen vel b li-  
namento, vel bene accommodato plumbo  
replendum est, ne sub forcipe confringatur.

Recta

a Æginet. III, 26. \* Id sæpenumero sufficit teste Simone  
Paulo Quadr. Botan. pag. 151. † Imo pars avellitur,  
quod aliquando ipse vidi. § Vide figuram apud Rho-  
dium ad Scrib. Largum, pag. 94. b. Æginet VI, 28.



Recta vero forceps ducendus est, ne inflexis radicibus os raram, cui dens inhæret, parte aliqua frangatur. Neque ideo nullum ejus rei periculum est; utique in dentibus brevibus, qui fere longiores radices habent: sæpe enim forceps, cum dentem comprehendere non possit, aut frustra comprehendat, os gingivæ prehendit & frangit.

Protinus autem, ubi plus sanguinis profuit, scire licet, aliquid ex osse fractum esse. Ergo specillo conquirenda est testa, quæ recessit, & vulsella protrahenda est: si non sequitur, incidi gingiva debet, donec labans ossi testa recipiatur. Quod si fractum statim non est, sed intumescit extrinsecus maxilla, ut os hiare non possit, foris imponendum calidum ex farina & fico cataplasma est, donec ibi pus moveatur: tum incidi gingiva debet. Pus quoque multum profluens, ossis fracti nota est. Itaque etiam tum id extrahi convenit. Nonnunquam etiam, eo læso, fissura fit. quæ eradi debet.

Dens autem scaber, qua parte niger est, radendus est, illinendusque rosæ flore contrito, cui gallæ quarta pars & altera myrrhæ sit adjecta: continendumque ore crebro vinum meracum. Atque in eo casu velandum caput, ambulatione multa, frictione capitis, cibo non acri utendum est.

At, si ex ictu vel alio casu aliqui labant dentes, auro cum his, qui bene hærent, vinciendi sunt; continendaque ore reprimenda,

mentia, ut vinum, in quo malicorium decoctum, aut in quod galla candens coniecta sit. Si quando etiam in pueris ante dens nascitur, quam prior excidat, is, qui  
5 cadere debuit, circumradendus & evellendus est; is, qui natus est in locum prioris, quotidie digito adurgendus, donec ad justam magnitudinem perveniat. Quotiescunque dente exempto radix relicta est,  
10 protinus ea quoque ad id facto forcipe, quam *πιζάγγελον* \* Græci vocant, eximenda est.

2. De Tonsillis induratis. 383.

Tonsillas autem, quæ post inflammationes induruerunt, *αισιναιδες* autem à Græcis  
15 appellantur, cum sub levi tunica sint, oportet digito circumradere & evellere: si ne sic quidem resolvuntur, hamulo excipere, & scalpello excidere: tum ulcus aceto eluere, & illinire vulnus medicamento, quo  
20 sanguis supprimitur.

3. De Uva. 389.

Uva, si cum inflammatione descendit, dolorique est, & subrubicundi coloris, præcidi sine periculo non potest: solet enim  
25 multum sanguinem effundere, itaque melius est iis uti, quæ alias proposita sunt. Si vero inflammatio quidem nulla est, nihilominus autem ea ultra justum modum à pituita diducta est, & tenuis, acuta, alba  
30 est, præcidi debet. Itemque, si ima, livida & crassa; summa, tenuis est. Neque quicquam commodius est, quam vulsella apprehendere, sub eaque, quod volumus, excidere. Neque enim ullum periculum est,  
ne

\* Vide Rhodium ad Scrib. Largum, pag. 94.

446 A. CORN. CELSI Lib. 7.  
ne plus minusve præcidatur : cum liceat  
tantum infra vulsellam relinquere, quantum  
inutile esse manifestum est; idque præci-  
dere, quo longior uva est, quam esse natu-  
raliter debet. Post curationem eadem fa-  
cienda sunt, quæ in tonsillis proxime po-  
sui.

387.

#### 4. De Lingua.

Lingua vero quibusdam cum subjecta  
parte à primo natali die juncta est; qui ob 10  
id ne c loqui quidem possunt. Horum ex-  
trema lingua vulsella apprehendenda est,  
sub eaque membrana incidenda : magna  
cura habita, ne venæ, quæ juxta sunt, vio-  
lentur, & profusione sanguinis noceant. 15  
Reliqua curatio vulneris in prioribus po-  
sita est. Et plerique quidem, ubi confanue-  
runt, loquuntur. Ego autem cognovi, qui,  
succisa lingua, cum abunde super dentes  
eam promeret, non tamen loquendi facul- 20  
tatem consecutus est. Adeo in medicina,  
etiam, ubi perpetuum est, quod fieri de-  
bet, non tamen perpetuum est id, quod  
consequi convenit.

#### 5. De Abscessu sub lingua.\* 25

Sub lingua quoque interdum aliquid  
abscedit; quod fere consistit in tunica, do-  
loresque magnos movet. Quod si exiguum  
est, incidi semel satis est: si majus, summa  
cutis usque ad tunicam excidenda est; dein- 30  
de utrinque oræ hamulis excipiendæ, &  
tunica, undique circumdata, liberanda est:  
magna diligentia per hanc curationem ha-  
bita, ne qua major vena incidatur.

#### 6. De

c Æginet. VI, 29. \* H. F. ab Aquapend. Oper.  
Chirurg. Part. I. c. 36.

## 6. De Labris. d

Labra autem sæpe finduntur, eaque res  
habet cum dolore etiam hanc molestiam,  
quod sermo prohibetur; qui subinde eas  
5 rimas cum dolore diducendo sanguinem  
citatur. Sed has si in summo sunt, medica-  
mentis curare commodius est, quæ ad ul-  
cera oris fiunt: si vero altius descenderunt,  
necessarium est tenui ferramento adurere.  
10 quod spathæ simile, quasi transcurrere, non  
imprimi debet. postea facienda eadem sunt,  
quæ in naribus adustis exposita sunt.

## C A P. X I I I.

## De Cervicis vitio.

15

**A**T in cervice, inter cutem & asperam  
arteriam, tumor increfcit ( βρογχονή-  
λω a Græci vocant) quo, modo ca-  
ro hebes, modo humor aliquis, melli aquæ-  
20 ve similis, includitur; interdum etiam mi-  
nutis ossibus pili immisti. Ex quibus quic-  
quid est, quod tunica continetur, potest  
adurentibus medicamentis curari. Quibus  
summa cutis cum subjecta tunica b exuritur.  
25 quo factò, siue humor est, profluit; siue  
quid densius, digitis educitur: tum ulcus  
sub linamentis fanescit. Sed scalpelli cura-  
tio brevior est. Medio tumor una linea  
inciditur usque ad tunicam: deinde vitio-  
30 sus sinus ab integro corpore digito separa-  
tur, totusque cum velamento suo eximi-  
tur: tum aceto, cui vel salem vel nitrum  
aliquis adjecit, eluitur; oræque una futura  
junguntur; cæteraque eadem, quæ in aliis  
su-

d Oribas. de Loc. Affect. IV, 56. a Æginet. VI, 38.  
b Edit. Aldi, Steph. exeditur, Al. exuritur.

448 A. CORN. CELSI Lib: 7<sup>2</sup>  
futuris, superinjiciuntur: leniter deinde,  
ne fauces urgeat, deligatur. Si quando au-  
tem tunica eximi non potuerit, intus in-  
spargenda adurentia, linamentisque id cu-  
randum, & cæteris pus moventibus.

C A P. X I V.

De Umbilici vitiiis. a

392.

SUNT etiam circa umbilicum plura vi-  
tia; de quibus, propter raritatem, inter <sup>10</sup>  
autores parum constat. Verisimile  
est autem, id à quoque prætermisum,  
quod ipse non cognoverat: à nullo id, quod  
non viderat, fictum. Commune omnibus  
est, umbilicum indecore prominere. Causæ <sup>15</sup>  
requiruntur? Meges tres has posuit: modo  
intestinum eo irrumpere, modo omentum,  
modo humorem. Sostratus nihil de omen-  
to dixit. Duobus iisdem adjecit, carnem ibi  
interdum increfcere, eamque modo inte- <sup>20</sup>  
gram esse, modo carcinomati similem.  
Gorgias ipse quoque omenti mentionem  
omisit: sed eadem tria causatus, spiritum  
quoque interdum eo dixit irrumpere. He-  
ron omnibus his quatuor positis, & omenti <sup>25</sup>  
mentionem habuit, & ejus, quod simul &  
omentum & intestinum habuerit.

b Quod autem horum sit, his indiciis co-  
gnoscitur. Ubi intestinum prolapsum est,  
tumor neque durus, neque mollis est: om- <sup>30</sup>  
ni frigore minuitur; non solum sub omni  
calore, sed etiam retento spiritu crescit:  
sonat interdum; atque, ubi resupinatus est  
aliquis, relapso intestino, ipse desidit. Ubi  
vero

a Æginet. VI, 51. H. F. ab Aquapendente Oper.  
Chirurg. P. I. c. 52. b Ald, Steph. quid.



vero omentum est, cætera similia sunt, tumor mollior, & ab e ima parte extenuatus in verticem est; si quis apprehendit, elabatur. Ubi utrumque est, indicia quoque mixta sunt, & inter utrumque mollities. At caro durior est, semperque etiam resupinato corpore tumet, prementique non cedit, prioribus facile cedentibus. Si vitiosa est, easdem notas habet, quas in carcinomate exposui. Humor autem, si premittitur, circumfluit. At spiritus pressus cedit, sed protinus redit: resupinato quoque corpore tumorem in eadem figura tenet.

Ex his id, quod ex spiritu vitium est, medicinam non admittit. Caro quoque, carcinomati similis, cum periculo tractatur. itaque omittenda est. Sana excidi debet; idque vulnus linamentis curari. Humorem quidam vel inciso summo tumore effundunt, & vulnus iisdem linamentis curant. In reliquis variaz sententiaz sunt. Ac resupinandum quidem corpus esse, res ipsa testatur; ut in uterum, sive intestinum, sive omentum est, relabatur. Sinus vero umbilici, tum vacuus, à quibusdam duabus regulis excipitur; vehementerque earum capitibus deligatis, ibi emoritur: à quibusdam d ad imum acu trajectatur, duo lina ducente; deinde utriusque lini duobus capitibus diversæ partes adstringuntur, (quod in uva quoque oculi fit:) nam sic id, quod supra vinculum est, moritur. Adjecerunt quidam, ut antequam vincirent, summum una linea inciderent;

F f

quo

450 A. CORN. CELSI Lib. 7  
quo facilius digito demisso, quod illuc ir-  
rupisset, depellerent: tum deinde vincirent.  
Sed abunde est, jubere spiritum continere,  
ut tumor, quantus maximus esse potest, se  
ostendat: tum imam basim ejus atramento  
notare; resupinatoque homine, digitis tu-  
morem eum premere, ut, si quid relapsum  
non est, manu cogatur: post hæc, umbi-  
licum adtrahere, & qua nota atramenti est,  
lino vehementer adstringere: deinde par-  
tem superiorem aut medicamentis, aut fer-  
ro adurere, donec emoriatur: atque, ut  
cætera uita, ulcus nutrire. Idque non so-  
lum ubi intestinum, vel omentum, vel  
utrumque est; sed etiam, ubi humor est, 15  
optime proficit.

Sed ante quædam visenda sunt, ne  
quod ex vinculo periculum sit. Nam cu-  
rationi neque infans, neque aut robu-  
stus annis, aut senex aptus est; sed à septi- 20  
mo fere anno ad quartum decimum. Dein-  
de ei corpus idoneum est id, quod inte-  
grum est: at quod mali habitus est, quod-  
que papulas, impetigines, similiaque ha-  
bet, idoneum non est. Levibus quoque 25  
tumoribus facile subvenitur: at in eorum,  
qui nimis magni sunt, curatione pericu-  
lum est. Tempus autem anni & autumnale,  
& hibernum vitandum est. Ver ido-  
neum maxime est. Ac prima æstas non alie- 30  
na est. Præter hæc, abstinere pridie debet.  
Neque id fatis est: sed alvus quoque ei du-  
cenda est; quo facilius omnia quæ excesserunt,  
intra uterum confidant.

CAP.



452 A. CORN. CELSI Lib. 7.  
stero die rursus fistulam demittunt (quod  
recens vulnus paululum diductum patitur)  
ut, si quid humoris superest, emittatur:  
idque bis ita fecisse contenti sunt,

C A P. XVI.

5

*De Ventre ictu perforato, &  
Intestinis vulneratis. a*

**N**ONNUNQUAM autem venter ictu  
Naliquo perforatur; sequiturque, ut 10  
intestina evolvantur. Quod ubi in-  
cidit, protinus considerandum est, an inte-  
gra ea sint; deinde, an his color suus ma-  
neat. Si tenuius intestinum perforatum  
est, nihil profici posse, jam retuli. Latius 15  
intestinum sui potest: non quod certa fi-  
ducia sit; sed quod dubia spes, certa de-  
speratione sit potior. interdum enim gluti-  
natur. Tum, si utrumlibet intestinum livi-  
dum, aut pallidum, aut nigrum est, qui- 20  
bus illud quoque necessario accedit, ut sen-  
su careat, medicina omnis inanis est. Si  
vero adhuc ea sui coloris sunt, cum magna  
festinatione succurrendum est: momento  
enim alienantur externo & insueto spiritu 25  
circundata. Resupinandus autem homo  
est, coxis erectioribus; & si angustius vul-  
nus est, quam ut intestina commode refun-  
dantur, incidendum est, donec satis pateat.  
Ac, si jam sicciora intestina sunt, perluen- 30  
da aqua sunt, cui paululum admodum olei  
sit adjectum. Tum minister oras vulneris  
leniter diducere manibus suis, vel etiam  
duobus hamis, membranæ interiori inje-  
ctis,

a H. F. ab Aquapendente Operat. Chirurg. P. 1.  
c. 55.

ctis, debet: medicus priora semper intestina, quæ posteriora prolapsa sunt, condere sic, ut orbium singulorum locum fervet. Re-  
positis omnibus, leniter homo concutien-  
5 dus est. quo fit, ut per se singula intestina in suas sedes reducantur, & in his confidant. His conditis, omentum quoque confide-  
randum est: ex quo, si quid jam nigri & emortui est, forcice excidi debet: si quid  
10 integrum est, leniter super intestina reduci: futura autem, neque summæ cutis, neque interioris membranæ per se, satis proficit; sed utriusque. Et quidem è duobus  
linis faciendæ est, & spissior quam alibi;  
15 quia & rumpi facilius motu ventris potest, & non æque magnis inflammationibus pars ea exposita est. Igitur in duas acus fila conjicienda, eæque duabus manibus tenendæ; & prius interiori membranæ futura inji-  
20 cienda est sic, ut sinistra manus in dexteriore ora, dextra in sinisteriore à principio vulneris orsa, ab interiori parte in exteriorem acum immittat. quo fit, ut ab intestinis ea pars semper acuum longe sit, quæ  
25 acuta; propinqua, quæ retusa est. Semel utraque parte trajecta, permutandæ acus inter manus sunt, ut ea sit in dextra, quæ fuit in sinistra, ea veniat in sinistram, quam dextra continuit: iterumque eodem modo per  
30 oras immittendæ sunt: atque ita tertio & quarto, deincepsque permutatis inter manus acubus includenda plaga. Post hæc, eadem fila, eademque acus ad cutem transferendæ, similique ratione ei quoque parti



454 A. CORN. CELSI Lib. 7.  
utraque futura injicienda; semper ab interiore parte acubus venientibus, semper inter manus trajectis. Dein glutinantia injicienda. Quibus aut spongiam, aut succidam lanam ex aceto expressam accedere 5 debere, manifestius est, quam ut semper dicendum sit. Impositis his leniter deligari venter debet.

C A P. XVII.

10

*De Interiore membrana  
abdominis rupta. a*

**I**NTERDUM tamen vel ex ictu aliquo, vel retento diutius spiritu, vel sub gravi fasce, interior abdominis membra-15 na, superiore cute integra, rumpitur. Quod scemini quoque ex utero sæpe evenire consuevit: fitque præcipue circa ilia. Sequitur autem, cum superior caro mollis sit, ut non satis intestina contineat, hisque 20 intenta cutis indecora intumescat. Atque id quoque aliter atque aliter curatur. Quidam enim per acum duobus linis ad imam basin immisis sic utrinque devinciunt, quemadmodum & in umbilico, & in uva 25 positum est, ut, quicquid super vinculum est, emoriatur. Quidam medium tumorem excidunt, ad similitudinem myrtacei folii (quod semper eodem modo servandum esse jam posui) & tum oras futura 30 jungunt. Commodissimum est autem, resupinato corpore, experiri manu, qua parte is tumor maxime cedat, quia necesse est, ea parte rupta membrana sit; quaque integra

449,  
32.

a H. F. ab Aquapendente Oper. Chirurg. P. I. cap. 53.

gra est, ea magis obnitatur: tum, qua rupta videbitur, a incidendæ scalpello duæ tuni-  
 nicæ sunt, ut exciso medio, interior mem-  
 brana utrinque recentem plagam habeat;  
 5 quia, quod vetus est, futura non coit. Loco  
 patefacto, si qua parte membrana non no-  
 vam plagam, sed veterem habet, tenuis  
 excidenda habena est, quæ tantum oras 467, 2.  
 ejus exulceret. Cætera, quæ ad futuram,  
 10 reliquamque curationem pertinent, supra  
 comprehensa sunt.

2. De Varicibus ventris.

Præter hæc evenit, ut in quorundam  
 ventribus varices sint, quarum quia nulla  
 15 alia curatio est, quam quæ in cruribus esse  
 consuevit, tum eam partem explanaturus,  
 hanc quoque eo differo. 495, 26.

C A P. XVIII.

20 De Testiculorum natura, & morbis \*

VENIO autem ad ea, quæ in natura-  
 libus partibus circa testiculos oriri  
 solent. quæ quo facilius explicem,  
 prius ipsius loci natura paucis proponenda  
 25 est. Igitur testiculi simile quiddam glan-  
 dulis habent. nam sanguinem non emit-  
 tunt, & omni sensu carent: dolent autem  
 in ictibus & inflammationibus tunicarum,  
 quibus hi continentur. Dependent vero ab  
 30 inguinibus per singulos nervos, quos κρη-  
 μασηρας Græci nominant. cum quorum  
 utroque binæ descendunt & venæ & arteriæ.  
 Hæc autem tunica conteguntur tenui, ner-  
 vosa, sine sanguine, alba, quæ ελυτροειδης

F f 4

a Edit. Ald. Steph. aliaque, immittenda scalpello duas  
 lineæ. Cæsarius legit i. l. d. tunica. \* H. F. ab Aqua-  
 pend. Oper. Chirurg. Part. 1. C. 71.

456 A. CORN. CELSI Lib. 7.  
 à Græcis nominatur. Super eam valentior  
 tunica est, quæ interiori vehementer ima  
 parte inhæ et. *δαρτὸν* Græci vocant. Mul-  
 tæ deinde membranulæ venas & arterias,  
 eosque nervos comprehendunt; atque  
 inter duas quoque tunicas superioribus  
 partibus tenues patulæque sunt. Hactenus  
 propria utrique testiculo & velamenta &  
 auxilia sunt. Communis deinde utrique,  
 omnibusque interioribus sinus est, qui  
 etiam conspicitur à nobis. *ὄρχιόν* Græci,  
 scrotum nostri vocant. Isque ab ima parte  
 mediis tunicis leviter innexus, à superio-  
 re tantum circumdatus est.

398,  
22.

Sub hoc igitur plura vitia esse consue-  
 verunt. quæ modo ruptis tunicis, quas ab  
 inguinibus incipere proposui, modo his  
 integris fiunt. siquidem interdum vel ex  
 morbo primum inflammatur, deinde po-  
 stea pondere abrumpitur, vel ex ictu aliquo  
 protinus rumpitur tunica, quæ diducere  
 ab inferioribus partibus intestina debuit.  
 Tum pondere eo devolvitur, aut omen-  
 tum, aut etiam intestinum: atque ibi re-  
 perta via, paulatim ab inguinibus in infe-  
 riores quoque partes nisum, subinde ner-  
 vosas tunicas, & ob id, quod dixi patentes  
 diducit. *ἰντεροκήλιω* & *ἐπιπλοκήλιω* Græci  
 vocant: apud nos indecorum, sed com-  
 mune his, herniæ nomen est.

Deinde, si descendit omentum, nun-  
 quam in scroto tumor tollitur, sive inedia  
 fuit, sive corpus huc illucve conversum,  
 aut alio quovis modo collocatum: itemque,  
 si

39

si retentus est spiritus, non magnopere increfcit, tactu vero inæqualis est, & mollis, & lubricus.

At si intestinum quoque descendit, tu-  
5 mor is sine inflammatione modo minui-  
tur, modo increfcit; estque fere sine do-  
lore &, cum conquiescit aliquis aut jacet,  
interdum ex toto defidit, interdum sic  
minuitur, ut in scroto exiguæ reliquiæ  
10 maneant: at sub clamore, & fatietate, & si  
sub aliquo pondere is homo nixus est, cre-  
fcit: frigore omni contrahitur, calore dif-  
funditur; estque tum scrotum & rotun-  
dum, & tactu leve: idque, quod subest, lu-  
15 bricum est; si pressum est, ad inguen re-  
vertitur; dimissumque, iterum cum quo-  
dam quasi murmure devolvitur. & id  
quidem in levioribus malis evenit. Non-  
nunquam autem stercore accepto vastius  
20 tumet, retroque compelli non potest: ad-  
fertque tum dolorem & scroto, & inguini-  
bus, & abdomini. Nonnunquam stoma-  
chus quoque affectus primum rufam bi-  
lem per os reddit, deinde viridem, quibus-  
25 dam etiam nigram.

Integris vero membranibus interdum eam  
partem humor distendit. Atque ejus quo-  
que species duæ sunt. Nam vel inter tu-  
nicas is increfcit, vel in membranibus, quæ  
30 ibi circa venas & arterias sunt, ubi hæ gra-  
vatæ occalluerunt. Ac ne ei quidem hu-  
mori, qui inter tunicas est, una sedes est.  
Nam modo inter summam & mediam,  
modo inter mediam & imam consistit.

468,  
5.

Græci communi nomine, quicquid est, *ὑδροκήλη* appellant: nostri vero, scilicet nullis discriminibus satis cognitis, hoc quoque sub eodem nomine, quo priora, habent.

Signa autem quædam communia sunt, 5  
quædam propria. Communia, quibus humor deprehenditur: propria, quibus locus. Humorem subesse discimus, si tumor est, nunquam ex toto se remittens, sed interdum levior, aut propter famem, aut 10  
propter febriculam, maximeque in pueris: isque mollis est, si non nimius humor subest; at, si is vehementer increvit, renititur sicut uter repletus & arcte adstrictus: venæ quoque in scroto inflantur; & si digito 15  
premius, cedit humor, circumfluenisque id, quod non premitur, attollit; & tanquam in vitro cornuve per scrotum apparet; isque, quantum in ipso est, sine dolore est. Sedes autem ejus sic deprehenditur. Si in- 20  
ter summam mediamque tunicam est, cum digitis duobus premiis, paulatim humor inter eos revertens subit: scrotum remissius & albidius est; si ducitur, aut nihil, aut paululum intenditur: testiculus ea parte 25  
neque visu, neque tactu sentitur. At, si sub media tunica est, intentum scrotum magis se attollit, adeo ut superior coles sub tumore delitescat.

468,  
23.

Præter hæc æque integris tunicis ramex 30  
innascitur. *κισσοκήλη* Græci adpellant, cum venæ intumescunt. Hæ quandoque intortæ\*, conglomeratæque ad superiorem partem, vel ipsum scrotum implent, vel  
mediam

\* De hac voce vide I. Rhodium de Acia, C. 15. p. 212.



mediam tunicam, vel imam: interdum  
 etiam sub ima tunica, circa ipsum testicu-  
 lum nervumque ejus, increfcunt. Ex is eæ,  
 quæ in ipfo fcroto funt, oculis patent: hæ  
 5 vero, quæ mediæ imæve tunicæ infident,  
 ut magis conditæ non æque quidem cer-  
 nuntur, fed tamen etiam vifui fubjectæ  
 funt: præterquam quod & tumoris aliquid  
 eft, pro venarum magnitudine & modo; &  
 10 id prementi magis renititur, ac per ipfos  
 venarum toros inæquale eft; &, qua parte  
 id eft, testiculus magis jufto dependet,  
 Cum vero etiam fuper ipfum testiculum  
 nervumque ejus id malum increvit, ali-  
 15 quanto longius testiculus ipfe descendit,  
 minorque altero fit, utpote alimento a-  
 miffo.

Raro, fed aliquando caro quoque inter  
 tunicas increfcit. *σαρκοκήλις* Græci vo- 470.  
 20 cant. 17.

Interdum etiam ex inflammatione tu-  
 met ipfe testiculus, ac febres quoque ad-  
 fert; & nifi celeriter ea inflammatio con-  
 quievit, dolor ad inguina atque ilia perve-  
 25 nit; partesque hæ intumefcunt, & nervus,  
 ex quo testiculus dependet, plenior fit, fi-  
 mulque indurefcit.

Super hæc, inguen quoque nonnun-  
 quam ramices implent. *βιβανοκήλις* adpel- 471.  
 30 lant. † 4.

C A P.

† H. F. ab Aquapendente Oper. Chirurg. P. I. c. 72.

## C A P. XIX.

*De Testicularum curationibus communibus :*

*& primo de incisione & curatione*

*Inguinis , vel Scroti.*

**H**IS cognitis , de curatione dicen-  
 dum est. In qua quædam communia  
 omnium sunt , quædam propria sin-  
 gulorum. Prius de communibus dicam.  
 Loquar autem nunc de his , quæ scalpellum  
 desiderant. nam quæ vel sanari non pos-  
 sint , vel aliter nutriri debeant , dicendum  
 erit , simul ac ad species singulas venero.  
 Inciditur autem interdum inguen , inter-  
 dum scrotum. In utraque curatione homo  
 ante per triduum bibere aquam ; pridie ab-  
 stinere etiam à cibo debet : ipso autem die  
 collocari supinus : deinde , si inguen in-  
 cidendum est , idque jam pube contegitur ,  
 ante radendum est : tum , extento scroto , ut  
 cutis inguinis intenta sit , id incidendum  
 sub imo ventre , qua cum abdomine tuni-  
 cæ inferiores committuntur. Aperiendum  
 autem audacter est , donec summa tunica ,  
 quæ ipsius scroti est , incidatur , pervenia-  
 turque ad eam , quæ media est. Plaga facta ,  
 foramen deorsum versus subest. In id de-  
 mittendus est sinistrae manus digitus in-  
 dex , ut deductis intervenientibus membra-  
 nulis , finum laxet. Minister autem , sinistra  
 manu comprehenso scroto , sursum versus  
 eum debet extendere , & quam maxime ab  
 inguinibus abducere ; primum cum ipso  
 testiculo , dum medicus omnes membra-  
 nulas,

nulas, quæ super mediam tunicam sunt, si digito diducere non potest, scalpello abscindat: deinde sine eo, ut is delapsus ipsi plagæ jungatur, digitoque inde promatur, & super ventrem cum duabus suis tunicis collocetur. Inde si qua vitiosa sunt, circuncidenda sunt. In quibus cum multæ venæ discurrant, tenuiores quidem præcidi protinus possunt: majores vero ante longiore lino deligandæ sunt; ne periculose sanguinem fundant.

Sin media tunica vexata erit, aut sub ea malum increverit, excidenda erit sic, ut alte ad ipsum inguen præcidatur. Infra tamen non tota demenda est: nam quod ad basin testiculi vehementer cum ima tunica connexum est, excidi sine summo periculo non potest. itaque ibi relinquendum est.

Idem in ima quoque tunica, si læsa est, faciendum est. Sed non à summa inguinis plaga, verum infra paululum ea abscindenda; ne, læsa abdominis membrana, inflammationes moveat. Neque tamen nimium ex ea rursus relinquendum est; ne postea finuetur, & sedem eidem malo præstet.

Purgatus ita testiculus per ipsam plagam cum venis, & arteriis, & nervo suo leniter demittendus est; videndumque, ne sanguis in scrotum descendat, neve concretus aliquo loco maneat. Quæ ita fient, si venis vinciendo medicus prospexerit. Lina, quibus capita earum continebuntur, extra plagam dependere debent.

bunt. quæ, pure orto, sine ullo dolore excident. Ipsi autem plagæ injiciendæ duæ fibulæ sunt; & insuper medicamentum, quo glutinetur.

Solet interdum ab altera ora necessarium esse aliquid excidi, ut cicatrix major & latior fiat. Quod ubi incidit, linamenta super non fulcienda, sed leviter tantum ponenda sunt; supraque ea, quæ inflammationem repellant, id est, ex aceto vel lana succida, vel spongia: cætera eadem, quæ, ubi pus moveri debet, adhibenda sunt. At, cum infra incidi oportet, resupinato homine, subjicienda sub scroto sinistra manus est; deinde id vehementer apprehendendum, & incidendum; si parvulum est, quod nocet, modice, ut tertia pars integra, ad sustinendum testiculum, infra relinquatur: si majus est, etiam amplius, ut paululum tantummodo ad imum, cui testiculus insidere possit, integrum maneat. Sed primo rectus scalpellus quam levissima manu teneri debet, donec scrotum ipsum diducat: tum inclinandus mucro est, ut transversas membranas secet, quæ inter summam mediamque tunicam sunt. At, si vitium in proximo est, mediam tunicam attingi non oportet: si sub illa quoque conditur, etiam illa incidenda est; sicut tertia quoque, si illa vitium tegit. Ubicumque autem repertum malum est, ministrum ab inferiore parte exprimere moderate scrotum oportet: medicum, digito manubriolove scalpelli diducta inferiore parte, tunicam

cam extra collocare; deinde eam ferramento, quod à similitudine corvum vocant incidere sic, ut intrare duo digiti, index & medius possint: his deinde confectis, incidenda reliqua pars tunicæ, & inter digitos scalpellus immittendus est, eximendumque aut effundendum quicquid est noxium.

Quamcunque autem tunicam quis violavit, illam quoque debet excidere; ac mediam quidem, ut supra dixi, quam altissime ad inguen; imam autem, paulo infra. Cæterum antequam excidantur, hæ quoque vinciri lino summa cura debent; & ejus lini capita extra plagam relinquenda sunt, sicut in aliis quoque venis, quæ id requisierint.

Eo facto, testiculus intus reponendus est: oræque scroti futuris inter se committendæ; neque paucis, ne parum glutinentur, & longior fiat curatio; neque multis, ne inflammationem augeant. Atque hic quoque videndum est, ne quid in scroto sanguinis maneat: tum imponenda glutinantia sunt.

Si quando autem in scrotum sanguis defluxit, aliquidve concretum ex eo decidit, incidi subter id debet; purgatoque eo spongia, acri aceto madens, circumdari. Deligatum autem vulnus omne, quod ex his causis factum est, si dolor nullus est, quinque primis diebus non est resolvendum, sed bis die tantum aceto irroranda, lana vel spongia imposita: si dolor est, ter-



tia die resolvendum; &, ubi fibulæ sunt, hæ incidendæ; ubi linamentum, id mutandum est; rosaque & vino madefaciendum id, quod imponitur. Si inflammatio increfcit, adjiciendum prioribus cataplasma 5 ex lenticula & melle; vel ex malicorio, quod in austero vino coctum sit; vel ex his mixtis. Si sub his inflammatio non conquierit, post diem quintum multa calida aqua vulnus fovendum, donec scrotum 10 ipsum & extenuetur, & rugosius fiat: tum imponendum cataplasma ex triticea farina, cui resina pinea adjecta sit. quæ ipsa, si robustus curatur, ex aceto; si tener, ex melle coquenda sunt. Neque dubium 15 est, quodcunque vitium fuit, si magna inflammatio est, quin ea quæ pus movent, imponenda sint.

Quod si pus in ipso scroto ortum est, paululum id incidi debet, ut exitus detur; 20 linamentumque eatenus imponendum est, ut foramen tegat. Inflammatione finita, propter nervo, propiore cataplasmate, dein cerato utendum est. Hæc proprie ad ejusmodi vulnera pertinent. Cætera, & in 25 curatione, & in victu, similia his esse debent, quæ in alio quoque vulnerum genere præcepimus.

## C A P. XX.

*De Intestini in scrotum devoluti curatione.* 30

**H**is propositis ad singulas species veniendum est. Ac, si cui parvulo puero intestinum descendit, ante scalpellum

a *Æginet.* VI, 52, 65.

pellum experienda vinctura est. Fascia ejus rei causa fit, cui uno loco pila assuta est ex panniculis facta, quæ ad repellendum intestinum ipsi illi subjicitur: deinde reliqua  
 5 fasciæ pars arctè circumdatur. sub quo sæpe & intus compellitur intestinum, & inter se tunicæ glutinantur. Rursus, si ætas processit, multumque intestini descendisse ex tumore magno patet, adjiciunturque do-  
 10 lores & vomitus (quæ ex stercore, per cruditatem eo delapso, fere accidunt) scalpellum adhiberi sine pernicie non posse, manifestum est: levandum tantummodo malum, & per alias curationes extrahendum  
 15 est.

Sanguis mitti ex brachio debet: deinde, si vires patiuntur, imperanda tridui abstinencia est; si minus, certe pro vi corporis quam longissima. Eodem vero tempore su-  
 20 perhabendum cataplasma ex lini semine, quod ante aliquis ex mulso decoxerit. Post hæc, & farina hordeacea cum resina injicienda; & ipse demittendus in solium aquæ calidæ; cui oleum quoque adjectum  
 25 fit; dandumque aliquid cibi levis & calidi. Quidam etiam alvum ducunt. Id ducere aliquid in scrotum potest, educere ex eo non potest. Per ea vero, quæ supra scripta sunt, levato malo, si quando alias dolor revertetur,  
 30 rit, eadem erunt facienda.

Sine dolore quoque si multa intestina prolapsa sunt, secari supervacuum est: non quo excludi à scroto non possint ( nisi tamen id inflammatio prohibuit) sed quo

repulsa inguinibus immorentur, ibique tumorem excitent, atque ita fiat mali non finis, sed mutatio.

At in eo, quem scalpello curari oportebit, simulatque ad mediam tunicam vulnus in inguine factum pervenerit, duobus hamulis ea juxta ipsas oras apprehendi debet, dum eductis omnibus membranulis medicus eam liberet. Neque enim nisi cum periculo læditur, quæ incidenda est; cum intestinum esse, nisi sub ea, non possit. Ubi diducta autem erit, ab inguine usque ad testiculum incidi debet sic, ne ipse lædatur; tum excidi. Fere tamen hanc curationem puerilis ætas, & modicum malum recipit.

Sin vir robustus est, majusque id vitium est, extrahi testiculus non debet, sed in sua sede permanere. Id hoc modo fit. Inguen eadem ratione usque ad mediam tunicam scalpello aperitur; eaque tunica eodem modo duobus hamis excipitur sic, ut à sinistro testiculus eatenus contineatur, ne per vulnus exeat: tum ea tunica deorsum versus scalpello inciditur: sub eaque index digitus sinistræ manus ad imum testiculum demittitur, eumque ad plagam compellit: deinde dextræ manus duo digiti, pollex atque index, venam & arteriam & nervum tunicamque eorum à superiore tunica diducunt. quod si aliquæ membranulæ prohibent, scalpello resolvuntur, donec ante oculos tota jam tunica sit. Excisis, quæ excidenda sunt, repositoque testiculo,

Cap. 21. MEDICINA. 467  
culo, ab ora quoque ejus vulneris, quod  
in inguine est, demenda habenula paulo  
latior est; quo major plaga fit, & plus crea-  
re carnis possit.

5 C A P. XXI.

*De Omenti in serotum prolapsi curatione.*

10 **A**T si omentum descendit, eodem  
quidem modo, quo supra scriptum  
est, aperiendum inguen, diducen-  
dæque tunicæ sunt. Considerandum au-  
tem est, majorne ejus modus, an exiguus  
fit. Nam quod parvulum est, super inguen  
in uterum vel digito vel adverso specillo  
15 repellendum est: si plus est, finire oportet  
dependere, quantum ex utero prolapsum  
est; idque adurentibus medicamentis illi-  
nere, donec a emoriatur & excidat. Quidam  
hic quoque duo lina acu trajiciunt, binif-  
20 que singulorum capitibus diversas partes  
adstringunt. Sub quo æque, sed tardius  
emoritur. Adjicitur tamen hic quoque  
celeritati, si omentum super vinculum  
illinitur medicamentis, quæ exedunt, nec  
25 erodunt. *σνπλινα* Græci vocant. Fuerunt  
etiam, qui omentum forcice præciderent.  
Quod in parvulo non est necessarium: si  
majus est, potest profusionem sanguinis  
facere; siquidem omentum quoque venis  
30 quibusdam, etiam majoribus illigatum est.  
Neque vero, si discisso ventre id, quod  
prolapsum est, forcice præciditur, cum &  
emortuum sit, & aliter tutius avelli non pos-  
sit, inde huc exemplum transferendum est.

G g 2

Vul-

Vulnus autem curari, si reductum omentum est, futura debet: si id amplius fuit, & extra emortuum est, excisis oris, sicut supra propositum est.

458, 2.

## 2. De Hernia aquosa curatione. b

5

Si vero humor intus est, incidendum est: in pueris quidem, inguen; nisi in his quoque liquoris ejus major modus prohibet: in viris vero, & ubicunque multus humor subest, scrotum. Deinde, si inguen incisum est, eo protractis tunicis humor effundi debet: si scrotum, & sub hoc protinus vitium est, nihil aliud quam humor est effundendus, abscindendæque membranae sunt, si quæ eum continuerunt; deinde eluendum id ex aqua, quæ vel salem adjectum, vel nitrum habeat: si sub media, imave tunica, totæ hæ extra scrotum collocandæ, excidendæque sunt.

10

15

## CAP. XXII.

20

*De Ramicis curatione.*458,  
31.

**R**AMEX \*autem, si super ipsum scrotum est, adurendus est tenuibus & acutis ferramentis, quæ ipsis venis infigantur; cum eo, ne amplius quam has urant; maximeque, ubi inter se implicatæ glomerantur, eo ferrum id admovendum est; tum super farina ex aqua frigida subacta injicienda est; utendumque eo vinculo, quod idoneum esse ani curationibus posui: tertio die lenticula cum melle imponenda est: post, ejectis crustis, ulcera melle purganda, rosa implenda, & ad cicatricem aridis linamentis

400,  
34.

30

b Æginet. VI, 62. \* Hanc vocem exponit Salmasius Epist. 56.



mentis perducenda sunt. Quibus vero super mediam tunicam venæ tument, incidendum inguen est, atque tunica promenda, ab eaque venæ digito vel manubriolo scalpelli separandæ. qua parte vero inhærebunt, & ab superiore & ab inferiore parte lino vincindæ; tum sub ipsis vinculis præcidendæ, reponendusque testiculus est. At, ubi supra tertiam tunicam ramex insedit, 10 mediam excidi necesse est. Deinde, si duæ tresve venæ tument, & ita pars aliqua obsidetur, ut major eo vitio vacet, idem faciendum, quod supra scriptum est; ut ab inguine, & à testiculo deligatæ venæ præciantur, isque condatur. Sin totum id ramex 15 obsederit, per plagam demittendus digitus index erit, subjiciendusque venis sic, ut paulatim eas protrahat æque adducendo, donec is testiculus par alteri fiat; tum fibulæ 20 oris sic injiciendæ, ut simul eas quoque venas comprehendant. Id hoc modo fit. Acus ab exteriori parte oram vulneris perforatum non per ipsam venam, sed per membranam ejus immittitur, per eamque in alteram oram compellitur. Venæ vulnerari non debent, ne sanguinem fundant. Membrana semper inter has venas est, ac neque periculum affert, & filo comprehensas illas abunde tenet. itaque etiam satis est, duas 30 fibulas esse. Tum venæ, quæcunque protractæ sunt in ipsum inguen, averso specillo compelli debent. Solvendi fibulas tempus, inflammatione finita, & purgato vulnere, est; ut una simul & oras & venas cicatrix devinciatur.

Ubi vero inter imam tunicam & ipsum testiculum nervumque ejus ramex ortus est, una curatio est, quæ totum testiculum abscindit. Nam neque ad generationem quicquam is confert, & omnibus indecore, quibusdam etiam cum dolore dependet. Sed tum quoque inguen incidendum, media tunica promenda, atque excidenda est: idem in ima faciendum; nervusque, ex quo testiculus dependet, præcidendus. Post id venæ & arteriæ ad inguen lino deligandæ, & infra vinculum abscindendæ sunt.

## C A P. XXIII.

*De Carne, quæ inter tunicas testiculorum concrevit, & de Neruo indurato. a*

459, 19. C A R O quoque, si quando inter tunicas increvit, nihil dubii est, quin excidenda fit: sed id, ipso scroto inciso, fieri commodius est.

At, si nervus induruit, curari res neque manu, neque medicamento potest. Urgent enim, febres ardentes; & aut virides, aut nigri vomitus: præter hæc, ingens fitis, & linguæ aspritudo; fereque à die tertio spumans bilis alvo cum rosione redditur. Atque neque assumi facile cibus, neque contineri potest: neque multo post extremæ partes frigescent, tremor oritur, manus sine ratione extenduntur; deinde in fronte frigidus sudor, eumque mors sequitur.

C A P.

## C A P. XXIV.

*De Ramice inguinis. a*

5 **U**BI vero in ipso inguine ramex est, si <sup>459,</sup>  
 tumor modicus est, semel incidi; si <sup>29.</sup>  
 major, duabus lineis debet, ut me-  
 dium excidatur: deinde, non extracto te-  
 sticulo, sicut intestinis quoque prolapsis in-  
 10 terdum fieri docui, colligendæ venæ, vin-  
 ciendæque; ubi tunicis inhærebunt, & sub  
 his nodis præcidendæ sunt. Neque quicquam  
 novi curatio vulneris ejus requirit.

## C A P. XXV.

15 *Ad tegendam Glandem colis, si nuda est.\**

**A**B his ad ea transeundum est, quæ in  
 cole ipso fiunt. In quo si glans nuda  
 est, vultque aliquis eam decoris a cau- <sup>393,</sup>  
 20 sa tegere, fieri potest: sed expeditius in <sup>12.</sup>  
 puero, quam in viro; in eo, cui id naturale  
 est, quam in eo, qui quarundam gentium  
 more circumcissus est; in eo, cui glans parva  
 juxtaque eam cutis spatiosior, brevis ipse  
 coles est, quam in quo contraria his sunt.  
 25 Curatio autem eorum, quibus id natura-  
 le est, ejusmodi est. Cutis circa glandem  
 prehenditur <sup>b</sup> & extenditur, donec illam  
 ipsam condat; ibique deligatur: deinde, jux-  
 ta pubem, in orbem tergitur, donec  
 30 coles nudetur; magna que cura cavetur, ne  
 vel urinæ iter, vel venæ, quæ ibi sunt, in-  
 cidantur. Eo factò, cutis ad vinculum in-  
 clinatur, nudaturque circa pubem velut cir-  
 culus; tum super eo linamenta dantur, ut ca-

G g 4

ro

a Æginet. VI, 66. Aëtius Tetrab. IV, Serm. II, 24.  
 \* H. F. ab Aquapendente Oper. Chirurg. Part. I. C. 61.  
 a Æginet. VI, 53. b Æginet. VI, 53.

ro increſcat & id impleat, ſatisque vela-  
 menti ſupra latitudo plagæ præſtet. Sed,  
 donec cicatrix ſit, vinctum eſſe id debet; in  
 medio tantum relicto exiguo urinæ itine-  
 re. At in eo, qui circumciſus eſt, ſub circu-  
 lo glandis ſcalpello diducenda cutis ab in-  
 teriore cole eſt. Non ita dolet, quia, ſum-  
 mo ſoluto, diduci deorſum uſque ad pubem  
 manu poteſt; neque ideo ſanguis profluit.  
 Reſoluta autem cutis ruruſus extenditur ul-  
 tra glandem: tum multa frigida aqua fove-  
 tur; emplaſtroque circumdatur, quod va-  
 lenter inflammationem reprimat; proximis  
 que diebus abſtinere, donec prope à fame  
 victus ſit, ne forte eam partem ſatietas ex-  
 citet. Ubi jam ſine inflammatione eſt, deli-  
 gari debet à pube uſque circum: ſuper  
 glandem autem adverſo emplaſtro imposito  
 induci. ſic enim ſit, ut inferior pars glutine-  
 tur; ſuperior ita ſaneſcat, ne inhæreat.

2. *Quomodo Glans penis contecta aperiri poſſit.\**

393,  
13.

CONTRA, ſi glans ita contecta eſt, ut  
 nudari non poſſit (quod vitium Græci  
 φίμωσιν a appellant) aperienda eſt.  
 Quod hoc modo ſit. Subter à ſumma ora,  
 cutis inciditur recta linea uſque ad fre-  
 num; atque ita ſuperius terguſ relaxatum,  
 cedere retro poteſt. Quod ſi parum ſic  
 profectum eſt, aut propter anguſtias, aut  
 propter duriſſimam tergoris, protinus trian-  
 gula forma cutis ab inferiore parte exci-  
 denda eſt ſic, ut vertex ejuſ ad frenum;  
 baſis in tergo extremo ſit. Tum ſuperdan-  
 da linamenta ſunt, aliaque medicamenta  
 quæ

\* H. F. ab Aquapendente Oper. Chirurg. P. 1. c. 62.  
 † Aeginet. VI, 54.

**Cap. 25. MEDICINA. 473**  
quæ ad sanitatem perducant. Necessarium autem est, donec cicatrix sit, conquiescere: nam ambulatio, atterendo ulcus fordidum reddit.

5 **3. Infibulandi ratio.\***

Infibulare quoque adolescentulos interdum valetudinis causa quidam consueverunt: ejusque hæc ratio est. Cutis, quæ super glandem est, extenditur, notaturque utrin-  
10 que à lateribus atramento, qua perforetur; deinde remittitur. Si super glandem notæ revertuntur, nimis apprehensum est, & ultra notari debet: si glans ab his libera est, is locus idoneus fibulæ est. Tum, qua notæ  
15 sunt, cutis acu filum ducente transiit, ejusque filii capita inter se deligantur, quotidieque id movetur, donec circa foramina cicatriculæ fiant. Ubi hæ confirmatæ sunt, excepto filo fibula inditur, quæ † quo  
20 levior, eo melior est. Sed hoc quidem sæpius inter supervacua, quam inter necessaria est.

**C A P. XXVI.**

*De Urina reddenda difficultate, & curatione. a*

25

**R**Es vero interdum cogit emoliri manu urinam, cum illa non redditur; aut quia senectute iter ejus collapsum est; aut quia calculus, vel concretum  
30 aliquid ex sanguine intus se opposuit: ac mediocris quoque inflammatio sæpe eam reddi naturaliter prohibet. Idque non in viris tantummodo, sed in foeminis quoque interdum necessarium est. Ergo æneæ fistulæ  
G g 5 sunt:

\* H. F. ab Aquapendente Oper. Chirurg. Part. I. C. 63. † Rhodius de Acia, Cap. 6. pag. 83. a Æginet, VI. 59.



fiunt: *cæque*, ut omni corpori, ampliori minorique sufficiant, ad mares, tres; ad foeminas, duæ medico habendæ sunt. Ex virilibus maxima decem & quinque est digitorum; media, duodecim; minima, novem: ex mulieribus major, novem; minor, sex. Incurvas vero esse eas paululum, sed magis viriles oportet, lævesque admodum; ac neque nimis plenas, neque nimis tenues.

Homo tum resupinus eo modo, quo in curatione calculi figuratur, super subsellium aut lectum collocandus est. Medicus autem à dextro latere, sinistra quidem manu colem masculi continere, dextra vero fistulam demittere in iter urinæ debet: atque ubi ad cervicem vesicæ ventum est, simul cum cole fistulam inclinatam in ipsam vesicam compellere, eamque, urina reddita, recipere. Foemina brevius urinæ iter, simul & rectius habet, quod carunculæ simile, inter imas oras super naturale positum, non minus sæpe auxilio eget, sed aliquanto minus difficultatis exhibet.

Nonnunquam etiam prolapsus in ipsam fistulam calculus, qui subinde ea extenuatur, non longe ab exitu inhærescit. Eum si fieri potest, oportet evellere, vel oriculario specillo, vel eo ferramento, quo in sectione calculus protrahitur. Sed id fieri non potuit, cutis extrema quamplurimum attrahenda &, condita glande, lino vincienda est: deinde à latere recta plaga coles

185,  
30.  
481,  
22.

les incidendus, & calculus eximendus est: tum cutis remittenda. sic enim fit, ut incisum colem integra pars cutis contegat, & urina naturaliter profluat.

5 2. *Calculosis qua curatio adhibeatur.* b

Cum vesicæ vero, calculique facta mentio sit; locus ipse exigere videtur, ut subjiciam, quæ curatio calculosis, cum aliter succurri non potest, adhibeatur. Ad quam  
10 festinare, cum præceptis sit, nullo modo convenit. Ac neque omni tempore, neque in omni ætate, neque in omni vitio id experiendum est: sed solo vere, in eo corpore, quod  
15 jam novem annos, nondum quatuordecim excessit; & si tantum mali subest, ut neque medicamentis vinci possit, neque etiam trahi posse videatur, quo minus interposito aliquo spatio interimat. Non quo non  
interdum etiam temeraria medicina pro- 138,3.  
20 ficiat; sed quo sæpius utique in hoc fallat, in quo plura & genera & tempora periculi sunt. quæ simul cum ipsa curatione proponam.

Igitur, ubi ultima experiri statutum est,  
25 ante aliquot diebus victu corpus præparandum est, ut modicos, ut salubres cibos, ut minime glutinosos assumat, ut aquam bibat. Ambulandi vero inter hæc exercitatione utatur, quo magis calculus ad  
30 vesicæ cervicem descendat. Quod an incidit, digitis quoque, sicut in curatione docebo, demissis cognoscitur. Ubi ejus rei fides est, pridie is puer in jejunio continendus est; & tum loco calido curatio adhi-

adhibenda: quæ hoc modo ordinatur.

Homo prævalens & peritus in sedili alto confidit, supinumque eum & aversum, super genua sua coxis ejus collocatis, comprehendit; reductisque ejus cruribus, ipsum quoque jubet, manibus ad suos poplites datis, eos, quam maxime possit, attrahere; simulque ipse sic eos continet. Quod si robustius corpus ejus est, qui curatur, duobus sedilibus junctis, duo valentes insidunt: quorum & sedilia & interiora crura inter se deligantur, ne diduci possint. Tum is super duorum genua eodem modo collocatur, atque alter, prout confedit, sinistrum crus ejus, alter dextrum, simulque ipse poplites suos attrahit. Sive autem unus, sive duo continent, super humeros ejus suis pectoribus incumbunt. Ex quibus evenit, ut inter ilia sinus super pubem sine ullis rugis sit extentus, & in angustum compulsa vesica, facilius calculus capi possit. Præter hæc, etiamnum à lateribus duo valentes objiciuntur, qui circumstantes, labare vel unum vel duos, qui puerum continent, non sinunt.

Medicus deinde, diligenter unguibus circumcisus, sinistræ manus duos digitos, indicem & medium, leniter prius unctos oleo, simul in anum ejus demittit; dextræque digitos super anum abdomen leniter imponit; ne, si utrinque digiti circa calculum vehementer concurrerint, vesicam lædat. Neque vero festinanter in hac re, ut in plerisque, agendum est; sed ita, ut  
quam

quam maxime id tuto fiat. Nam læsa vesica nervorum distentiones cum periculo mortis excitat. Ac primum circa cervicem quaeritur calculus. ubi repertus, minore negotio expellitur. Et ideo dixi, ne curandum quidem, nisi cum hoc indiciis suis cognitum est. Si vero aut ibi non fuit, aut recessit retro, digiti ad ultimam vesicam dantur; paulatimque dextra quoque manus ejus ultra translata subsequitur.

Atque, ubi repertus est calculus (qui necesse est in manus incidat) eo curiosius deducitur, quo minor læviorque est; ne effugiat, id est, ne sæpius agitanda vesica sit. Ergo ultra calculum dextra semper manus ei se opponit; sinistra eum compellit deorsum digitis, donec ad cervicem pervenitur. In quam, si oblongus est, sic compellendus est, ut ne pronus exeat: si planus, sic, ut transversus sit: si quadratus, ut duobus angulis sedeat: si altera parte plenior, sic, ut prius ea, qua tenuior sit, evadat. In rotundo nihil interesse, ex ipsa figura patet; nisi, si lævior altera parte est, ut ea antecedit.

Cum jam eo venit, ut super vesicæ cervicem sit, juxta anum incidi cutis plaga lunata usque ad cervicem vesicæ debet, cornibus ad coxas spectantibus paululum: deinde ea parte, qua strictior ima plaga est, etiamnum sub cute, altera transversa plaga facienda est, qua cervix aperiatur; donec urinæ iter pateat sic, ut plaga paulo major, quam calculus sit. Nam, qui metu

*recima*

fistu-

& Alii meatum.

fistulæ (quam illo loco d *επορυσίδα* Græci vocant) parum patefaciunt, cum majore periculo eodem revolvuntur: quia calculus iter, cum vi promitur, facit, nisi accipit. idque etiam perniciosius est, si figura quoque *f* calculi, vel asperitudo aliquid eo contulit. Ex quo & sanguinis profusio, & distentio nervorum fieri potest. quæ si quis evasit, multo tamen patientiorem fistulam habiturus est rupta cervice, quam habuisset, *10* incisa.

Cum via perfecta est, in conspectum calculus venit: in cujus corpore multum discrimen est. Ideo, si exiguus est, digitis ab altera parte propelli, ab altera protrahi *15* potest. Si major, injiciendus à superiore ei parte uncus est, ejus rei causa factus. Is est ad extremum tenuis, in semicirculi speciem retusæ latitudinis; ab \* interiori parte lævis, qua corpori jungitur; ab inte- *20* riori asper, qua caculum attingit. Isque longior potius esse debet: nam brevior extrahendi vim non habet. Ubi injectus est, in utrumque latus inclinandus est, ut appareat calculus, & teneatur, quia, si appre- *25* hensus est, ille simul inclinatur. Idque eo nomine opus est, ne, cum adduci uncus cœperit, calculus intus effugiat, hic in oram vulneris incidat, eamque convulnere- *30* ret. In qua re, quod periculum esset, jam supra proposui.

Ubi satis teneri calculum patet, eodem pene momento triplex motus adhibendus est: in utrumque latus; deinde extra, sic tamen

d Alii *χορυσίδα* vel *επίδα*. edit. optimæ *επίσπασ*. anni 1497. *corbyada*, \* anteriori vel exteriori.



tamen, ut leniter id fiat, paululumque primo calculus attrahatur: quo facto, attollendus uncus extremus est, uti intus magis maneat, faciliusque illum producat. Quod si aliquando à superiore parte calculus parum commode comprehenditur, à latere erit apprehendendus. Hæc est simplicissima curatio.

10 Sed varietas rerum quasdam etiamnum animadversiones desiderat. Sunt enim quidam non asperi tantummodo, sed spinosi quoque calculi, qui per se quidem delapsi in cervicem, sine ullo periculo eximuntur.

15 In vesica vero, non tuto vel hi conquiruntur, vel attrahuntur: quoniam, ubi illam convulnerunt, ex distensione nervorum mortem maturant; multoque magis, si spina aliqua vesicæ inhæret, eamque, cum deduceretur, duplicavit. Colligitur autem eo, quod difficilius urina redditur, in

20 cervice calculum esse; eo, quod cruenta distillat, illum esse spinosum: maximeque id sub digitis quoque experiendum est, neque adhibenda manus, nisi id consistit.

25 Ac tum quoque leniter intus digiti obijciendi, ne violenter promovendo convulnerent: tum incidendum. Multi hic quoque scalpello usi sunt. Meges ( quoniam is infirmior est, potestque in aliqua prominentia incidere, incisoque super illam corpore, qua cavum subest, non secare, sed relinquere, quod iterum incidi necesse sit )

30 ferramentum fecit rectum, in summa parte labrosum, in ima semicirculatum acutum.

tumque. Id receptum inter duos digitos, indicem ac medium, super pollice imposito sic deprimebat, ut simul cum carne, si quid ex calculo prominebat, incideret. Quo consequebatur, ut semel, quantum satis esset, aperiret. Quocunque autem modo cervix ea parte secta est, leniter extrahi, quod asperum est, debet, nulla propter festinationem, vi admota.

3. *Signa calculorum, vel arenosorum, vel mollium:* 10

61, 16. At calculus arenosus, & ante manifestus est; quoniam urina, quæ redditur, arenosa est: & in ipsa curatione; quoniam inter subjectos digitos neque æque, sed leniter renititur, & insuper dilabatur. Item molles calculos, & ex pluribus minutisque, sed inter se parum adstrictis, compositos indicat urina, secum trahens quasdam quasi squamulas. Hos omneis, leniter permutatis subinde digitorum vicibus, sic oportet abducere, ne vesicam lædant, neve intus aliquæ dissipatæ reliquæ maneat, quæ postmodum curationi difficultatem faciant. Quicquid autem ex his in conspectum venit, vel digitis, vel unco eximendum est. 25

At, si plures calculi sunt, singuli protrahi debent; sic tamen, ut, si quis exiguus supererit, potius relinquatur. Siquidem in vesica difficulter invenitur; inventusque celeriter effugit. Ita longa inquisitione vesica læditur, excitatque inflammationes mortiferas; adeo ut quidam non secti, cum diu frustra per digitos vesica esset agitata, 30

tata, decesserint. Quibus accedit etiam, quod exiguus calculus, ad plagam urina postea promovente, excidit.

Si quando autem is major non videtur, nisi rupta cervice, extrahi posse, findendus est. cujus repertor Ammonius, qui ob id λισοτόμος cognominatus est. Id hoc modo fit. Uncus injicitur calculo sic, ut facile eum conclusum quoque teneat, ne is retro revolvatur: tum ferramentum adhibetur crassitudinis modicæ, prima parte tenui, sed retusa, quod admotum calculo, & ex altera parte ictum, findat; magna cura habita, ne aut ad ipsam vesicam ferramentum perveniat, aut calculi fractura ne quid incidat.

4. De Calculis foeminarum.

Hæ vero curationes in foeminis quoque similes sunt; de quibus parum, proprie tamen quædam dicenda sunt. Siquidem in his, ubi parvulus calculus est, scalpellus supervacuus est; quia is urina in cervicem compellitur. quæ & brevior, e quam in maribus, & laxior est. Ergo & per se sæpe excidit, & si in urinæ itinere, quod est angustius, inhæret, eodem tamen unco sine ulla noxa educitur. At in majoribus calculis necessaria eadem curatio est. Sed virgini subjici digiti tanquam masculo, mulieri per naturalia ejus debent. Tum, virgini quidem, sub ima finis-  
steriore ora; mulieri vero, inter urinæ iter & os pubis, incidendum est sic, ut utroque loco plaga transversa sit. neque terreri convenit, si plus ex muliebri corpore sanguinis profluit.

185,  
30.  
474,  
20.

H h

5. Qua

5. *Qua curatio calculo evulso habenda sit.*

Calculo evulso, si valens corpus est, neque magnopere vexatum, sinere oportet sanguinem fluere, quo minor inflammatio oriatur. Atque, ingredi quoque eum paululum, non alienum est, ut excidat, si quid intus concreti sanguinis mansit. Quod si per se non destitit, rursus, ne vis omnis intereat, supprimi debet. Idque protinus, in imbecillioribus, ab ipsa curatione faciendum est. Siquidem, ut distentione nervorum periclitatur aliquis, dum vesica ejus agitur; sic alter metus excipit, remotis medicaminibus, ne tantum sanguinis profluat, ut occidat. Quod ne incidat, defidere is debet in aceto, cui aliquantum salis sit adjectum. sub quo & sanguis fere conquiescit, & adstringitur vesica, ideoque minus inflammatur. Quod si parum proficit, agglutinanda cucurbitula est, & in genibus, & coxis, & super pubem. Ubi jam satis vel evocatus est sanguis, vel prohibitus, resupinus collocandus est sic, ut caput humile sit, coxæ paululum excitentur: ac super vulnus imponendum est duplex aut triplex linteolum, aceto madens. Deinde, interpositis duabus horis, in solium is aquæ calidæ resupinus demittendus est sic, ut à genibus ad umbilicum aqua teneat, cætera vestimentis circumdata sint; manibus tantummodo pedibusque nudatis, ut & minus digeratur, & ibi diutius maneat. Ex quo sudor multus oriri solet: qui spongia subinde in facie detergendus est.

est. Finisque ejus fomenti est, donec infirmando offendat. Tum multo is oleo perungendus; inducendusque hapsus lanæ <sup>210,6.</sup> mollis, tepido oleo repletus, qui pubem, & 5 coxas, & inguina, & plagam ipsam, contentam eodem ante se linteolo, protegat: isque subinde oleo tepido madefaciendus est; ut neque frigus ad vesicam admittat, & nervos leniter molliat. Quidam cataplasmatibus calefacientibus utuntur. Ea plus pondere nocent, atque vesicam urgendo vulnus irritant, quam calore proficiunt. Ergo ne vinculum quidem ullum necessarium est.

Proximo die, si spiritus difficiliter red- 15 ditur, si urina non exit, si locus circa pubem mature intumuit, scire licet, in vesica sanguinem concretum remansisse. Igitur, demissis eodem modo digitis, leniter pertractanda vesica est, & discutienda, si 20 qua coierunt: quo fit, ut per vulnus postea procedant. Non alienum etiam est, oriculario clystere acetum nitro mixtum per plagam in vesicam compellere. nam sic quoque discutiuntur, si qua cruenta coi- 25 erunt. Eaque facere etiam primo die convenit, si timemus, ne quid intus sit: maximeque, ubi ambulando id elicere imbecillitas prohibuit. Cætera eadem facienda sunt: ut demittatur in folium, ut eodem 30 modo panniculus, eodem lana superinji- ciatur.

Sed neque sæpe, neque tamdiu in aqua calida puer habendus, quam adolescens est; infirmus, quam valens; levi, quam



graviore inflammatione adfectus; is, cujus corpus digeritur, quam is, cujus adstrictum est. Inter hæc vero, si somnus est, & æqualis spiritus, & madens lingua, & fitis modica, & venter imus sedet, & mediocris est cum febre modica dolor, scire licet, recte procedere curationem.

At in his inflammatio fere quinto vel septimo die finitur: qua levata, folium supervacuum est. supini tantummodo vul-<sup>10</sup> nus aqua calida fovendum est, ut, si quid urinæ rodit, abluatur. Imponenda autem medicamenta sunt pus moventia; & si purgandum ulcus videbitur, melle liniendum. Id, si rodet, rosa temperabitur. Huic cu-<sup>15</sup> rationi aptissimum videtur *ἰνναφάρμακον* emplastrum. nam & sebum habet ad pus movendum, & mel ad ulcus repurgandum: medullam etiam, maximeque vitulinam; quæ in id, ne fistula relinquatur, præcipue<sup>20</sup> proficit. Linamenta vero tum super ulcus non sunt necessaria; super medicamentum, ad id continendum, recte imponuntur. At, ubi ulcus purgatum est, puro linamento ad cicatricem perducendum est. <sup>25</sup>

Quibus temporibus tamen, si felix curatio non fuit, varia circa pericula oriuntur. Quæ præſagire protinus licet, si continua vigilia est, si spiritus difficultas, si lingua arida est, si fitis vehemens, si venter imus<sup>30</sup> tumet, si vulnus hiat, si transfiliens urina id non rodit, si similiter ante tertium diem quædam livida excidunt, si is aut nihil aut tarde respondet, si vehementes do-  
lores

lores sunt, si post diem quintum magnæ febres urgent, & fastidium cibi permanet, si cubare in ventrem jucundius est. Nihil tamen pejus est distentione nervorum, & ante nonum diem, vomitu bilis. Sed cum inflammationis sit metus, succurri abstinentia, modicis & tempestivis cibis; inter hæc, fomentis, & quibus supra scripsimus, oportet.

10

C A P X X V I I.

*De Cancro, qui excisa vesica nascitur.*

15 **P**ROXIMUS cancri metus est. Is cognoscitur, si, & per vulnus, & per ipsum colem, fluit sanies mali odoris, cumque ea quædam à concreto sanguine non abhorrentia, tenuisque carunculæ lanulis similes. præter hæc, si oræ vulneris aridæ sunt, si dolent inguina, si febris non desinit, eaque in noctem augetur, si inordinati horrores accedunt. Considerandum autem est, in quam partem cancer is tendat. Si ad colem, indurefcit is locus, & 25 rubet, & tactu dolorem excitat, testiculi- que intumescunt: si in ipsam vesicam, \*ani dolor sequitur, coxæ tumescunt, non facile crura extendi possunt: at, si in alterutrum latus, oculis id expositum est, pares- que utrinque easdem notas, sed minores, 30 habet.

Primum autem ad rem pertinet corpus recte jacere, ut superior pars semper ea sit, in quam vitium fertur. Ita, si ad colem it,

Hh 3

supi-

\* Tulpius Observat. Lib. IV. Cap. 38.

supinus is collocari debet: si ad vesicam, in ventrem: si in latus, in id, quod integrius est. Deinde, ubi ventum fuerit ad curationem, homo in aquam demittetur, in qua marrubium decoctum sit, aut cupressus, 5 aut myrtus; idemque humor clystere intus adigetur: tum superponetur lenticula cum malicorio mixta; quæ utraque ex vino decocta sint; vel rubus, aut oleæ folia, eodem modo decocta; aliave medicamenta, 10 quæ ad cohibendos purgandosque cancri propositi, ex quibus, si qua erunt arida, per scriptorium calamum inspirabuntur.

Ubi stare cœperit cancer, mulso ulcus 15 eluetur. vitabiturque eo tempore ceratum; quod, ad recipiendum id malum, corpus emollit, potius plumbum elotum cum vino inungetur: super quæ idem linteolo illitum imponetur. Sub quibus perveniri 20 ad sanitatem potest: cum eo tamen, quod non ignoremus, orto cancro sæpe affici stomachum, cui cum vesica quoddam consortium est: exque eo fieri, ut neque retineatur cibus, neque, si quis retentus est, 25 concoquatur, neque corpus alatur; ideoque ne vulnus quidem aut purgari, aut ali possit. quæ necessario mortem maturant.

Sed ut his succurri nullo modo potest, sic à primo tamen die tenenda ratio cura- 30 tionis est. In qua quædam observatio, ad cibum quoque potionemque pertinens, necessaria est. Nam cibus inter principia, non nisi humidus dari debet: ubi ulcus  
purga-

purgatum est, ex media materia. olera & falsamenta semper aliena sunt. Potione opus est, non immodica. Nam, si parum bibitur, accenditur vulnus, & vigilia urget, & vis corporis minuitur: si plus æquo affumitur, subinde vesica impletur, eoque irritatur. Non nisi aquam autem bibendam esse, manifestius est, quam ut subinde dicendum sit.

- 10 Solet vero sub ejusmodi victu evenire, ut alvus non reddatur. Hæc aqua ducenda est, in qua vel fœnum Græcum, vel malva decocta sit. Idem humor rosa mixtus in ipsum vulnus oriculario clystere agendus, ubi id rodit urina, neque purgari patitur. Fere vero primo per vulnus exit hæc: deinde, eo sanescente, dividitur, & pars per colem descendere incipit, donec ex toto plaga claudatur. Quod interdum tertio mense, interdum non ante sextum, nonnunquam exacto quoque anno fit.

Neque desperari debet solida glutinatio vulneris, nisi ubi aut vehementer rupta cervix est, aut ex cancro multæ magnæque carunculæ, simulque nervosa aliqua exciderunt. Sed, ut vel nulla ibi fistula, vel exigua admodum relinquatur, summa cura providendum est. Ergo, cum jam ad cicatricem vulnus tendit, extentis jacere feminibus & cruribus oportet; nisi tamen molles arenosive calculi fuerunt: sub his enim tardius vesica purgatur. Ideoque diutius plagam patere necessarium est: & tum

488 A. CORN. CELSI Lib. 7.  
demum, ubi jam nihil tale extra fertur, ad  
cicatricem perducitur.

Quod, si antequam vesica purgata est,  
oræ se glutinarunt, dolorque & inflamma-  
tio redierunt, vulnus digitis vel averso spe- 5  
cillo diducendum est; ut torquentibus exitus  
detur. Hisque effusis, cum diutius pura uri-  
na descendit, tum demum, quæ cicatricem  
inducant, imponenda sunt, extendendique,  
ut supra docui, pedes, quam maxime juncti. 10

Quod si fistulæ metus ex his causis, quas  
proposui, subesse videbitur, quo facilius  
claudatur ea, vel certe coangustetur, in  
anum quoque danda plumbea fistula est;  
extentisque cruribus femina talique in- 15  
ter se deliganda sunt, donec, qualis futura  
est, cicatrix sit.

#### C A P. XXVIII.

*Si Naturalia foeminarum non admittunt 29  
concupitum, quomodo curari  
conveniat. a*

**E**T hoc quidem commune esse maribus  
& foeminis potest. Proprie vero quæ- 25  
dam ad foeminas pertinent: ut in pri-  
mis, quod earum naturalia nonnunquam,  
inter se glutinatis oris, concubitum non  
admittunt. Idque interdum evenit proti-  
nus in utero matris: interdum <sup>b</sup> exulcera-  
tione in his partibus facta, & per malam 30  
curationem his oris sanescendo junctis. Si  
ex utero est, membrana ori vulvæ opposita  
est; si ex ulcere, caro id replevit.

Opor-

a Aeginet. vi, 72. Aëtius Terrab. iv. Serm. iv, c. 96.  
Hipp. de Steril. XIII, 1. Idem de Natur. Mulieb. VI.  
Joan. Wierus Observ. L. i. p. 935. b Hipp. I. de Morb.  
Mul. T. LXVIII.



Oportet autem membranam duabus lineis, inter se transversis, incidere ad similitudinem literæ c X, magna cura habita, ne urinæ iter violetur: deinde undique eam  
 5 membranam excidere. At, si caro increvit, necessarium est recta linea patefacere: tum ab ora vel vulsella vel hamo apprehensam, tanquam habenulam, excidere: & intus implicitum in longitudinem linamentum (λημίσκον Græci vocant) in aceto tinctum demittere, supraque succidam lanam aceto madentem deligare: tertio die solvere, & vulnus, sicut alia vulnera, curare. Cumque jam ad sanitatem tendet, plumbeam fistulam medicamento cicatricem inducente illinere, eamque intus dare: supraque idem medicamentum injicere, donec ad cicatricem plaga perveniat.

20 C A P. XXIX.  
*Qua ratione partus emortuus ex utero excutiatur.*<sup>a</sup>

Ubi concepit autem aliqua, si jam prope maturus partus intus emortuus est, neque excidere per se potest, adhibenda curatio est. Quæ numerari inter difficillimas potest. nam & summam prudentiam moderationemque desiderat, & maximum periculum affert. Sed ante omnia vul-  
 25  
 30 væ natura mirabilis, cum in multis aliis, tum in hac re quoque facile cognoscitur.

Oportet autem ante omnia<sup>b</sup> resupinam mulierem transverso lecto sic collocare, ut

H h 5 femi-

c Chiasmus vocatur ab Æginet. VI, 51, 65. & ab aliis. H. F. ab Aquapendente Oper. Chirurg. P. I. c. 83.  
 a Æginet. VI, 74. Aëtius Tetrab. IV. Serm. IV, c. 23.  
 b Hippocr. I. de Morb. Mul. T. XCIV. 4.

490 A. CORN. CELSI Lib. 7.  
feminibus ejus ipsius ilia comprimantur.  
quo fit, ut & imus venter in conspectu  
medici fit, & infans ad os vulvæ compella-  
tur; quæ, emortuo partu, id comprimit: ex  
intervallo vero paululum dehiscit. Hac oc- 5  
casione usus medicus, unctæ manus indi-  
cem digitum primum debet inserere, atque  
ibi continere, donec iterum os adaperia-  
tur, rursusque alterum digitum demittere  
debebit, & per easdem occasiones alios, do- 10  
nec tota esse intus manus possit. Ad cujus  
rei facilitatem multum confert & magni-  
tudo vulvæ, & vis nervorum ejus, & corpo-  
ris totius habitus, & mentis etiam robur:  
cum præsertim intus nonnunquam etiam 15  
duæ manus dari debeant.

Pertinet etiam ad rem, quam calidissi-  
mum esse imum ventrem, & extrema cor-  
poris; nequedum inflammationem c acce- 20  
pisse, sed recenti re protinus adhiberi me-  
dicinam. Nam, si corpus jam intumuit,  
neque demitti manus, neque educi infans,  
nisi ægerrime potest; sequiturque sæpe  
cum vomitu, & cum tremore, mortifera  
nervorum distentio. Verum intus emor- 25  
tuo corpori manus injecta protinus habi-  
tum ejus sentit. nam aut in caput, aut in  
pedes conversum est, aut in transversum  
jacet: fere tamen sic, ut vel manus ejus, vel  
pes in propinquo sit. 30

Medici vero propositum est, ut infantem  
manu dirigat vel in d caput e, vel etiam in pe-  
des, si forte aliter compositus est. Ac, si nihil  
aliud est, manus vel pes apprehensus, corpus  
rectius

c Alii copisse. d Alii manus. e Hipocr. I. de Morb.  
Mul. XCV, 2.

rectius reddit. nam manus in caput, pes in pedes eum convertet. Tum, si caput proximum est, demitti debet uncus, undique lævis, acuminis brevis, qui vel oculo, vel auri, vel ori, interdum etiam fronti recte injicitur: deinde attractus infantem educit. Neque tamen quolibet is tempore extrahi debet. nam, si compresso vulvæ ore id tentatum est, non emittente eò, infans abrum-  
 10 pitur, & unci acumen in ipsum os vulvæ delabitur, sequiturque nervorum distentio, & ingens periculum mortis. Igitur, compressa vulva, conquiescere; hiante, leniter trahere oportet; & per has occasio-  
 15 nes paulatim eum educere. Trahere autem dextra manus uncum; sinistra, intus posita, infantem ipsum, simulque dirigere eum debet.

Solet etiam evenire, ut is infans *f* humore distendatur; exque eo profluat foedi odoris sanies. Quod si tale est, indice digito corpus illud forandum est, ut, effuso humore extenuetur: tum id leniter per ipsas manus recipiendum est. nam uncus in-  
 20 jectus putri corpusculo facile elabitur. in quo quid periculi sit, supra positum.

Sed in pedes quoque conversus infans non difficulter extrahitur. namque his apprehensis per ipsas manus commode educi-  
 30 tur.

Si vero transversus est, neque dirigi potuit; uncus alæ injiciendus, paulatimque attrahendus est. Sub quo fere cervix replicatur, retroque caput ad reliquum corpus spectat.

492 A. CORN. CELSI Lib. 7.  
spectat. Remedio est, cervix præcisa; ut se-  
paratim utraque pars auferatur. Id unco fit,  
qui, priori similis, in interiore tantum parte  
per totam aciem excucitur. Tum id agen-  
dum est, ut ante caput, deinde reliqua pars 5  
auferatur: quia fere, majore parte extracta,  
caput in vacuum vulvam prolabitur, ex-  
trahique sine summo periculo non potest.

Si tamen id incidit, super ventrem mu-  
lieres duplici panniculo injecto, valens ho- 10  
mo, non imperitus, à sinistro latere ejus  
debet assistere, & super anum ventrem ejus  
duas manus imponere, alteraque alteram  
premere. quò fit, ut illud caput ad os vulvæ  
compellatur, idque tum eadem ratione, quæ 15  
supra posita est, unco extrahi possit.

At, si pes alter juxta repertus est, alter re-  
tro cum corpore est, quicquid prolapsum  
est, paulatim abscindendum est. Et, si clu-  
nes os vulvæ urgere cœperunt, iterum re- 20  
tro repellendæ sunt, conquistusque pes  
ejus adducendus. Aliæque etiamnum diffi-  
cultates faciunt, ut, qui solidus non exit,  
concisus eximi debeat.

Quoties autem infans protractus est, tra- 25  
dendus ministro est. Is eum supinis mani-  
bus sustinere, medicus deinde sinistra manu  
leniter trahere umbilicum debet ita, ne  
abruptat, dextraque eum sequi usque ad  
eas, quas Secundas vocant, quod vela- 30  
mentum infantis intus fuit: hisque ulti-  
mis apprehensis, venulas membranulas-  
que omnes eadem ratione manu diducere  
à vulva, totumque illud extrahere, & si quid  
intus

intus præterea concreti sanguinis remanet. Tum compressis in unum feminibus, illa in conclavi collocanda est, modicum calorem, sine ullo perflatu, habente. Super  
 5 imum ventrem ejus imponenda lana succida, in aceto & rosa tincta. Reliqua curatio talis esse debet, qualis in inflammationibus, & in his vulneribus, quæ in nervosis locis sunt, adhibetur.

10

## C A P. X X X.

*De Ani vitiis.*

414.

**A**NI quoque vitia, ubi medicamentis  
 non vincuntur, manus auxilium de-  
 15 siderant. Ergo, si qua fissa in eo ve-  
 tuftate induruerunt, jamque callum ha-  
 bent, commodissimum est, ducere alvum;  
 tum spongiam calidam admovere, ut re-  
 laxentur illa, & foras prodeant: ubi in con-  
 20 spectu sunt, scalpello singula excidere, &  
 ulcera a renovare; deinde imponere lina-  
 mentum molle, & super linteolum illitum  
 melle; locumque cum molli lana implere,  
 & ita vincire: altero die, deincepsque cæte-  
 25 ris, lenibus medicamentis uti; quæ ad re-  
 centia eadem vitia necessaria esse, alias pro-  
 posui: utique per primos dies sorbitionibus  
 cum sustinere, paulatim deinde cibis adji-  
 cere aliquid, generis tamen ejus, quod eo-  
 30 dem loco præceptum est. Si quando autem  
 ex inflammatione pus in his oritur, ubi  
 primum id apparuit, incidendum est; ne  
 anus ipse suppuret. Neque tamen ante pro-  
 perandum est. nam, si crudum incisum est,  
 in-

a Alii removere.



494 A. CORN. CELSI Lib. 7.  
inflammationi multum accedit, & puris a-  
liquanto amplius concitatur. His quoque  
vulneribus, lenibus cibis, iisdemque medi-  
camentis opus est.

2. De Condylomatis. b

5

400,  
14.  
403,  
11.

At tubercula, quæ *κονδυλώματα* appel-  
lantur, ubi induruerunt, hac ratione cu-  
rantur. Alvus ante omnia ducitur. Tum  
vulsella tuberculum apprehensum, juxta  
radices exciditur. Quod ubi factum est, ca- 10  
dem sequuntur, quæ supra post curationem  
adhibenda esse proposui: tantummodo, si  
quid increfcit, squama æris coercendum  
est.

3. De Hemorrhoidibus. c

15

401,  
22.

Ora etiam venarum, fundentia sangui-  
nem, sic tolluntur. Ubi sanguini, qui effluit,  
fanies adjicitur, alvus acribus ducitur; quo  
magis ora promoveantur. eoque fit, ut d o-  
mnia vasa, quasi capitula conspicua sint. 20  
Tum, si capitulum exiguum est, basimque te-  
nuem habet, adstringendum lino paulum su-  
pra est, quam ubi cum ano committitur, im-  
ponendaque spongia ex aqua calida est, do-  
nec id liveat: deinde aut ungue, aut scalpel- 25  
lo, supra nodum id exulcerandum est. Quod  
nisi factum est, magni dolore; subsequun-  
tur: interdum etiam urinæ difficultas. Si id  
majus est, & basis latior, hamulo uno aut  
altero excipiendum est, paululumque supra 30  
basim incidendum: neque relinquendum  
quicquam ex eo capitulo, neque quicquam  
ex ano demendum est. quod consequitur  
is, qui neque nimium, neque parum hamos  
ducit.

b Æginet. VI, 80. c Æginet. VI, 79. d Alii, *Ronf-*  
*seus omnes vena.*

ducit. Qua incisum est, acus debet immitti, infraque eam lino id capitulum alligari. Si duo triave sunt, intimum quodque primum curandum est: si plura, non omnia simul; ne tempore eodem undique teneræ cicatrices sint. Si sanguis profluit, excipiendus est spongia: deinde linamentum imponendum, unguenda femina, & inguina, & quicquid juxta ulcus est, ceratumque superdandum, & farina hordeacea calida implendus is locus, & sic deligandus est. Postero die is desidere in aqua calida debet, eodemque cataplasmate foveri. Ac bis die, & ante curationem, & post eam, coxendices ac femina liquido cerato perungenda sunt; tepidoque is loco continendus. Interpositis quinque aut sex diebus, oriculario specillo linamenta educenda, &, si capitula simul non exciderunt, digito promovenda: tum lenibus medicamentis, iisdemque, quæ alibi posui, ulcera ad sanitatem perducenda. Finito vitio, quemadmodum agendum esset, jam alias superius exposui.

C A P. XXXI.

25

*De Varicibus. a*

**A**B his ad crura proximus transitus est. In quibus orti varices non difficili ratione tolluntur. Huc autem & earum venularum, quæ in capite nocent; & eorum varicum, qui in ventre sunt, curationem distuli: quoniam ubique eadem est. Igitur vena omnis, quæ noxia est, aut adusta tabescit, aut manu exciditur. Si

<sup>a</sup> Aeginet. VI, 82.

Si recta; si quamvis transversa, tamen simplex; si modica est, melius aduritur. Si curva est, & velut in orbes quosdam implicatur, pluresve inter se involvuntur, utilius excidere est.

Adurendi ratio hæc est. Cutis superinciditur: tum, patefacta vena, tenui & retuso ferramento candente modice premitur; vitaturque, ne plagæ ipsius oræ adurantur: quas reducere hamulis facile est. Id interpositis fere quaternis digitis per totum varicem fit: & tum superponitur medicamentum, quo adusta sanantur.

At exciditur hoc modo. Cute eadem ratione super venam incisa, hamulo oræ excipiuntur; scapelloque undique à corpore vena diducitur; caveturque, ne inter hæc ipsa lædatur; eique retusus hamulus subjicitur; interpositoque eodem fere spacio, quod supra positum est, in eadem vena idem fit: quæ, quo tendat, facile hamulo extento cognoscitur.

Ubi jam idem, quacunque varices sunt, factum est, uno loco adducta per hamulum vena præciditur: deinde, qua proximus hamus est, attrahitur & evellitur; ibique rursus abscinditur. Ac sic undique varicibus crure liberato, tum plagarum oræ committuntur, & super emplastrum glutinans injicitur.

## C A P. XXXII.

*De Digitis cohærentibus, & curvatis.*

5 **A**T, si digiti vel in utero protinus, vel propter communem exulcerationem postea cohæserunt, scalpello diducuntur: dein separatim uterque non pingui emplastro circumdatur: atque ita per se u-  
10 terque sanescit.

Si vero fuit ulcus in digito, posteaque male inducta cicatrix curvum eum reddidit; primum malagma tentandum est: dein, si id nihil prodest (quod & in veteri  
15 cicatrice, & ubi nervi læsi sunt, evenire consuevit) videre oportet, nervine id vitium, an cutis sit. Si nervi est, attingi non debet: neque enim sanabile est. Si cutis, tota cicatrix excidenda est, quæ fere callo-  
20 sa efficit, ut extendi digitus non possit. Tum rectus sic ad novam cicatricem perducendus est.

## C A P. XXXIII.

*De Gangræna.*

25 **G**ANGRÆNAM inter unguis alasque, aut inguina nasci; & siquando medicamenta vincuntur, membrum præcidi oportere, alio loco mihi dictum est.

30 Sed id quoque cum periculo summo fit. 304  
nam sæpe in ipso opere, vel profusione sanguinis vel animæ defectione moriuntur. Verum hic quoque nihil interest, an  
satis tutum præsidium sit, quod unicum est.

I i

Igitur

Si inter sanam vitiatamque partem incidenda scalpello caro usque ad os est sic, ut neque contra ipsum articulum id fiat, & potius ex sana parte aliquid excidatur, quam ex ægra relinquatur. Ubi ad os ventum est, reducenda ab eo sana caro, & circa os subsecanda est, ut ea quoque parte aliquid ossis nudetur: dein id ferrula præcidendum est, quam proxime sanæ carni etiam inhærenti: ac tum frons ossis, quam ferrula exasperavit, lævanda est, supraque inducenda cutis. quæ sub ejusmodi curatione laxa esse debet, ut quam maxime undique os contegat. Quo cutis inducta non fuerit, id linamentis erit contegendum, & super id spongia ex aceto deliganda. Cætera postea sic facienda, ut in vulneribus, in quibus pus non moveri debet, præceptum est.

## LIBER OCTAVUS.

## CAP. I.

*De positu & figura Ossium totius  
humani corporis.*

**S**UPEREST ea pars, quæ ad ossa pertinet. Quæ quo facilius accipi possit, prius positus figuraeque eorum indicabo. Igitur calvaria incipit ex interiore parte concava, extrinsecus gibba, utrinque lævis, &, qua cerebri membranam contegit, & qua cute, capillum gignente, con-

\* Græci *μνίγγας*, Macrob. Saturn. L. 7. *Omentum* vocant.



tegitur. Eaque simplex, ab occipitio & temporibus; duplex, usque in verticem à fronte, est. Ossaque ejus, ab exterioribus, dura; ab interioribus, quibus inter se connectuntur, molliora sunt. Interque ea venæ discurrunt, quas his alimentum subministrare, credibile est.

Raro autem calvaria solida, sine \*suturis est: locis tamen æstuosis facilius invenitur. & id caput firmissimum, atque à dolore tutissimum est: ex cæteris, quo futuræ pauciores sunt, eo capitis valetudo commodior est. neque † enim certus earum numerus est, sicut nec locus quidem. Fere tamen duæ, super aures, tempora à superiore capitis parte discernunt: tertia, ad latera per verticem tendens, occipitium à summo capite diducit: quarta, ab eodem vertice per medium caput ad frontem procedit; eaque modo sub imo capillo definit, modo frontem ipsam secans inter supercilia finitur. Ex his cæteræ quidem futuræ in unguem committuntur: hæ vero, quæ super aures transversæ sunt, totis oris paulatim extenuantur; atque ita inferiora ossa superioribus leniter ‡ insidunt. Crassissimum vero in capite os post aurem est; qua capillus, ut verisimile est, ob id ipsum non gignitur. Super hos quoque musculos, qui tempora § contegunt, os medium, in exterioriorem partem inclinatum, positum est. At facies futuram habet maximam. quæ à tempore incipiens, per medios oculos, naresque transversa pervenit ad alterum tempus.

I i 2

pus.

\* Nonnumquam tamen observatur, uti variis exemplis probat Vertunianus ad Hippocr. de Vulneribus Capitis, pag. 45. † etiam leg. Pauw, pag. 6. ‡ assidens leg. Pauw, p. 12. § connectunt, Pauw, p. 12.

pus. A qua breves duæ sub interioribus angulis deorsum spectant. Et malæ quoque in summa parte singulas transversas futuras habent. A mediisque naribus, aut superiorum dentium gingivis, per medium palatum una procedit; aliaque transversa idem palatum secat. Et suturæ quidem in plurimis hæ sunt.

Foramina autem, intra caput, maxima oculorum sunt; deinde narium; tum quæ<sup>10</sup> in auribus habemus. Ex his, quæ oculorum sunt, recta simpliciaque ad cerebrum tendunt. Narium duo foramina osse medio discernuntur. siquidem hæc primum à superciliis, angulisque oculorum, osse in-<sup>15</sup> choantur ad tertiam fere partem: deinde in cartilagine[m] versa, quo propius ori descendunt, eo magis caruncula quoque molliuntur. Sed ea foramina, quæ à sum-<sup>20</sup> mis ad intimas nares simplicia sunt, ibi rursus in bina itinera dividuntur: aliaque ex his, ad fauces pervia, spiritum & reddunt & accipiunt; alia ad cerebrum tendunt. In ultima parte in multa & tenuia foramina dissipantur, per quæ sensus odo-<sup>25</sup> ris nobis datur. In aure quoque primo rectum & simplex iter procedendo flexuosum fit. Quod juxta cerebrum in multa & tenuia foramina diducitur, per quæ facultas audiendi est. Juxta ea duo parvuli<sup>30</sup> quasi sinus sunt; superque eos finitur os, quod transversum à genis tendens, ab inferioribus ossibus sustinetur. Jugale appellari potest ab eadem similitudine, à qua id  
Græci

Græci ζυγώδες appellat. Maxilla vero est molle os, eoque una est. Cujus eadem & media, & etiam ima pars, mentum est: à quo utrinque procedit ad tempora; sola-  
 5 que ea movetur. Nam malæ cum toto osse, quod superiores dentes excipit, immobiles sunt. Verum ipsius maxillæ partes extremæ quasi bicornes sunt. Alter processus, intra latior, vertice ipso tenuatur,  
 10 longiusque procedens sub osse jugali subit, & super id temporum musculis illigatur. Alter brevior & rotundior, & in eò sinu, qui juxta foramina auris est, cardinis modo fit; ibique huc & illuc se inclinans maxillæ  
 15 \* facultatem motus præstat.

Duriores osse dentes sunt: quorum pars maxillæ, pars superiori ossi malarum hæret. Ex his quaterni primi, quia secant, τριμνοὶ à Græcis nominantur. Hi deinde  
 20 quatuor caninis dentibus ex omni parte cinguntur. Ultra quos utrinque fere 1 maxillares 2 quini sunt, præterquam in iis, in quibus 3 genuini, qui sero gigni solent, 4 non increverunt. Ex his primores singulis radicibus; maxillares utique binis; quidam etiam ternis, quaternisve nituntur. Fereque longior radix brevior dentem edit; rectique dentis recta etiam radix, curvi flexa est. Ex ea radice in pueris novus  
 25 dens subit, qui multo sæpius priorem expellit: interdum tamen supra infrave cum se ostendit.

Caput autem spina excipit. Ea constat ex vertebra quatuor & viginti. Septem in

I i 3 cer-

\* Facilitatem alii, sed malè, Pauw pag. 23. 1. militares i. e. molares vocat Soranus Ephesius, Isag. C. 17. 2. quaterni. 3. ultimi. 4. jam, Pauw, pag. 26.

cervice sunt, duodecim ad costas, reliquæ  
 quinque sunt proximæ costis. Hæ teretes  
 brevesque, ab utroque latere, processus  
 duos 1. exigunt: mediæ perforatæ, qua spinæ  
 medulla cerebro commissa descendit: 2. late- 5  
 ra quoque inter duos processus tenuibus  
 cavis pervia, per quæ à membrana cerebri  
 similes membranulæ deducuntur. Omnes-  
 que vertebræ (exceptis tribus summis) à  
 superiore parte in ipsis processibus parum 10  
 deficientes sinus habent: ab inferiore alios  
 deorsum versus processus exigunt. Summa  
 igitur protinus caput sustinet, per duos si-  
 nus receptis exiguis ejus processibus. Quo  
 fit, ut caput deorsum 3 parvis tuberibus ex- 15  
 asperetur. Secunda 4 superioris parti 5 inferiori  
 inseritur. Quod ad circuitum pertinet,  
 pars summa angustiore orbe finitur. itaque  
 superior secundæ circumdata in latera  
 quoque caput moveri sinit. Tertia eodem 20  
 modo secundam excipit. Ex quo facilis  
 cervici mobilitas est. Ac, ne sustinere qui-  
 dem caput posset, nisi utrinque recti va-  
 lentisque nervi collum continerent, quos  
 κάρπαια Græci appellant. siquidem ho- 25  
 rum inter omnes flexus alter semper in-  
 tentus ultra prolabi superiora non patitur.  
 Jamque vertebra tertia tubercula, quæ in-  
 feriori inserantur, excipit. Cæteræ pro-  
 cessibus deorsum spectantibus in inferiori 30  
 res insinuantur, ac per sinus, quos utrin-  
 que habent, superiores accipiunt, multif-  
 que nervis & multa cartilagine continen-  
 tur. Ac sic, uno flexu modico in prouum  
 dato,

1. *exserunt* legit Pauw, p. 32. 2. *ea* leg. Pauw,  
 p. 32. 1. e. spinæ medulla. 3. *versus*, Pauw, p. 64.  
 4. *Superiori*. 5. *inferioris*, Pauw, p. 64.

dato, cæteris negociis homo & rectus infistit, & alioqui ad necessaria opera curvatur.

Infra cervicem vero summa costa contra humeros sita est. Inde septem inferiores usque ad imum pectus perveniunt: hæque, primis partibus rotundæ & leniter quasi capitulatæ, vertebrarum transversis processibus, ibi quoque paululum sinuatis, inhærent: inde latefcunt, & in exteriorem partem recurvatæ paulatim in cartilaginem degenerant; eaque parte rursus in interiora leniter flexæ committuntur cum osse pectoris. Quod valens ac durum à faucibus incipit, ab utroque latere lunatum, & à præcordiis, jam ipsum quoque cartilagine molli-  
 10  
 15  
 20  
 25  
 30

terminatur. Sub costis vero superioribus quinque (quas *κόσται* Græci nominant) breves tenuioresque, atque ipsæ quoque paulatim in cartilaginem versæ, extremis abdominis partibus inhærescunt; imaque ex his, majore jam parte nihil, nisi cartilago est.

Rursus, à cervice duo lata ossa utrinque ad scapulas tendunt: nostri scutula operta; *σμοπλάται* Græci nominant. Ea in summis verticibus sinuata, ab his triangula, paulatimque latefcunt ad spinam tendunt; & quo latiora quaque parte sunt, hoc hebetiora. Atque ipsa quoque, in imo cartilaginosa, posteriore parte velut innatant; quoniam, nisi in summo, nulli ossi inhærescunt. Ibi vero validis musculis nervisque constricta sunt.

At à summa costa paulo interius;  
 li 4 quam



quam ubi ea media est, os excrefcit, ibi quidem tenue, procedens vero, quo propius lato scapularum offi fit, eo plenius latiusque est, paululum in interiora curvatum. quod protinus altera verticis parte modice intumescens, sustinet jugulum. Id ipsum recurvum ac inter durissima ossa numerandum, altero capite in eo, quod posui, altero in exiguo sinu pectoralis ossis insidit, paululumque motu brachii movetur, & cum lato osse scapularum, infra caput ejus, nervis & cartilagine connectitur.

Hinc humerus incipit, extremis utrinque capitibus tumidus, mollis, sine medulla, cartilagosus: medius teres, durus, medullifolus: leniter cavus, in priorem & interiorrem; gibbus, in posteriorem & exteriorrem partem. Prior autem pars est, quæ à pectore est: posterior, quæ ab scapulis: interior, quæ ad latus tendit: exterior, quæ ab eo recedit. quod ad omnes articulos pertinere, in ulterioribus patebit. Superius autem humeri caput rotundius, quam cætera ossa, de quibus adhuc dixi, verticillati scapularum offi inseritur, ac majore parte extra id situm nervis deligatur. At inferius duos processus habet: inter quos, quod medium est, magis etiam extremis partibus sinuatur.

Quæ res sedem brachio præstat. quod constat ex ossibus duobus. Radius, quem *ῥαχίς* Græci appellant, superior breviorque, & primo tenuior, rotundo & leniter cavo capite exiguum humeri tuberculum recipit. quod ibi nervis & cartilagine continetur.

tinetur. Cubitus inferior longiorque, & primo plenior, in summo capite duobus quasi verticibus extantibus in sinum humeri, quem inter duos processus ejus esse  
5 proposui, se inserit. Primo vero duo, radii & brachii, ossa juncta paulatim dirimuntur, rursusque ad manum coeunt, modo crassitudinis mutato. Siquidem ibi radius plenior, cubitus admodum tenuis est. Dein ra-  
10 dius, in caput cartilagosum consurgens, in cervicem ejus insinuatur. Cubitus rotundus in extremo, parte altera paululum procedit. Ac, ne sæpius dicendum sit, illud ignorari non oportet, plurima ossa in carti-  
15 laginem desinere, nullum articulum non sic finiri. Neque enim aut moveri posset, nisi lævi innitererur; aut cum carne nervisque conjungi, nisi ea media quædam materia committeret.

20 In manu vero prima palmæ pars ex multis minutisque ossibus constat, quorum numerus incertus est. Sed oblonga omnia, & triangula, structura quadam inter se connectuntur, cum invicem superior alterius  
25 planities sit: eoque fit ex his unius ossis paululum in interiora concavi species. Verum ex manu duo exigui processus in sinum radii conjiciuntur. Tum ex altera parte quinque ossa recta, ad digitos tendentia,  
30 palmam explent. A quibus ipsi digiti oriuntur: qui ex ossibus ternis constant, omniumque eadem ratio est. Interius os in vertice sinuatur, recipitque exterioris exiguum tuberculum, nervique ea continent. A qui-

bus orti unguis indurescunt. Ideoque non ossi sed carni magis radicibus suis inhærent. At superiores quidem partes sic ordinatæ sunt.

Ima vero spina in coxarum osse desinit; 5  
quod transversum longeque valentissimum, vulvam, vesicam, rectum intestinum tuetur. Idque ab exteriori parte gibbum; ad spinam, resupinatum; à lateribus, id est, in ipsis coxis, sinus rotundos habet. A quibus oritur 10  
os, quod pectinem vocant; idque, super intestina sub pube transversum, ventrem firmat: rectius in viris, recurvatum magis in exteriora in foeminis, ne partum prohibeat.

Inde femina oriuntur. Quorum capita 15  
rotundiora etiam, quam humerorum sunt; cum illa ex cæteris rotundissima sint. Infra vero duos processus à priori & à posteriore parte habent. Dein dura, & medullosa, & ab exteriori parte gibba, rursus ab infe- 20  
rioribus quoque capitibus intumescunt: superiora in sinus coxæ, sicut humeri in ea ossa, quæ scapularum sunt, conjiciuntur; tum infra introrsus leviter tendunt, quo æqualius superiora membra sustineant. At- 25  
que in eo inferiora quoque capita media sinuantur, quo facilius excipi à cruribus possint. Quæ commissura osse parvo, molli, cartilaginoso tegitur, patellam vocant. Hæc super innatans, nec ulli ossi inhærens, sed 30  
carne & nervis deligata, pauloque magis ad femoris os tendens, inter omnes crurum flexus juncturam tuetur.

Ipsam autem crus est ex ossibus duobus.  
Etenim

Etenim per omnia femur humero, crus vero brachio simile est: adeo ut habitus quoque & decor alterius ex altero cognoscatur. quod ab ossibus incipiens, etiam in carne  
 5 respondet. Verum alterum os ab exteriori parte suræ positum est: quod ipsum quoque fura recte nominatur. Id brevius, supraque tenuius, ad ipsos talos intumescit. Alterum à priore parte positum, cui tibiæ nomen  
 10 est, longius & in superiore parte plenius, solum cum femoris inferiore capite committitur; sicut cum humero cubitus. Atque ea quoque ossa, infra supraque conjuncta, media, ut in brachio, dehiscunt.  
 15 Excipitur autem crus infra osse ex transverso talorum; idque ipsum super os calcis situm est. quod quadam parte sinuatur, quadam excessus habet, & procedentia ex talo recipit, ut in sinum ejus inferitur. Idque  
 20 sine medulla durum, magisque in posteriorem partem projectum, teretem ibi figuram representat. Cætera ossa pedis ad eorum, quæ in manu sunt, similitudinem instructa sunt. Plantæ palmis, digiti digitis,  
 25 unguis unguibus respondent.

## C A P. I I.

*Ossa vitiata & corrupta quibus signis cognoscantur, & qua ratione curentur.*

30

**O**MNE autem os, ubi injuria accessit, aut vitiatur, aut finditur, aut frangitur, aut foratur, aut colliditur, aut de loco movetur. Id, quod vitiatum est,  
 pri-

primo fere pingue fit, deinde vel a nigrum,  
 vel cariosum. quæ, supernatis gravibus ul-  
 ceribus aut fistulis, hisque vel longa vetu-  
 state, vel etiam cancro occupatis, eveniunt.  
 Oportet autem ante omnia os nudare, ul- f  
 cere exciso, & si latius est ejus vitium, quam  
 ulcus fuit, carnem subsecare, donec undi-  
 que os integrum patefiat: tum id, quod pin-  
 gue est, semel iterumve satis est admoto  
 ferramento adurere, ut ex eo squama sece- 10  
 dat; aut radere, donec jam aliquid cruoris  
 ostendatur, quæ integri ossis nota est. nam  
 necesse est aridum sit id, quod vitiatum est.  
 Idem in cartilagine quoque læsa faciendum  
 est. siquidem ea quoque scalpello radenda 15  
 est, donec integrum id sit, quod relinqui-  
 tur. Deinde, si os siue cartilago rasa est,  
 nitro bene trito respergendum est. Neque  
 alia facienda sunt, ubi caries, nigritiesve in  
 summo osse est. siquidem id vel paulo diuti- 20  
 us eodem ferramento adurendum, vel ra-  
 dendum est. qui radit hæc, audacter im-  
 primere ferramentum debet, ut & agat ali-  
 quid, & maturius desinat. Finis est, cum  
 vel ad album os, vel ad solidum ventum 25  
 est. Albo finiri ex nigritie vitium, solidi-  
 tate quadam ex carie, manifestum est. Ac-  
 cedere etiam cruoris aliquid integro, supra  
 dictum est. Si quando autem altius descen-  
 derit utrumlibet, dubium est. 30

In carie quidem expedita cognitio est,  
 si specillum tenue in foramina demittitur;  
 quod magis minusve intrando, vel in sum-  
 mo cariem esse, vel altius descendisse, testatur.

Colligi



- Colligi idem potest etiam ex dolore, & ex febre, quæ ubi mediocria sunt, illa alte descendisse non potest. Manifestior tamen adacta terebra fit. nam finis vitii est, ubi scobis nigra esse desit. Igitur, si caries alte descendit, per terebram urgenda crebris foraminibus est, quæ altitudine vitium æquent: tum in ea foramina demittenda candentia ferramenta sunt, donec siccum os ex toto fiat. simul enim & post hæc solvetur ab inferiore osse, quodcumque vitiatum est; & is sinus carne replebitur; & humor aut nullus postea feretur, aut mediocris.
- 15 Sin autem nigrities est, aut si caries ad alteram quoque partem ossis transit, oportet excidi. Idem quoque in carie, ad alteram partem ossis penetrante, fieri potest. Sed quod totum vitiatum, totum eximendum.
- 20 est. Si inferior pars integra est, eatenus, quod corruptum est, excidi debet. Item si capitis, si pectoris os, si costa cariiosa est, inutilis ustio, sed excidendi necessitas est. Neque audiendi sunt, qui osse nudato, diem tertium expectant, ut tunc excidant. ante inflammationem enim tutius omnia tractantur. Itaque, quantum fieri potest, eodem momento & cutis incidenda est, & os detegendum, & omni vitio liberandum est. Longeque perniciosissimum est, quod in osse pectoris est: quia vix, etiamsi recte cessit curatio, veram sanitatem reddit.

## C A P. III.

*Quomodo os excidatur; & de Modiolo, & Terebra, ferramentis ad id paratis.*

**E**XCIDITUR vero os duobus modis. Si parvulum est, quod læsum est, \* modiolus, quem *χοιρίκιον* Græci vocant: si spatiosius, terebris. Utriusque rationem proponam. Modiolus ferramentum concavum, terebra, est, imis oris ferratum: per quod medium clavus, ipse quoque interiore orbe cinctus demittitur. Terebrarum autem duogenera sunt: alterum simile ei, quo fabri utuntur: alterum capituli longioris, quod ab acuto mucrone incipit, deinde subito latius fit; atque iterum ab alio principio paulo minus quam æqualiter sursum procedit.

Si vitium in angusto est, quod comprehendere modiolus possit, ille potius aptatur. At, si caries subest, medius clavus in foramen demittitur. Si nigrities, angulo scalpri sinus exiguus sit, qui clavum recipiat, ut, eo insistente, circumactus modiolus delabi non possit: deinde his habena quasi terebra, convertitur. Estque † quidam premendi modus, ut & foretur, & circumagatur: quia, si leviter imprimitur, parum proficit; si graviter, non movetur. Neque alienum est, instillare paululum rosæ, vel lactis, quo magis lubrico circumagatur. quod ipsum tamen, si copiosius est, aciem ferramenti hebetat. At, ubi jam iter modiolo impressum est, medius clavus educitur, & ille per

\* Vide Francisc. Vertunian. Comment. in Hipocr. Lib. de cap. vulner. p. 89. 90. H. F. ab Aquapend Oper. Chirurg. P. 1. G. 2. † Quid in premendi modo, Pauw. p. 85.

per se agitur. deinde, cum sanitas inferioris partis scobe cognita est, modiolus remove-  
tur.

\* At, si latius vitium est, quam ut illo com-  
prehendatur, terebra res agenda est. Ea fo-  
ramen fit in ipso sine vitiosi ossis atque in-  
tegrum: deinde alterum non ita longe, ter-  
tiumque, donec tactus is locus, qui exci-  
dendus est, his cavis cinctus sit. atque ibi  
10 quoque, quatenus terebra agenda sit, sco-  
bis significat. Tum excisarius scalper ab al-  
tero foramine ad alterum malleolo adactus  
id, quod inter utrumque medium est, ex-  
cidit; ac si ambitus similis ei sit, qui in an-  
15 gustiorem orbem modiolis imprimitur. U-  
tro modo vero id circumductum est, idem  
excisarius scalper, & in osse corrupto pla-  
nus, summam quamque testam lævet, donec  
integrum os relinquatur.

20 Vix unquam nigrities integrum, caries  
per totum os perrumpit, maximeque ubi  
vitiata calvaria est. Id quoque vitii specillo  
significatur. quod depressum in id fo-  
ramen, quod infra solidam sedem habet, &  
25 renitens aliquid invenit, & madens exit. Si  
pervium invenit, altius descendens inter os  
& membranam, nihil oppositum invenit,  
educiturque siccum: non quo non subsit  
aliqua vitiosa sanies; sed quoniam ibi, ut  
30 in latiore sede, diffusa fit.

Sive autem nigrities, quam terebra dete-  
xit, sive caries, quam specillum ostendit, os  
transit, modiolis quidem usus fere superva-  
cua est; quia latius pateat necesse est, quod  
tam

\* Leg. *Ac sic*, Pauw, p. 87. a *Al. lavigat, leviget*,  
Pauw, p. 87.

tam alte processit. Terebra vero ea, quam secundo loco posui, utendum; eaque, ne nimis incalescat, subinde in aquam frigidam demittenda est. Sed tum majore cura agendum est; cum jam aut simplex os dimidium perforatum est; aut in duplici superius. illud spatium ipsum; hoc sanguis significat. Ergo tum lentius ducenda habena, suspendendaque magis sinistra manus est, & sæpius attollenda, & foraminis altitudo consideranda, ut, quandocunque os perripitur, \* sentiamus, neque periclitemur, ne mucrone cerebri membrana lædatur: ex quo graves inflammationes, cum periculo mortis b oriuntur.

Factis foraminibus, eodem modo media septa; sed multo circumspectius, excidenda sunt; ne forte angulus scalpri eandem membranam violet; donec fiat aditus, per quem membranæ custos immittatur. *μηνιγγοφό- λακα* Græci vocant. lamina autem ænea est, firma, paululum resima, ab exteriori parte lævis. Quæ demissa sic, ut exterior pars ejus cerebro propior sit, subinde ei subjicitur, quod scalpri discutiendum est: ac, si excipit ejus angulum, ultra transire non patitur: eoque & audacius, & tutius, scalprium malleolo subinde medicus ferit, donec excisum undique os, eadem lamina levetur, tollique sine ulla noxa cerebri possit. Ubi totum os ejectum est, circumradendæ lævandæque sunt oræ, & si quid scobis membranæ insedit, colligendum. Ubi, superiori parte sublata, inferior relicta est, non

283,  
28.519,  
16.

\* *Periclitemur*, hoc est probemus, Vertunian. p. 92.  
b Aph. VI, 18.

non oræ tantum, sed os quoque totum lævandum est; ut sine noxa postea cutis increfcatur, quæ aspero offi innascens protinus non sanitatem, sed novos dolores movet.

- 5 Patefacto cerebro, qua ratione agendum sit, dicam, cum ad fracta ossa pervenero. Si basis aliqua servata est, superimponenda sunt medicamenta non pingua, quæ recentibus vulneribus accommodantur; supraque imponenda lana succida, oleo atque aceto madens. Ubi tempus processit, ab ipso osse caro increfcit, eaque factum manusinum complet. Si quod etiam os adustum est, à parte sana recedit; subitque inter integram atque emortuam partem caruncula, quæ, quod abscellit, expellat. eaque fere, quia testa tenuis & angusta est, *λεπίς*, id est squama, à Græcis nominatur.

- Potest etiam evenire, ut ex ictu neque fin-  
 20 datur os, neque perfringatur; sed summum tantum collidatur, exaspereturque. Quod ubi incidit, radi & lævari satis est. Hæc quamvis maxime fiunt in capite, tamen cæteris quoque ossibus communia sunt: ut,  
 25 ubicunque idem incidet, eodem remedio sit utendum. At, cum ea fracta, fissa, forata, collisa sunt, quasdam proprias in singulis generibus, quasdam communes in pluribus curationes requirunt. De quibus protinus dicam, initio ab eadem calvaria accepto.  
 30



*De Calvaria fracta. a*

**I**GITUR, ubi calvaria b percussa, protinus  
 requirendum est, \* num bilem is homo  
 vomuerit; num † oculi ejus obcæcati sint;  
 num obmutuerit; num per nares aureve san-  
 guis ei effluxerit; num conciderit; num sine  
 sensu quasi dormiens jacuerit. Hæc enim non  
 nisi osse fracto eveniunt. Atque, ubi incide- 10  
 runt, scire licet, necessariam, sed difficilem  
 curationem esse. Si vero etiam torpor ‡ acces-  
 sit; si mens non constat, si nervorum vel re-  
 solutio vel distentio secuta est; verisimile est,  
 etiam cerebri membranam esse violatam: eo- 15  
 que in angusto magis spes est. At, si nihil  
 horum secutum est, & jam potest dubitari,  
 an os fractum sit; & protinus considerandum  
 est, lapide, an ligno, an ferro, an alio telo  
 percussum sit, & hoc ipso lævi an aspero, 20  
 mediocri an vastiore, vehementer an leviter.  
 quia quo mitior ictus fuit, eo facilius os ei  
 restitisse credibile est. Sed nihil tamen melius  
 est, quam certiore id nota explorare. Ergo,  
 qua plaga est, demitti specillum oportet, ne- 25  
 que nimis tenue, neque acutum; ne, cum in  
 quosdam naturales sinus inciderit, opinionem  
 fracti ossis frustra faciat: neque nimis plenum;  
 ne parvulæ rimulæ fallant. Ubi specillum ad  
 os venit, si nihil nisi læve & lubricum occur- 30  
 rit, integrum id videri potest: si quid asperi  
 est, utique qua futuræ non sint, fractum os  
 esse testatur. A su-

a Æginet. VI, 90. b Omnes edit. *perussa*. \* Plura quæ  
 Recentiores adjiciunt, signa enumerat Vertunianus in  
 Comment. ad Hippocr. Lib. de Cap. vulnerib. p. 68, 69.  
 † Malè, potius, *si oculi obtenebrarint*, ex Hippocrate.  
 Vertunian. ibid. p. 68. ‡ Græcis *νάρος*. Idem pag. 71.

A futuris se deceptum esse, c Hippocrates  
 memoriæ tradidit, more scilicet magnorum  
 virorum, & fiduciam magnarum rerum ha-  
 bentium. Nam levia ingenia, quia nihil ha-  
 5 bent, nihil sibi detrahunt. Magno ingenio,  
 multaque nihilominus habituro, convenit  
 etiam simplex veri erroris confessio; præci-  
 pueque in eo ministerio, quod utilitatis cau-  
 sa posteris traditur; ne qui decipiantur ea-  
 10 dem ratione, qua quis ante deceptus est. Sed  
 hæc quidem alioquin memoria magni pro-  
 fessoris, uti interponeremus, effecit.

Potest autem futura eo nomine fallere,  
 quia æque aspera est; ut aliquis hanc esse,  
 15 etiamsi rima est, existimet eo loco, quo su-  
 besse hanc verisimile est. Ergo eo nomine de-  
 cipi non oportet: sed os deoperire tutissimum  
 est. Nam neque utique certa sedes, ut supra  
 posui, futurarum est: & potest idem & natu-  
 20 raliter commissum & ictu fissum esse, juxta-  
 ve aliquid fissum habere. Quin aliquando eti-  
 am, ubi ictus fuit vehementior, quamvis  
 specillo nihil invenitur, tamen aperire com-  
 modius est. At, si ne tum quidem rima mani-  
 25 festa est, inducendum super os atramentum  
 scriptorium est, deinde scalpro id deradendum,  
 nigritiem enim continet, si quid fissum est.

\* Solet etiam evenire, ut altera parte fue-  
 rit ictus, & os altera fiderit. Itaque, si gra-  
 30 viter aliquis percussus est, si mala indicia  
 subsequuta sunt, neque ea parte, qua cutis  
 discissa est, rima reperitur; non incommo-  
 dum

K k 2

c Quintil. Institut. Orator. III, 6. ad quem locum  
 plura dabimus exempla. \* Hic quintus fracturarum  
 cranii modus ἀρθήματα dictus describitur, de quo vi-  
 de Verunian. in Comment. in Hippocr. de Cap. vul-  
 ner. pag. 63, & seq.

dum est, parte altera considerare, num quis locus mollior sit, & tumeat; eumque aperire: siquidem ibi fissum os reperietur. Nec tamen magno negotio cutis sanescit, etiamsi \*frustra secta est. Os d fractum nisi succursum § est, gravibus e inflammationibus afficit, difficiliusque postea tractatur.

Raro, sed aliquando tamen, evenit, ut os quidem totum integrum maneat, intus vero ex ictu vena aliqua in cerebri membrana rupta aliquid sanguinis mittat; isque ibi concretus magnos dolores moveat, † & oculos quibusdam obcæcet. Sed fere contra id dolor est, &, eo loco cute incisa, pallidum os reperitur. ideoque id quoque os excidendum est. Quacumque autem de causa curatio hæc necessaria est, si nondum satis cutis patefacta est, latius aperienda est, donec, quicquid læsum est, in conspectu sit. In quo ipso videndum est, ne quid ex ipsa membranula, quæ sub cute calvariam cingit, super os relinquantur: siquidem hæc icalpro terebrisve lacerata vehementes febres cum inflammationibus excitat. Itaque eam commodius est ex toto ab osse deduci. Plagam, si ex vulnere est, talem necesse est habeamus, qualem acceperimus. Si manu facienda est, ea fere commodissima est, quæ duabus transversis lineis literæ x figuram accipit, ut deinde à singulis procedentibus § angulis cutis † subsecetur.

Inter quæ, si sanguis fertur, spongia subinde

\* *In frustra desecta.* Ita legendum censet Scaliger apud Vertunian. in Comment. in Hippoc. de Cap. Vulner. pag. 65. d Aph. VII, 14, 24. e Æginet. VI, 90. † *Et oculos &c. lege oculosque pus obcæcet.* Scaliger apud Vertunian. p. 64. ‡ Edit. *lingulis*, aliæ, *lingulis*. † *Subsequatur*, Scalig. apud Vertunian. p. 90.

inde in aceto tincta cohibendus est, occupandusque objectis linamentis, & caput altius excitandum. Neque id vitium ullum metum, nisi inter musculos, qui tempora continent, adfert: sed ibi quoque nihil tutius fit.

In omni vero fisso fractove osse, protinus antiquiores medici ad ferramenta veniebant, quibus id exciderent. Sed multo melius est, ante emplastra experiri, quæ calvariæ causa componuntur. eorumque aliquod oportet ex aceto mollitum per se super fissum fractumve os imponere: deinde super id, aliquanto latius quam vulnus est, eodem medicamento illitum linteolum, & præterea succidam lanam aceto tinctam: tunc vulnus deligare, & quotidie resolvere; similiterque curare usque ad diem quintum. A sexto die etiam vapore aquæ calidæ per spongiam fovere: cæteraque eadem facere. Quod si caruncula increfcere cœperit, & febricula aut soluta fuerit, aut levior, & cupiditas cibi reverterit, satisque somni accedat, in eodem medicamento erit perseverandum. Procedente deinde tempore emolliendum id emplastrum, adjecto cerato ex rosa facto; quo facilius carnem producat. nam per se reprimendi vim habet. Hac ratione sæpe rimæ callo quodam implentur; estque ea ossis velut cicatrix. & latius fracta ossa, si qua inter se non cohærebunt, eodem callo glutinantur. estque id aliquanto melius velamentum cerebro, quam caro, quæ exciso osse increfcit. Si vero sub prima curatione febris intenditur, brevesque somni, & iidem per

g Ita Seneca, *excitare ædificium*. Flor. L. 1. *excitare urbem*.

fomnia tumultuosi sunt, ulcus madet, neque \* alitur, & in cervicibus glandulæ oriuntur, magni dolores sunt, cibique super hæc fastidium increfcit; tum demum ad manum scalprumque veniendum est. 5

Duo vero sub ictu calvariæ † pericula sunt; ne vel findatur vel medium deficiat. Si fissum est, possunt oræ esse compressæ: vel quia altera super alteram excessit; vel etiam, quia vehementer rursus se commi- 10 ferunt. Ex quo evenit, ut humor ad membranam quidem descendat, exitum vero non habeat; ac sic eam irriter, & graves inflammationes moveat.

At ubi medium os defecit, eandem cerebri membranam urget: interdum etiam ex fractura quibusdam velut aculeis pungentibus. His ita succurrendum est, ut tamen quam minimum ex osse dematur. Ergo, si ora alteri infecit, satis est id, quod 20 eminet, plano scalpro excidere. Quo sublato, si rima hiat aliquantum, curationi satis est. At, si oræ inter se comprimuntur, à latere ejus, interposito digiti spatio, terebra foramen faciendum est: ab eoque scal- 25 per duabus lineis ad rimam agendus, ad similitudinem literæ A; sic, ut vertex ejus à foramine, basis ad rimam sit.

Quod si rima longius patet, ab altero foramine rursus similis sinus fieri debet: 30 & ita nihil latere sub eo osse confractum potest, abundeque exitus datur intus hædentibus. Ne si fractum quidem os defecit, totum excidi necesse est: sed, si ve-  
tum

\* i. e. coalescit. Scaligerana prima, pag. 7. † H. F. ab Aquapend. Oper. Chirurg. Parr. 1. C. 2. h. Alii latentibus.



tum perfractum est, & ab alio ex toto recessit, sive circumpositæ calvariæ inhæret exigua parte, ab eo, quod naturaliter se habet, scalpello dividendum est. Deinde in eo, 5 quod defedit, juxta rimam, quam fecimus, foramina faciendâ sunt, si in angusto noxa est, duo; si latius patet, tria; septaque eorum excidenda: & tum scalper utrinque ad rimam agendus sic, ut lunatum sinum 10 faciat, imaque pars ejus intus ad fracturam, cornua ad os integrum spectent. Deinde, si qua i labant, & ex facili removeri possunt, forcipe ad id facta colligenda sunt, maximeque ea, quæ acuta membranam infe- 15 stant. Si id ex facili fieri non potest, subjicienda lamina est, quam custodem ejus 512, membranæ esse, proposui: & super eam, 21. quicquid spinosum est, & intus eminet, excidendum est. eadem lamina, quicquid 20 deorsum infedit, attollendum. Hoc genus curationis efficit, ut, qua parte fracta ossa tamen inhærent, solidentur: qua parte abrupta sunt, sine ullo tormento sub medicamenti tempore excidant, spaciumque inter hæc satis illis magnum ad extrahendam saniem relinquatur, plusque in osse propugnaculi cerebrum habeat, quam habiturum fuit, eo exciso.

His factis, ea membrana acri aceto re- 30 spargenda est; ut, sive aliquid sanguinis ex ea profluit, cohibeatur, sive intus concretus cruor remanet, discutiatur; tum idem medicamentum eodem modo, qui supra positus est, mollium, ipsi membranæ im-

520 A. CORN. CELSI Lib. 8,  
ponendum est: cæteraque eodem modo  
facienda sunt, quæ ad linteolum illitum,  
& lanam succidam pertinent: collocandus  
que is loco intepido: & curandum quotidie  
vulnus; bis etiam, æstate. 5

Quod si membrana per inflammationem  
intumuerit, infundenda erit rosa tepida. Si  
usque eo tumebit, ut super ossa quoque  
emineat, coercebit eam bene trita lenticu- 10  
la, vel folia vitis contrita, & cum recenti  
vel butyro, vel adipe anserino mixta: cer-  
vixque k molliri debet liquido cerato, ex  
irino facto. At, si parum pura membrana  
videbitur, par modus ejus emplastri &  
mellis miscendus erit; idque superinfun- 15  
dendum; ejusque continendi causa unum  
aut alterum linamentum injiciendum; &  
super linteolo, cui emplastrum illitum sit,  
contegendum. Ubi satis pura membrana  
est, eadem ratione adjiciendum emplastro 20  
ceratum, ut carnem producat.

Quod ad abstinentiam vero, & primos  
ulterioresque cibos potionesque pertinet,  
eadem, quæ in vulneribus præcepi, servan-  
da sunt: eo magis, quo periculosius hæc 25  
pars afficitur. Quinetiam, cum jam non  
solum sustineri, sed ali cibus quoque \*opor-  
tebit, tamen erunt vitanda, quæcunque  
mandenda sunt: item fumus, & quicquid  
excitat sternutamentum. Spem vero cer- 30  
tam faciunt, membrana l mobilis ac sui co-  
loris, caro increfcens rubicunda, facilis  
motus maxillæ atque cervicis. Mala signa  
sunt, membrana immobilis, nigra, vel livi-  
da,

295,  
15.  
k Alii *illiniri*. \* Pantin. Edit. *adparebunt*. l Al.  
*mollis*.

da, vel aliter coloris corrupti, dementia, acris vomitus, nervorum vel resolutio vel distentio, caro livida, maxillarum rigor, atque cervicis. Cætera, quæ ad somnum, 5 cibi desiderium, febrem, puris colorem attinent, eadem, quæ in cæteris vulneribus, vel salutaria, vel mortifera sunt.

Ubi bene res cedit, incipit ab ipsa mem-  
brana; vel, si os eo loco duplex est, inde  
10 quoque caro increfcens id, quod inter ossa vacuum est, replet: nonnunquam etiam super calvariam excrefcit. Quod si incidit, inspergenda squama æris est, ut id reprimat & cohibeat, eaque carni superdanda, 15 quæ ad cicatricem perducant. Omnibusque ea locis commode inducitur, excepta frontis ea parte, quæ paululum super id est, quod inter supercilia est. Ibi enim vix fieri potest, ut \* non per omnem ætatem sit exul-  
20 ceratio: quæ linteolo, medicamentum habente, contegenda erit. Illa utique, capite fracto, servanda sunt, ut, donec jam valida cicatrix erit, vitentur sol, ventus, frequens balneum, major vini modus.

25 C A P V.

*De Naso fracto. a*

**I**N naribus vero, & os, & cartilago frangi solet, & quidem modo adversa, modo à late-  
30 re. Si adversa fracta sunt, alterumve ex his, nares desidunt, difficulter spiritus trahitur. Si à latere os fractum est, is locus cavus est; si cartilago, in alteram partem nares declinantur. Quic-

\* Deest Edit. Pantin. a Æginet. VI, 91. Hippocrat. de Articul. T. XXX. XXXI. Vectar. T. V. Petr. de Marchettis Observat. Medico-Chirurg. Observ. 26. 27. exempla refert.

Quicquid è cartilagine concedit, excitandum leniter est, aut subjecto specillo, aut duobus digitis utrinque compressis: deinde in longitudinem implicata linamenta, & molli pellicula cincta circumfutaque, intus injicienda sunt; aut eodem modo compositum aliquid ex arido penicillo; aut grandis pinna, gummi, vel fabrilis glutine illita, & molli pellicula circumdata, quæ desiderare cartilaginem non sinunt. Sed, si adversa ea fracta est, æqualiter utraque naris implenda est. Si à latere, id, quod inferitur, crassius esse debet ab ea parte, in quam nasus jacet, ab altera tenuius. Extrinsecus autem circumdanda habena est mollis, medio illita mixtis inter se similia & thuris fuligine: eaque ultra aures ducenda, & fronti duobus capitibus agglutinanda est. id enim corpori quasi gluten inhærescit, & cum induruit, nares commode continet. Sin, quod intus inditum est, lædit; sicut maxime fit, ubi interior cartilago perfracta est, exercitatæ nares eodem tantummodo habena continendæ sunt: deinde, post quatuordecim dies id ipsum demendum est. Resolvitur autem aqua calida; eaque tumens locus quotidie fovendus est.

Sin os fractum est, id quoque digitis in suam sedem reponendum est: atque ubi adversum id ictum est, utraque naris implenda est; ubi à latere, ea, in quam os impulsus est: imponendumque ceratum, & paulo vehementius deligandum est; quia callus eo loco non ad sanitatem tantummodo

modo, sed etiam ad tumorem increfcit. a tertio die fovendum id aqua calida eft, tantoque magis, quanto propius effe fanitati debet. Quod fi plura erunt fragmenta, nihilominus intrinfecus fingula in fuas fedes digitis erunt compellenda; imponendaque extrinfecus eadem habena, & fuper eam ceratum; neque ultra fascia adhibenda eft.

- 10 At, fi quod fragmentum undique refolutum cum cæteris non glutinabitur intelligetur quidem ex humore, qui multus ex vulnere feretur; vulfella vero extrahetur; finitifque inflammationibus, imponetur ali-
- 15 quod medicamentum ex iis, quæ leniter reprimunt. Pejus eft, ubi aut offi aut cartilagini fractæ cutis quoque vulnus accessit, id admodum raro fit. Si incidit, illa quidem nihilominus eadem ratione in fuas
- 20 fedes excitanda funt: cuti vero fuperimponendum emplastrum aliquod ex his, quæ recentibus vulneribus accommodata funt: sed in fuper nullo vinculo deligandum eft.

## C A P. VI.

## 25 De Auribus fractis, a

IN aure quoque interdum rumpitur cartilago. Quod fi incidit, antequam pus oriatur, imponendum glutinans medicamentum eft. sæpe enim fuppurationem

30 prohibet, & aurem confirmat. Illud & in hac & in naribus ignorari non oportet; non quidem cartilaginem ipfam glutinari, circa tamen carnem increfcere, solidarique eum

a Æginet. III, 23. Hipocr. de Articul. T. XXXV. Vefar. VI.



eum locum. Itaque, si cum cute cartilago rupta est, cutis utrinque fuitur. Nunc autem de ea dico, quæ, cute integra, frangitur. In ea vero si jam pus natum est, aperienda altera parte cutis, & ipsa cartilago contra lunata plaga excidenda est: deinde utendum est medicamento leniter sanguinem supprimente, quale lycium est aqua dilutum, donec sanguis fluere desinat: tum imponendum linteolum cum emplastro, sic, ut pingue omne vitetur; & à parte posteriore lana mollis auri subjicienda est, quæ, quod est inter hanc & caput, compleat: tum leniter ea deliganda est; & à tertio die, vapore, ut in naribus posui, fovenda. Atque in his quoque generibus abstinentia primis temporibus necessaria est, donec inflammatio finiatur.

## C A P. V I I.

20

*De Maxilla fracta, & quibusdam ad omnia ossa pertinentibus. a*

**A**B his ad maxillam venturus indicanda quædam puto communiter ad omnia ossa pertinentia, ne sæpius eadem dicenda sint. Omne igitur os, modo rectum, ut lignum in longitudinem finditur; modo frangitur transversum; interdum obliquum: atque id ipsum nonnunquam retusâ habet capita, nonnunquam acuta. quod genus pessimum est: quia neque facile committuntur, quæ nulli retuso innituntur; & carnem vulnerant, interdum quoque nervum aut musculum. Quinetiam

a *Æginet. VI, 92.*

etiam aliquando plura fragmenta à fragmento fiunt. Sed in aliis quidem ossibus ex toto sæpe fragmentum à fragmento recedit: Maxillæ vero semper aliqua, parte etiam vexata, ossa inter se cohærent.

Igitur inprimis digitis duobus utrinque prementibus, & ab ore, & à mento, omnia ossa in suam sedem compellenda sunt: deinde, si maxilla transversa fracta est (sub quo  
10 casu fere dens super proximum dentem excidit) ubi ea in suam sedem collocata est, duo proximi dentes, aut si hi labant, posteriores inter se \*seta deligandi sunt. id in alio genere fracturæ supervacuum est. cætera  
15 eadem facienda. Nam linteolum duplex, madens vino & oleo, superinjiciendum est, cumque eo similia & thuris fuligo: deinde aut fascia, aut mollis habena, medio in lon- 522, gitudinem incisa, ut utrinque mentum 16.  
20 complectatur; & inde capita ejus supra caput adducta ibi ligentur.

Illud quoque ad omnia ossa pertinens dictum erit; famem primum esse necessariam: deinde, à die tertio, humidum cibum;  
25 sublata inflammatione, paulo plenior, eumque, qui carnem alat: vinum per omne tempus esse alienum. Deinde tertio die resolvi debere; foverique per spongiam vapore calidæ; eademque, quæ primo foverant,  
30 superdari: idem quinto die fieri, & donec inflammatio finiatur; quæ vel nono die, vel septimo fere solvitur: ea sublata, rursus ossa esse tractanda, ut, si quod fragmentum loco suo non est, reponatur. neque id esse sol-

\* Rhodius de Acia, C. 15. p. 215.

§26 A. CORN. CÆSI Lib. 8.  
solvendum, nisi duæ partes ejus temporis,  
intra quod quæque ossa confervent, transf-  
ierunt.

Fere verò inter quartumdecimum & u-  
num & vigesimum diem sanescunt, maxilla, 5  
malæ, jugulum, pectus, latum os scapula-  
rum, costæ, spina coxarum, os tali, calx, ma-  
nus, planta: inter vigesimum & trigesi-  
mum diem, crura brachiaque: inter septi-  
mum & vigesimum & quadragesimum, 10  
humeri & femora.

Sed de maxilla illud quoque adjicien-  
dum est, quod humidus cibus diu assumen-  
dus sit. Atque etiam, cum tempus processit,  
in lagano similibusque aliis perseveran- 15  
dum est, neque quicquam edendum, donec  
ex toto maxillam callus firmaverit. Item-  
que, primis utique diebus, habendum silen-  
tium.

#### C A P. V I I I.

29

##### *De Jugulo fracto.*

JUGULUM vero, si transversum fractum  
est, nonnunquam per se recte coit, &  
nisi movetur, sanari sine viatura potest: 25  
nonnunquam vero, maximeque ubi mo-  
tum est, elabitur; fereque id, quod à pe-  
ctore est, super id, quod ab humero est, in  
posteriorem partem inclinatur. Cujus ca-  
ratio est, quod per se non movetur; sed cum 30  
humeri motu consentit. Itaque, eo confi-  
stente, super id humerus agitur. Raro  
vero admodum in priorem partem jugulum  
inclinatur; adeo, ut magni professores nun-  
quam

quam se vidisse memoriæ mandaverint. Sed locuples tamen ejus rei author Hippocrates est.

Verum, ut dissimilis uterque casus est, sic quædam dissimilia requirit. Ubi ad scapulas jugulum tendit, simul dextra manu plana propellendus in posteriorem partem humerus est, & illud in priorem attrahendum. Ubi ad pectus conversum est, ipsum quidem retro dandum, humerus autem in priorem partem adducendus est: ac, si is inferior est, non id, quod à pectore est, depressendum est, quia immobile est; sed humerus ipse attollendus: si autem superior est, id, quod à pectore est, implendum lana, & humerus ad pectus deligandus est. Si acuta fragmenta sunt, incidi contra cutis debet; & ex ossibus ea, quæ carnem vulnerant, præcidenda; tum retusa ossa committenda sunt; & si quod ab aliqua parte eminet, opponendum est triplex linteolum in vino & oleo tinctum. Si plura fragmenta sunt, excipienda sunt ex ferula factò canaliculo, eodemque intus incerato, ne fascia diducatur. quæ jugulo composito circumdanda est sæpius potius, quam valentius. quod ipsum quoque in omnibus fractis perpetuum est. A dextro vero jugulo, si id fractum est, ad alam sinistram; à sinistro, ad dexteram, rursusque sub ala sua fascia dari debet: post hæc, si jugulum ad scapulas inclinatum est, brachium ad latus; si in partem priorem, ad cervicem deligandum est: supinusque homo collocandus. cætera eadem

528 A. CORN. CELSI Lib. 8.  
dem faciendā, quæ supra comprehensa sunt.

2. *De diversis ossium curis.*

Sunt vero plura ossa fere immobilia, vel dura, vel cartilaginosa, quæ vel franguntur, vel torantur, vel colliduntur, vel finduntur, ut malæ, pectus, latum os scapularum, costæ, spina coxarum, os tali, calx, manus, planta. Horum omnium eadem curatio est. Si supra vulnus est, id suis medicamentis nutriendum est. quo sanescente, rimas quoque ossis, aut, si quod foramen est, callus implet. Si cutis integra est, & os læsum esse, ex dolore colligimus, nihil aliud, quam quiescendum; imponendumque ceratum est, & leniter deligandum, donec sanitate ossis dolor finiatur.

C A P. I X.

*De Costis fractis.*<sup>a</sup>

**P**ROPRIE tamen quædam de costis dicenda sunt; quia juxta viscera sunt, & gravioribus periculis is locus expositus est. Costa igitur interdum sic finditur, ut ne summum quidem os, sed interior pars ejus, quæ rara est, lædatur: interdum sic, ut eam totam is casus perripuit. Si tota fracta non est, nec sanguis expuitur, nec febricula sequitur, nec quicquam suppurat, nisi admodum raro, nec dolor magnus est; tactu tamen is locus leviter indolescit: sed abunde est eadem, quæ supra scripta sunt, facere; & à media fascia incipere deligare, ne in alterutram partem hæc cutem inclinet. Ab uno vero & vigesimo die,

<sup>a</sup> Aeginet, VI, 96.



die, quo utique os esse debet glutinatum, id agendum cibus uberioribus est, ut corpus quam plenissimum fiat, quo melius os vestiat: quod illo loco tenerum adhuc injuriæ sub tenui cute expositum est. Per omne autem tempus curationis, vitandus clamor, sermo quoque, tumultus, ira, motus vehementior corporis, fumus, pulvis, & quicquid vel tussim vel sternutamentum  
 5 movet: ne spiritum quidem magnopere continere expedit.

At, si tota costa perfracta est, casus asperior est. Nam & graves inflammationes, & febris, & suppuratio, & sæpe vitæ periculum sequitur, & sanguis spuitur. Ergo, si vires patiuntur, ab eo brachio, quod super eam costam est, sanguis mittendus est: si non patiuntur, alvus, tamen sine ullo acri, ducenda est; diutiusque inedia pugnandum. Panis vero ante septimum diem non assumendus; sed una sorbitione vivendum: imponendumque ei loco ceratum ex lycio factum, cui cocta quoque resina adjecta sit, aut Polyarchi malagma; aut panni ex vino  
 15 & rosa & oleo; superque imponenda lana succida mollis, & duæ fasciæ à mediis orfæ, minimeque adstrictæ. Multo vero magis omnia vitanda, quæ supra posui; adeo, ut ne spiritus quidem sæpius movendus  
 20 sit. Quod si tussis infestabit, ad id potio sumenda erit, vel ex trixagine, vel ex ruta, vel ex herba stoechade, vel ex cumino & pipere. Gravioribus vero doloribus urgentibus, cataplasma imponi quoque con-  
 25  
 30

veniet, vel ex lolio, vel ex hordeo, cui pinguis fici tertia pars fit adjecta. Et id quidem interdum superjacebit: noctu vero idem aut ceratum, aut malagma, aut panis; quia potest cataplasma decidere. Ergo 5  
quotidie quoque resolvetur, donec jam cerato aut malagmate possimus esse contenti. Et decem quidem diebus extenuabitur fame corpus; ab undecimo vero alii incipiet. 10  
ideoque etiam laxior, quam primo, fascia fit, qua ligabitur. Fereque ea curatione ad quadragesimum diem perveniet.

Sub qua si metus erit suppurationis, plus malagma, quam ceratum ad digerendum proficiet. Si suppuratio vicerit, neque per 15  
quæ supra scripta sunt, discuti potuerit; omnis mora vitanda erit, ne os infra vitietur: sed, qua parte maxime tumebit, demittendum erit candens ferramentum, donec ad pus perveniat; idque effundendum. Si nusquam tumor se ostendit, ubi maxime pus 20  
subsistit, sic intelligemus. creta cimolia totum locum illinemas, & siccare patiemur: quo loco maxime humor intus perseverabit, ibi pus proximum erit; eoque uri debet. 25  
Si latius aliquid abscedet, duobus aut tribus locis erit perforandum; demittendumque linamentum, aut aliquid ex penicillo, quod summum lino sit devinctum, ut facile educatur. Reliqua eadem, 30  
quæ in cæteris adustis, facienda sunt. Ubi purum erit ulcus, alii corpus debet, ne tabes, perniciofa futura, id malum subsequatur. Nonnunquam etiam, levius ipso osse affecto,

affecto, & inter initia neglecto, non pus, sed humor quidam mucosus similis, intus coit; mollescitque contra cutis. In qua simili uestione utendum est.

5 2. De spina fracta. a

In spina quoque est, quod proprie notemus. Nam si quid ex vertebra excidit, aut aliquo modo fractum est, locus quidem concavus fit; punctiones autem in eo sentiuntur: quia necesse est ea fragmenta spinosa esse. quo fit, ut homo in anteriorem partem subinde nitatur. Hæc noscendæ rei causa sunt. Medicamentis vero iisdem opus est, quæ prima parte hujus capituli exposita sunt.

CAP. X.

20 De Humerorum, brachiorum, femorum, crurum, digitorum fractorum, vel evulsorum, communibus curationibus.

SIMILES rursus ex magna parte casus curationesque sunt humeris & femoribus. Communia etiam quædam humeris, brachiis, femoribus, cruribus, digitis: siquidem ea minime periculose media franguntur: at, quo propior fractura capiti vel superiori vel inferiori est, eo pejor est. nam & majores dolores adfert, & difficilius curatur. Earum maxime tolerabilis est simplex, eaque transversa: pejor, ubi obliqua, atque ubi fragmenta: pessima, ubi eadem acuta sunt. Nonnunquam autem fracta in his ossa in suis sedibus remanent: multo sæpius excidunt, aliudque super aliud effer-

Ll 2 tur.

tur. idque ante omnia considerari debet: & sunt notæ certæ. Si suis sedibus sunt mota, resima, punctionesque sensum repræsentant, & tactu inæqualia sunt. Si vero non adversa, sed obliqua junguntur (quod fit, 5 ubi loco suo non sunt) membrum id altero latere brevius est, & muscoli ejus tument.

Ergo, si hoc depressum est, protinus id membrum oportet extendere. Nam nervi 10 musculique, intenti per ossa, contrahuntur: neque in suum locum veniunt, nisi illos per vim aliquis intendit. Rursus, si primis diebus id omissum est, inflammatio oritur. Sub qua & difficile, & periculose, 15 vis nervis adhibetur. nam distentionem nervorum vel\* cancer sequitur; vel certe, cum mitissime agitur, pus. itaque, si ante reposita ossa non sunt, post eam reponenda sunt. Intendere autem digitum vel aliud quod- 20 que membrum, si adhuc tenerum est, etiam unus homo potest; cum alteram partem dextra, alteram sinistra prendit. Valentius membrum duobus eget, qui in diversa contendunt. Si firmiores nervi sunt, ut in vi- 25 ris robustis, maximeque eorum feminibus & cruribus evenit; habenis quoque, vel lineis fasciis utrinque capita articulorum deliganda, & per plures & in diversa ducenda sunt. Ubi vero paulo longius, quam 30 naturaliter esse debet, membrum vis fecit; tum demum ossa manibus in suam sedem compellenda sunt: indiciumque ossis repositi est dolor sublatus. At membrum alteri æqua-

\* Tulpius Observ. L. 4. Cap. 13.

æquatum, involvendum duplicibus triplicibusve pannis in vino & oleo tinctis: quos lineos esse, commodius est.

Fere vero fasciis sex opus est. Prima brevissima adhibenda: quæ circa tracturam ter voluta sursum versum feratur, & quasi in cochleam serpat; satisque est, eam ter hoc quoque modo circuire. Altera dimidio longior ea: quæ, si qua parte os eminet, ab ea, si totum æquale est, undelibet super fracturam incipere debet, priori adversa, deorsumque tendere; atque iterum ad fracturam reversa, in superiore parte ultra priorem fasciam desinere. Super has injiciendum latiore linteo ceratum est quod eas contineat. Ac, si qua parte os eminet, triplex ei pannus objiciendus, eodem vino & oleo madens. Hæc tertia fascia comprehendenda sunt, quartaque, sic, ut semper insequens priori adversa sit, & tertia tantum in inferiore parte, tres in superiore a finiant: quia satius est sæpius circuire, quam adstringi: siquidem id, quod adstrictum est, alienatur, & cancro opportunum est. Articulum autem quamminime vincire opus est: sed, si juxta hunc os fractum est, necesse est.

Deligatum vero membrum in diem tertium continendum est. Eaque vincitura talis esse debet, ut primo die nihil offenderit, non tamen laxa visa sit; secundo laxior; tertio jam pene resoluta. Ergo tum rursus ad membrum deligandum, adjiciendaque prioribus quinta fascia est, iterum-

Ll 3

que



que quinto resolvendum est, & tum sex fasciis involvendum, sic, ut tertia & quinta infra, cæteræ supra finiantur. Quotiescunque autem solvitur membrum, calida aqua fovendum est. Sed, si juxta articulum fractura est, diu instillandum vinum est, exigua parte olei adjecta, eademque omnia facienda, donec ab eo inflammatio solvatur, vel tenuius quoque, quam ex consuetudine, id membrum fiat. quod si septimus dies non dedit, certe nonus exhibet. tum facillime ossa tractantur.

Rursus ergo, si parum commissa sunt, committi debent: si qua fragmenta eminent, in suas sedes reponenda sunt: deinde eodem modo membrum deligandum, ferulæque superaccommodandæ sunt, quæ fissæ circumpositæque ossa in sua sede continent: & in quam partem fractura inclinat, ab eo latior valentiorque ferula imponenda est. Easque omnes circa articulum esse oportet resimas, ne hunc lædant, nec ultra adstringi, quam ut ossa continent: & cum spatio laxentur, tertio quoque die paulum habenis suis coartari; ac, si nulla prurigo, nullus dolor est, sic manere, donec duæ partes ejus temporis, quo os quodque confervet, compleantur: postea levius aqua calida fovere; quia primo digeri materiam opus est, tum evocari. Ergo cerato quoque liquido id leniter est un-  
gendum, perfricandaque summa cutis est; laxiusque id deligandum est. Tertio quoque die solvendum, sic, ut remota calida aqua,

b Al. pleniter.

Cap. 10. MEDICINA. 535  
aqua, cætera eadem fiant; tantummodo  
singulæ fasciæ, quoties resolutæ fuerint,  
subtrahantur.

2. De Humero fracto. c

- 5 Hæc communia sunt: illa propria.  
Siquidem humerus fractus est, non sic, ut  
membrum aliud, intenditur: sed homo  
collocatur alto sedili, medicus autem hu-  
miliore adversus. Una autem fascia, bra-  
10 chium amplexa, ex cervice ipsius, qui læ-  
sus est, id sustinet: altera, ab altera parte  
super caput data, ibi accipit nodum: tertia,  
vincto imo humero deorsum demittitur,  
ibi quoque capitibus ejus inter se vinctis.  
15 Deinde ab occipite ipsius, minister sub ea  
fascia, quam secundo loco posui, porrecto,  
si dexter humerus ducendus est; dextro, si  
sinister, sinistro brachio, demissum inter  
femina ejus, qui curatur, baculum tenet:  
20 medicus super eam fasciam, de qua tertio  
loco dixi, plantam injicit dextram, si fini-  
ster, sinistram, si dexter humerus curatur;  
simulque alteram fasciam minister attollit,  
alteram premit medicus: quo fit, ut leniter  
25 humerus extendatur. Fasciis vero, si me-  
dium aut imum os fractum est, breviori-  
bus opus est; si summum, longioribus: ut  
ab eo sub altera quoque ala per pectus ad  
scapulas porrigantur. Protinus vero bra-  
30 chium, cum deligatur, sic inclinandum est,  
ut id, quod afficitur, ante fasciis quoque  
sic figuratum sit, ne postea suspensum ali-  
ter, atque cum deligabatur, humerum in-  
clinet: brachioque suspenso, ipse quoque

L14

hume-

humerus ad latus leniter deligandus est. per quæ fit, ut minime moveatur: ideoque ossa sic se habent, ut aliquis composuit. Cum ad ferulas ventum est, extrinsecus esse earum longissimæ debent: à lacerto 5 breviores; sed sub ala brevissimæ. Sæpiusque resolvendæ sunt, ubi in vicinia cubiti humerus fractus est, ne ibi nervi rigescant, & inutile brachium efficiatur. Quoties solutæ sunt, tractura manu continenda; cubitus aqua calida fovendus, & molli cerato perfricandus; ferulæque vel omnino non imponendæ contra eminentia cubiti, vel aliquanto breviores sint. 10

*De Brachio fracto.* d

15

At, si brachium fractum est, in primis considerandum est, alterum os, an utrumque comminutum sit: non quo alia in ejusmodi casu curatio sit admovenda; sed primum, ut valentius extendatur, si utrumque 20 os fractum est, quia necesse est minus nervos contrahi altero osse integro, eosque intendente: deinde, ut curiosius omnia in continendis ossibus fiant, si neutrum alteri auxilio est. nam, ubi alterum 25 integrum est, plus opis in eo, quam in fasciis ferulisque est. Deligari autem brachium debet, paululum pollice ad pectus inclinato; siquidem is maxime brachii naturalis habitus sit: idque involutum mitella commodissime excipitur. quæ latitudine ipsa brachio, perangustis capitibus collo injicitur: atque ita commode brachium ex cervice suspensum est. Idque pau-

d Æginet. VI, 99. e Hippocrat. de Fractur. T. IV, 9.

paulum supra cubiti alterius regionem pendere oportet.

#### 4. De Cubito fracto.

5 Quod si ex summo cubito quid fractum sit, glutinare id vinciendo alienum est. fit enim brachium immobile. Ac, si nihil aliud quam dolori occurrendum est, idem, qui fuit, ejus usus est.

#### 5. De Cruribus Femoribusque fractis. f

10 In crure æque ad rem pertinet, alterum saltem os integrum manere. commune vero ei femorique est, quod, ubi deligatum est, in canalem conjiciendum est. Is canalis ab inferiori parte foramina habere debet, per quæ, si quis humor excesserit, descendat: & à planta moram, quæ simul & sustineat eam, & delabi non patiatur: & à lateribus cava, per quæ loris datis, moræ quædam crus femurque, ut collocatum est, 20 detineant. Esse etiam is debet, à planta, si crus fractum est, circa poplitem; si femur, usque ad coxam; si juxta superius caput femoris, sic, ut ipsa quoque ei coxa insit. Neque tamen ignorari oportet, si femur 25 fractum est, fieri brevius, quia nunquam in antiquum statum revertitur: summisque digitis postea cruris ejus insisti. ex quo multa debilitas est; foedior tamen, ubi fortunæ negligentia quoque accessit.

30

#### 6. De Digito fracto.

Digitum satis est ad unum g furculum deligari post inflammationem.

L 15

7. Com-

f Æginet. VI, 102. Hippocrates de Fractur. XXIII,  
g Al. furunculum.

7. *Communes curationes ad humeros, brachia, crura, femina, digitosque confractos pertinentes.*

His proprie ad singula membra pertinentibus, rursus ista communia sunt: primis diebus fames: deinde tum, cum jam increfcere callum oportet, liberalius alimentum: longa à vino abftinentia: fomentum aquæ calidæ, dum inflammatio est, liberale; cum ea defuit, modicum: tum etiam longior ulterioribus, è liquido cæto, membris & mollis tamen unctio. Nec protinus exercendum id membrum, sed paulatim ad antiquos ufus reducendus est.

Gravius aliquanto est, cum offis fracturæ carnis quoque vulnus accessit; maximeque, si id musculi femoris aut humeri fenserint. nam & inflammationes multo graviores, & promptiores caneros habent. Ac femur quidem, si ossa inter se cesserunt, fere præcidi necesse est. Humerus vero quoque in periculum venit; sed facilius conservatur. Quibus periculis etiam magis id expositum, quod juxta ipsos articulos ictum est. Igitur curiosius id agendum est, & per mediam plagam musculus transversus præcidendus: sanguis vero, si parum fluxit, mittendus: corpus inedia in decimum diem extenuandum. Ac reliqua quidem membra lentius intendenda, & lenius in his ossa in suam sedem reponenda sunt: his vero neque intendi nervos, neque ossa tractari, satis expedit. ipsique homini permittendum est, ut sic ea collocata habeat, quem-



quemadmodum minimum læduntur. Omnibus autem his vulneribus imponendum primo linamentum ex vino madens, cui rosæ paulum admodum adjectum sit: cætera eadem. Deliganda fasciis sunt, aliquanto, quam vulnus, laxioribus; scilicet laxius, quam si ea plaga non esset, quantoque facilius & alienari & occupari cancro vulnus potest. h numero potius fasciarum id agendum est, ut laxæ quoque æque contineant.

Quod in femore humerove sic fiet, si ossa forte recte concurrerint: sin aliter se habebunt, eatenus circumdari fascia debet, ut impositum medicamentum contineat. Cætera eadem, quæ supra scripsi, faciendæ sunt. præterquam quod neque ferulis, neque canalibus, inter quæ vulnus fanescere non potest; sed pluribus tantummodo & latioribus fasciis opus est: ingerendumque subinde in eas est calidum oleum, & vinum; i magisque hoc. In principio fame utendum; vulnus calida aqua fovendum; frigusque omni ratione vitandum est, & transeundum ad medicamenta, quæ puri movendo sunt. Majorque vulneri, quam ossi cura adhibenda. ergo quotidie solvendum nutriendumque est.

Inter quæ si quod parvulum fragmentum ossis eminent, id, si retusum est, in suam sedem dandum: si acutum, ante acumen ejus, si longius est, præcidendum; si brevius, limandum, & utrumque scalpulo lævandum: tum ipsum recondendum est. ac, si id manus facere non potest, vulsellæ, quali

quali fabri utuntur, injicienda est acutæ  
 ossis prominentis cuspidi, ab ea parte, qua  
 sima est; ut ea parte, qua gibba est, eminens  
 os in suam sedem compellat. Si id ma-  
 jus est, membranulisque cingitur, finire  
 oportet has sub medicamentis resolvi, id-  
 que os, ubi jam nudatum est, abscin-  
 dere; quod maturius scilicet faciendum est.  
 postque ea ratione & os coire, & vulnus  
 sanescere: illud suo tempore; hoc, prout  
 se habet. 10

Nonnunquam etiam in magno vulnere  
 evenit, ut fragmenta quædam velut emo-  
 riantur, neque cum cæteris coeant. quod  
 hic quoque ex modo fluentis humoris col- 15  
 ligitur. Quo magis necessarium est, sæpius  
 ulcus resolvere, quam nutrire: sequitur-  
 que fere, ut id os per se post aliquot dies  
 excidat; aut, cum jam ante misera conditio  
 vulneris sit, tamen id interdum majus diu- 20  
 turniusque faciat. Sæpe etiam integra cute  
 os abrumpitur, protinusque prurigo & do-  
 lor oritur. Quare solvere, si accidit, ma-  
 turius oportet, & fovere aqua, per æstatem,  
 frigida; per hiemen, egelida: deinde ce- 25  
 ratum myrteum imponere.

Interdum fractura quibusdam velut acu-  
 leis carnem vexat. Quo à prurigine &  
 punctiõibus cognito, aperire id medicus,  
 eosque aculeos præcidere necesse habet. 30  
 Reliqua vero curatio in utroque hoc casu  
 eadem est, quæ, ubi plagam ictus protin-  
 us intulit. Puro jam ulcere, cibus hic  
 quoque utendum est carnem producenti-  
 bus,

bus. Si brevius adhuc membrum est, & ossa loco suo non sunt, paxillus tenuis & lævissimi generis inter ea demitti debet, sic, ut capite paululum emineat; isque quotidie plenior adigendus est, donec par id membrum alteri fiat. Tum paxillus removendus, vulnusque sanandum est. Cicatrix vero inducta fovenda aqua frigida est, in qua myrtus, hederæ, aliæve similes verbenæ decoctæ sint: illinendumque medicamentum, quod siccet. & magis etiam hic quiescendum, donec id membrum confirmetur.

Si quando vero ossa non conferbuerunt, quia sæpe soluta, sæpe mota sunt, in aperto deinde curatio est. possunt enim coire. Si vetustas occupavit, membrum extendendum est, ut aliquid lædatur: ossa inter se manu dividenda, ut concurrente exasperentur, & si quid pingue est, eradatur, totumque id quasi recens fiat. magna tamen cura habita, ne nervi musculive lædantur. Tum vino fovendum est, in quo malicorium decoctum sit; imponendumque id ipsum ovi albo mixtum: tertio die resolvendum, fovendumque aqua, in qua verbenæ, de quibus supra dixi, decoctæ sint. quinto die idem faciendum, ferulæque circumdandæ: cætera, & ante, & post, eadem faciendæ, quæ supra scripsi. Solent tamen interdum adversa inter se ossa<sup>1</sup> confervere: eoque & brevius membrum, & indecorum fit, & si capita acutiora sunt, assidue puncturæ sentiuntur. Ob quam causam frangi

rursus

<sup>1</sup> Al. Cohæreere vel coalescere.

rursus ossa & dirigi debent. Id hoc modo fit. Calida aqua multa id membrum fovetur, & ex cerato liquido perfricatur, intenditurque: inter hæc, medicus pertractans ossa, ut adhuc tenero callo, manibus ea di-  
 5 ducit, compellitque id, quod eminent, in suam sedem: &, si parum valuit, ab ea parte, in quam os se inclinat, involutam lana regulam objicit; atque ita deligando, assuescere iterum vetustæ sedi cogit. 10

Nonnunquam autem recte quidem ossa conferbuerunt, superincrevit vero nimius callus; ideoque locus intumuit. Quod ubi incidit, diu leniterque id membrum perfricandum est ex oleo, & sale, & nitro; 15 multumque aqua calida salsa fovendum; & imponendum malagma, quod digerat; adstrictiusque alligandum: oleribusque, & præterea vomitu utendum. per quæ cum carne callus quoque extenuatur: confert- 20 que aliquid de sinapi cum ficu in alterum pariter membrum impositum, donec id paulum erodat, eoque evocet materiam. Ubi his tumor extenuatus est, rursus ad ordinem vitæ revertendum est. 25

## C A P. XI.

### *De Ossibus luxatis.*

**A**C de fractis quidem ossibus hætenus dictum sit. Moventur autem ea sedi- 30 bus suis duobus modis. Nam modo, quæ juncta sunt, inter se dehiscunt: ut cum latum os scapularum ab humero recedit; & in brachio, radius à cubito; & in crure, tibia à fura;

à sura; & interdum factu, calcis os à talo; quod raro tamen fit: modo articuli suis sedibus excidunt. Ante de prioribus dicam.

- Quorum ubi aliquid incidit, protinus is
- 5 locus cavus est, depressusque digitus sinum invenit: deinde gravis inflammatio oritur; atque in talo præcipue: siquidem febres quoque, & cancos, & nervorum vel distentiones, vel rigores, qui caput scapulis
- 10 annectunt, movere consuevit. Quorum vitandorum causa, facienda eadem sunt, quæ in ossibus mobilibus læsis. Atque id ubi incidit, protinus his locis imponenda, quæ supra proposita sunt, ut dolor tumorque
- 15 per ea tollantur. Nam diducta ossa nunquam rursus inter se junguntur: & ut aliquid decoris eo loco, sic nihil usus admittitur.

- Maxilla vero & vertebræ, omnesque articuli, cum validis nervis comprehenduntur, excidunt aut vi expulsi, aut aliquo casu nervis vel ruptis, vel infirmatis; faciliusque in pueris & adolescentulis, quam in robustioribus. Hique elabuntur in priorem & in posteriorem, in anteriorem & in
- 20 exteriorem partem: quidam omnibus modis, quidam certis. Suntque quædam communia omnium signa, quædam propria cujusque. Siquidem semper ea parte tumor
- 25 est, in quam os prorumpit; ea sinus, à qua recessit. Et hæc quidem in omnibus comprehenduntur, alia vero in singulis. quæ simulatque de quoque dicam, proponenda erunt.



Sed ut excidere omnes articuli possunt, sic non omnes reponuntur. Caput enim nunquam compellitur, neque in spina vertebræ, neque ea maxilla, quæ, utraque parte prolapsa, antequam reponeretur, inflammationem movit. Rursum, qui nervorum vitio prolapsi sunt, compulsi quoque in suas sedes iterum excidunt. Ac, quibus in pueritia exciderunt, neque repositi sunt, minus quam cæteri crescunt: omniumque, quæ loco suo non sunt, caro emacrescit, magisque in proximo membro, quam ulteriore. utputa, si humerus loco suo non est, major in eo ipso fit macies, quam in brachio; major in hoc, quam in manu. Tum pro sedibus, & pro casibus, qui inciderunt, aut major aut minor usus ejus membri relinquitur: quoque in eo plus usus superest, eo minus id extenuatur.

Quicquid autem loco suo motum est, ante inflammationem reponendum est. Si illa occupavit, dum conquiescat, laceffendum non est: ubi finita est, tentandum est in his membris, quæ id patiuntur. Multum autem eo confert & corporis & nervorum habitus. Nam, si corpus tenue, si humidum est, si nervi infirmi, expeditius os reponitur; sed & multo facilius excidit, & postea minus fideliter continetur. Quæ contraria his sunt, melius continent: sed id, quod expulsum est, difficulter admittunt. Oportet autem ipsam inflammationem levare, succida lana ex aceto superimposita: à cibo, si valentioris articuli casus est, triduo; interdum

dum etiam quinque diebus abstinere: bibere aquam calidam, dum fitis finiatur: curiosiusque hæc facere, his ossibus motis, quæ validis plenisque musculis continentur: si vero etiam febris accessit, multo magis: deinde die quinto fovere ex aqua calida; remotaque lana, ceratum imponere ex cyprino factum; nitro quoque adjecto, donec omnis inflammatio finiatur. Tunc infractionem ei membro adhibere: cibis uti bonis; uti vino modice: jamque ad usus quoque suos id membrum promovere; quia motus, ut in dolore pestifer, sic alias saluberrimus corpori est. Hæc communia sunt: nunc de singulis dicam.

C A P. XII.

*De Maxilla luxata. a*

**M**AXILLA in priorem partem propellitur, sed modo altera parte, modo utraque. Si altera, in contrariam partem ipsa mentumque inclinatur: dentes paribus non respondent; sed sub his, qui secant, canini sunt. At, si utraque, totum mentum inclinatur, & in exteriorem partem promovetur; inferioresque dentes longius, quam superiores excedunt; intempore temporum musculi apparent. Primo quoque tempore homo in sedili collocandus est, sic, ut minister à posteriore parte caput ejus contineat, vel sic, ut juxta parietem is sedeat, subjecto inter parietem & caput ejus scorteo pulvino duro, eoque caput per ministrum urgeatur, quo sit immobilius.

M m tum

a Æginet. VI, 112.

tum medici digiti pollices, linteolis vel fasciis, ne dilabantur, involuti in os ejus conjiciendi, cæteri extrinsecus admovendi sunt. ubi vehementer maxilla apprehensa est, si una parte procidit, concutiendum mentum, & ad guttur adducendum est: tunc simul & caput adprehendendum, & excitato mento, maxilla in suam sedem compellenda, & os ejus comprimendum est, sic, ut omnia pene uno momento fiant. Sin utraque parte prolapsa est, omnia eadem facienda; sed æqualiter retro est maxilla agenda. Reposito ossè, si cum dolore oculorum & cervicis iste casus incidit, ex brachio sanguis mittendus est. Cum omnibus vero, quorum ossa mota sunt, primo liquidioribus conveniat, tum his præcipue: adeo ut sermo quoque frequens, motu oris temporum nervos lædat.

## C A P. XIII.

20

*De Capite luxato.*

**C**APUT duobus processibus in duos sinus summæ vertebræ dimissis super cervicem contineri, in prima parte proposui. Hi processus interdum in posteriorem partem excidunt: quo fit, ut nervi sub occipitio extendantur, & mentum pectori adglutinetur, neque bibere is, neque loqui possit, interdum sine voluntate semen emittat. quibus celerrime mors supervenit. Ponendum autem hoc esse credidi, non quo curatio ejus rei ulla fit; sed ut res indicibus cognosceretur, & non putarent sibi me

Cap. 14. MEDICINA. 547  
medicum defuisse, si qui sic aliquem perdidissent.

C A P. XIV.

De Spina luxata. <sup>a</sup>

5 IDEM casus manet eos, quorum in spina  
vertebræ exciderunt. Id enim non po-  
test fieri, nisi & medulla quæ per me-  
10 dium; & duabus membranulis, quæ per  
duos à lateribus processus feruntur; & ner-  
vis, qui continent, ruptis. Excidunt autem  
& in posteriorem partem, & in priorem; &  
supra septum transversum, & infra. Si in  
15 utramvis partem exciderint, à posteriore  
parte vel tumor, vel sinus erit. Si super se-  
ptum id incidit, manus resolvuntur, vomit-  
us, aut distentio nervorum sequitur, spiri-  
tus difficulter movetur; dolor urget, & aures  
20 obtusæ sunt. Si sub septo, femina resolvun-  
tur, urina supprimitur, interdum etiam  
sine voluntate prorumpit. Ex ejusmodi  
casibus, ut tardius, quam ex capitis, sic ta-  
men intra triduum homo moritur. Nam,  
25 quod Hippocrates dixit, vertebræ in exte-  
riorem partem prolapsa, pronum hominem  
collocandum esse, & extendendum, tum cal-  
ce aliquem super ipsum debere consistere, &  
intus impellere: in his accipiendum est,  
30 quæ paululum excesserunt; non in his, quæ  
toto loco motæ sunt. Nonnunquam enim  
nervorum imbecillitas efficit, ut, quamvis  
non exciderit vertebra, paululum tamen in  
priorem partem promineat. id non jugu-  
lat. Sed ab interiore parte non contingit  
M m 2 quidem

<sup>a</sup> Æginet. VII. 117.

548 A. CORN. CELSI Lib. 8.  
quidem propelli. Ab exteriori si quid propulsum est, plerunque iterum redit: nisi, quod admodum rarum est, vis nervis destituta.

C A P. XV.

*De Humero luxato. a*

**H**UMERUS autem modo in alam excidit, modo in partem priorem. Si in alam delapsus est, ei junctus cubitus<sup>10</sup> recedit ab latere, sursumque ad ejusdem partis aurem cum humero porrigi non potest, longiusque altero id brachium est. Si in priorem partem, summum quidem brachium extenditur, minus tamen, quam naturaliter; difficiliusque in priorem partem,<sup>15</sup> quam in posteriorem cubitus porrigitur.

Igitur, si in alam humerus excidit, & vel puerile adhuc est corpus, vel molle, certe imbecillibus nervis intentum est, satis est<sup>20</sup> collocare id in sedili; & ex duobus ministris alteri imperare, ut caput lati scapularum ossis leniter reducat; alteri, ut brachium extendat: ipsum posteriore parte residentem, humerum genu sub ala ejus cogere, si<sup>25</sup> mulque & latum os, & altera manu brachium ejus ad latus impellere.

At, si vastius corpus, nervive robustiores sunt, necessaria est spatha lignea, quæ & crassitudinem duorum digitorum habet, & <sup>30</sup> longitudine ab ala usque ad digitos pervenit. in qua summa capitulum est rotundum, & leniter cavum; ut recipere particulam aliquam ex capite humeri possit: inque



que ea bina foramina tribus locis sunt, inter se spatio distantibus; in quæ lora mollia conjiciuntur. Eaque spatha, fascia involuta, quo minus tactu lædat, ad alam à brachio dirigitur, sic, ut caput ejus summæ alæ subjiciatur: deinde, loris suis ad brachium deligatur; uno loco, paulum infra humeri caput; altero, paulum supra cubitum; tertio, supra manum. cui rei protinus intervalla tunc quoque foraminum aptata sunt. Sic brachium deligatum super scalæ gallinariæ gradum trajicitur, ita altæ, ut consistere homo ipse non possit; simulque in alteram partem corpus demittitur, in alteram brachium intenditur: eoque fit, ut capite ligni caput humeri impulsus in suam sedem, modo cum sono, modo sine hoc compellatur. Multas esse alias rationes, scire facile est uno Hippocrate lecto; sed non alia magis usu comprobata est.

At, si in partem priorem humerus incidit, supinus homo collocandus, fasciæque, aut habena, media ala circumdanda est, capitæque ejus post caput hominis ministro tradenda; brachium alteri; præcipiendumque, ut ille habenam, hic brachium extendat: deinde medicus, caput quidem hominis sinistra debet repellere; dextra vero cubitum cum humero attollere, & os in suam sedem compellere. faciliusque id in hoc casu, quam in priore revertitur. Reposito humero, lana alæ subjicienda est; si in interiore parte os fuit, ut ei opponatur; si in priore, ut tamen commodius deligetur.

550 A. CORN. CELSI Lib. 8.  
tur. Tum fascia, primum sub ala obvoluta,  
caput ejus debet comprehendere, deinde  
per pectus ad alteram alam, ab eaque ad  
scapulas, rursusque ad ejusdem humeri ca-  
put tendere, sæpiusque ad eandem ratio- 5  
nem circumagi, donec bene id teneat. Vin-  
ctus hac ratione humerus commodius con-  
tinetur, si adductus ad latus sit, & ad id  
quoque fascia deligetur.

C A P. X V I. 10

*De Cubito luxato. a*

**I**N cubito autem tria coire ossa, hume-  
ri, & radii, & cubiti ipsius, ex his, quæ  
prima parte hujus voluminis posita 15  
sunt, intelligi potuit. Si cubitus, qui an-  
nexus humero est, ab hoc excidit, radius,  
qui adjunctus est, interdum distrahitur,  
interdum subsistit. In omnes vero quatuor  
partes excidere cubitus potest. sed, si in 20  
priorem prolapsus est, extensum brachium  
est, neque recurvatur: si in posteriorem,  
brachium curvum est, neque extenditur,  
breviusque altero est; interdum b febrem,  
vomitumque bilis movet: si in exteriori- 25  
rem, interiorive, brachium porrectum  
est, sed paululum in eam partem, à qua os  
recessit, recurvatur.

Quicquid incidit, reponendi ratio una  
est (neque in cubito tantum, sed in omni- 30  
bus quoque membris longis, quæ per ar-  
ticulum longa testa junguntur) utrunque  
membrum in diversas partes extendere,  
donec spatium inter ossa liberum sit; tum  
id

a Hippocrat. de Articulis. T. XXI. & Vectar. T. IX. b Hippocrat. de Artic. T. XXII, 1.

id os, quod excidit, ab ea parte, in quam prolapsus est, in contrarium impellere. Extendendi tamen alia atque alia genera sunt, prout nervi valent, aut ossa huc illuc  
 5 ve se dederunt. Ac modo manibus solis utendum est, modo quædam alia adhibenda.

Ergo, si in priorem partem cubitus prolapsus est, extendi per duas manus, interdum etiam habenis adjectis, satis est: deinde rotundum aliquid, à lacerti parte ponendum est, & super id repente cubitus ad humerum impellendus est. At in aliis casibus commodissimum est eadem ratione  
 10  
 15 brachium extendere, quæ, fracto humero supra posita est, & tum ossa reponere.

Reliqua curatio eadem est, quæ in omnibus. Celerius tantum sæpiusque id resolvendum est; multoque magis aqua calida fovendum, & diutius ex oleo & nitro ac  
 20 fale perfricandum. In cubito enim celerius, quam in ullo alio articulo, sive extra remansit, sive intus revertit, callus circumdatur, isque, si per quietem increvit, flexus  
 25 illius postea prohibet,

## C A P. XVII.

*De Manu luxata. a*

30 **M**ANUS quoque in omnes quatuor partes prolabitur. Si in posteriorem partem excidit, porrigi digiti non possunt: si in priorem, non inclinatur: si in alterutrum latus, manus in contrarium, id est, aut ad pollicem, aut ad mini-  
 M m 4 mum

a Hippocrat, de Articul. T. XXIII. Veſtar. X.

552      A CORN. CELSI      *Lib. 8.*  
mum digitum convertitur, & reponi non  
difficillime potest. Super locum autem du-  
rum & renitentem ex altera parte inten-  
di manus, ex altera brachium debet, sic, ut  
prona sit, si in posteriorem partem os exci- 5  
dit; supina, si in priorem; si in interiorem ex-  
terioremve, in latus. Ubi satis nervi didu-  
cti sunt, si usque in alterutrum latus proci-  
dit, manibus in contrarium repellendum  
est. At his, quæ in priorem posterioremve 10  
partem prolapsa sunt, superimponendum  
aliquid durum, idque supra prominens os  
manu urgendum est, per quod os vis ad-  
jecta facilius in suam sedem compellit.

C A P. XVIII. 15

*De Palma luxata.*

**I**N palma quoque ossa interdum suis se-  
dibus promoventur, modo in priorem 20  
partem, modo in posteriorem. In latus  
enim moveri, paribus ossibus oppositis,  
non possunt. Signum id solum est, quod  
omnium commune est. tumor ab ea parte,  
in quam os venit: sinus ab ea, à qua reces-  
sit. Sed sine intentione, digito tantum- 25  
modo bene pressum os in suam sedem re-  
vertitur.

C A P. XIX.

*De Digitis luxatis.* 30

557, 4.

**A**T in digitis totidem fere casus, ea-  
demque signa sunt, quæ in mani-  
bus. Sed in his extendendis non æ-  
que vi opus est; quod articuli breviores, &  
nervi

nervi minus validi sint. Super mensam tantummodo intendi debent, qui vel in priorem vel in posteriorem partem exciderunt; tumque palma compelli: ut ita in  
5 locum, unde lapsus est digitus, restituatur.

C A P. XX.

*De Femore luxato. a*

10 CUM de humeris dixerim; de his quoque, quæ in cruribus sunt, videri possum dixisse: siquidem in hoc casu quædam similitudo est femori & humero, tibiæ & cubito, pedi & manui. quædam tamen separatim quoque de his dicenda sunt.

15 Femur in omnes quatuor partes promovetur: sæpissime in b interiorem; deinde in exteriorem; raro admodum in priorem, aut posteriorem. Si in interiorem partem prolapsus est, crus longius altero & valgius

20 est: extra enim pes ultimus spectat. Si in exteriorem, brevius, varumque fit, & pes intus inclinatur; calx ingressu terram non contingit, sed planta ima; meliusque id crus superius corpus, quam in priore casu,

25 fert, minusque baculo eget. Si in priorem, crus plicari non potest, extensumque alteri cruri ad calcem par est; sed ima planta minus in priorem partem inclinatur: dolorque in hoc casu præcipuus est; & maxime

30 urina supprimitur. Ubi cum dolore inflammatio quievit, commode ingrediuntur, rectusque eorum pes est. Si in posteriorem, extendi non potest crus, breviusque est; ubi consistit, calx quoque terram non contingit. M m 5 Magnum

a Æginet. VI, 118. b Hippocrat. de Articul. T. LV. Vectar. T. XI.



Magnum autem femori periculum est, ne vel difficulter reponatur, vel repositum rursus excidat. Quidam semper iterum excidere contendunt: sed Hippocrates, & Diocles, & Philotimus, & Nileus, & Heraclides Tarentinus, clari admodum auctores, ex toto se restituisse memoriæ prodiderunt. Neque tot genera machinamentorum quoque, ad extendendum in hoc casu femur, Hippocrates, Andreas, Nileus, Nymphodorus, Protarchus, Heraclides, faber quoque quidam reperissent, si id frustra esset. Sed ut hæc falsa opinio est; sic illud verum: cum ibi valentissimi nervi musculique sint, si suum robur habent, vix admittere, ut reponatur: si non habent, repositum non continere.

Tentandum igitur est, & , si tenerius membrum est, satis est habenam alteram ab inguine, alteram à genu intendi: si validius, melius adducent, qui easdem habenas ad valida bacula deligarint; tumque eorum fustium imas partes oppositæ moræ objecerint, superioresque ad se utraque manu traxerint. Etiamnum valentius intenditur membrum super scamnum, cui ab utraque parte axes sunt, ad quos habenæ illæ deligantur: qui, ut in torcularibus, conversi, rumpere quoque, si quis perseveraverit, non solum extendere nervos & musculos possunt. Collocandus autem homo super id scamnum est, aut pronus, aut supinus, aut in latus, sic, ut semper ea pars superior sit, in quam os prolapsus est; ea etiam inferior,

ferior, à qua recessit. Nervis extensis, si in priorem partem os venit, rotundum aliquid super inguem ponendum; subitoque super id genu adducendum est eodem modo, eademque de causa, qua idem in brachio fit; protinusque, si complicari femur potest, intus est.

In cæteris vero casibus, ubi ossa paululum inter se recesserunt, medicus debet id, quod eminent, retro cogere; minister contra coxam propellere. Reposito ossè, nihil novi aliud curatio requirit, quam ut diutius is in lecto detineatur; ne, si motum femur fuerit adhuc laxioribus nervis, rursus erumpat. Potest tamen conditus articulus medius aut summus canaliculo aliquo contineri.

C A P. XXI.

20 De Genu luxato. a

GENU vero & in exteriorem, & in interiorem; & in posteriorem partem excidere, notissimum est. In priorem non prolabi, plerique scripserunt. potestque id vero proximum esse; cum ibidem opposita patella, ipsa quoque caput tibiæ contineat. Meges tamen eum, cui in priorem partem excidisset, à se curatum esse, memoriæ prodidit.

30 In his casibus intendi nervi rationibus iisdem, quas in femore retuli, possunt. Et id quidem, quod in posteriorem partem excidit, eodem modo rotundo aliquo super poplitem imposito, adductoque eo crure, recondi-

a Æginet. VI, 119.

556      A CORN. CELSI      Lib. 8.  
conditur. Cætera vero manibus simul, tum  
ossa in diversas partes compelluntur.

C A P. XXII.

*De Talo luxato.*

5

**T**ALUS quidem in omnes partes pro-  
labitur. Ubi in interiorem partem  
excidit, ima pars pedis in exteriorem  
partem convertitur. Ubi huic contrarius  
casus, contrarium etiam signum est. At, si in 10  
priorem partem prorumpit, à posteriore  
latus nervus durus & intentus est; simul-  
que iis pes est. Si in posteriorem, calx pene  
conditur, planta major fit. Reponitur au-  
tem is quoque per manus; prius in diversa 15  
pede & crure diductis. Et in hoc quoque  
casu diutius in lectulo perseverandum est;  
ne is talus, qui totum corpus sustinet, pa-  
rum confirmatis nervis, ferendo oneri ce-  
dat, rursusque prorumpat. Calceamentis 20  
quoque humilioribus primo tempore uten-  
dum; ne vinctura talum ipsum lædat.

C A P. XXIII.

*De Planta luxata.*

25

**P**LANTARUM vero ossa iisdem modis,  
quibus in manibus, prodeunt; iisdem-  
que conduntur. Fascia tantummodo  
calcem quoque debet comprehendere, ne,  
cum mediam plantam, imumque ejus vin- 30  
ciri necesse est, liber talus in medio reli-  
ctus, materiam pleniorē recipiat, ideo-  
que suppuret.

C A P.

## C A P. XXIV.

*De Digitis luxatis. a*

5 **I**N digitis nihil ultra fieri debet, quam  
quod in his, qui sunt in manu, positum  
est. 552, 30.

## C A P. XXV. a

*De his, qua cum vulnere loco moventur.*

10 **H**Æc facienda sunt in his casibus, ubi  
sine vulnere ossa exciderunt: sæpe  
tamen cum vulnere loco moventur.  
Hic vero & ingens periculum est, & eo  
gravius, quo majus membrum est, quove  
15 validioribus nervis aut musculis contine-  
tur. Ideoque ab humeris, femoribusque,  
metus mortis est; ac, si reposita ossa sunt, spes  
nulla est: non repositis tamen, nonnullum  
periculum est. Eoque major in utroque ti-  
20 mor est, quo propius vulnus articulo est.  
Nam Hippocrates b nihil tuto reponi posse,  
præter digitos, & plantas, & manus, dixit:  
atque in his quoque diligenter esse agen-  
dum, ne præcipitentur ægri. Quidam bra-  
25 chia quoque & crura reposuerunt: &, ne  
cancri, distentionesque nervorum oriren-  
tur (sub quibus in ejusmodi casu fieri solet  
mors matura) sanguinem ex brachio mise-  
runt. Verum ne digitus quidem (in quo mi-  
30 nimum, ut malum, sic etiam periculum est)  
reponi debet aut in inflammatione, aut  
postea, cum jam vetus res est. Si quoque,  
reposito osse, nervi distenduntur, rursus id  
protinus expellendum est.

Omne

a Æginet. VI, 116. a Æginet. V. 121. b Hipocrat.  
Vectar. XIX, 5.

552 A. CORN. CELSI MED. Lib. 8.

Omne autem membrum, quod cum vulnere loco motum, neque repositum est, sic jacere convenit, ut maxime cubantem juvat: tantum ne moveatur, neve dependeat. In omni tali morbo magnum ex longa fame præsidium est: deinde ex curatione eadem, quæ proposita est. Ubi ossibus fractis vulnus accessit, si nudum os eminent, impedimento semper futurum est, ideo, quod excedit, abscindendum est; imponendaque super arida linamenta sunt, & medicamenta non pingua; donec, quæ saltem esse in ejusmodi re sanitas potest, veniat. nam & debilitas sequitur, & tenuis cicatrix inducitur: quæ necesse est facile noxæ postea pateat.

F I N I S.



BRE-



B R E V I O R A  
V A R I O R U M A U C T O R U M  
In  
C E L S I L I B R O S  
S C H O L I A.

**P**Ag. 10. l. 22. *Quid optime digeratur*] Legi potest, sed quam id optime digeratur. Jo. Cæsarius.

p. 10. 34. *Non eloquentia, sed remediis curari*] Hinc Virgilius *mutas artes* vocat. XII. *Æneid.* Casaub. Vide Reies Camp. *Elys. jucund.* Quæst. Quæst. VII. pag. 61. & seqq.

p. 11. l. 1. *Discreta*] *Discretus* legit Casarius.

p. 11. l. 25. *Nam ne uterum quidem*] Auctor noster uterum sumit pro ventre seu abdomine, ita enim lib. IV. cap. 1. *At sub corde atque pulmone, transversum ex valida membrana septum est, quod à præcordiis uterum diducit.* Martial. l. 3. Epigr. 71. Isidorus Orig. XI. cap. 1. *Uterum sola mulieres habent in quo concipiunt, ad similitudinem cauliculi.* (Martinius *Canaliculi, forte cuniculi.*) Tamen autores uterum pro utriusque sexus ventre plerumque ponunt, nec poeta tantummodo sed & ceteri. Doctissimus Casp. Bartholinus *Exercitatione IX.* observat Tacitum, *uterum* Navis ob cavitatem dixisse; Lactantius de *Opificio Dei* c. 11. *uterum* pro vesica aut simili cavo corpore posuit. Columell. XII. 4. *quod in utero dolii est.*

p. 19. l. 22. *Facilius in denso cælo, quam in tenui; facilius hieme, quam æstate*] Quibusdam videtur hic legendum potius, *in tenui cælo, quam in denso: & æstate, quam hieme,* propterea quod Hippocrates dicat lib. I. *Aphor. Ventres hieme & vere sunt calidissimi. Quare per ea tempora alimenta copiosiora sunt exhibenda.* Et Paulus Aegineta libro itidem primo cap. 53. *Hieme quidem & fortiori exercitatione, & pleniore cibo utendum est.* Nisi eo reteras quod in denso cælo & per hiemem corpora sunt robustiora, atque ideo etiam facilius quamlibet molestiam ferant. *Cæsar.*

p. 22. l. 17. *Gravibus*] Hic gravis opponitur salubri. *Const.* Sic ipse explicat pag 24. *neque ex salubri loco in gravem, neque ex gravi in salubrem transitus satis tutus est.*

p. 25. l. 15. *Os amarum*] Modo biliosus non sit, nam πικροχόλοις adversatur inedia, Hippocrat. de Victu Auctor. Galen. Meth. Med. VIII. ergo hic Celsus indistincte Constant.

p. 28. l. 15. *Somnus plenus*] Integer nec abruptus ante iustum dormiendi tempus. Constant.

p. 36. l. 21. *Qui his opportunus est*] Opportunus pro obnoxius. Sic p. 42. l. 1. *Corpora periculis opportuna*. 81, 10. *Opportuniores injuria partes*. 194, 17. *Opportuniores nervos frigori reddidit*. 199. 32. *Partes opportuniores vitio jam sevientis*. Casaub.

p. 42. l. 20. *Ex tempestatibus*] *Tempestas* non est proprie nomen simplex τὸ τὴ ἔτις τεταρτομόριον, sed ὦρα, hoc est, ἡ ποιά κατάστασις. Casaub.

p. 42. l. 22. *Plana*] Prorsus legendum *plena*, hoc enim & Aphor. 11. 35. ubi πάχος ἔχειν, &c. & in Prognost. unde & sequentia desumfit. Constant.

p. 43. l. 3. *Regionum sorte*] Pro sorte situs & positura regionum pro climatis varietate. Constant.

p. 43. 16. *Corpus habilissimum*] *Mediæ staturæ* explicat Brodæus Miscel. l. IV. c. 19.

p. 45. l. 27. *Quam phrenitiv appellant*] *Phrenitiv* tum hic tum alibi apud Celsum non Phrenesis, sed Phrenitis (ut & Hermolaus Barbarus nos admonet) legendum est. Quamvis apud Martialem Juvenalemq; non Phrenitis, sed Phrenesis quoque legant. Idque tamen (ut Barbarus suspicatur) ex vulgari imperitorum consuetudine. Doctiores secundum Despauterium legunt, *Cum furor haud dubius, cum sit manifesta Phrenitis*. Cæsar.

p. 46. l. 26. *Glandula*] Nomen est hic partis, pro ejus morbo atque inflammatione Hippocrat. παρίσθμια ἰ. tonsillæ ἀντιάδες, pro parte autem l. 4. c. 1. Constant.

p. 50. l. 20. *Sub fine*] Sub finem; sic κρίσις i. e. judicationem videtur appellare. Constant.

p. 55. l. 11. *Ad viscera transierunt*] Lumbos & ilia ἰ. χαγόνας vel κενεῶνας ut habet Hippocrates, & pro φρένας vel διάφραγμα, id est, præcordia vel septum transversum, substituit viscera non mendacio sed innovatione. Constant.

p. 56. l. 30. *Diutius trahere*] Sicut dicimus Galli de male sano & affecto, *il traine toujours*, si quis in eo morbo diutius traxit. mox; *autumno qui cetera anni parte traxerint, resolvuntur*. p. 137. *agri sub cautioribus medicis traherantur*, & 138. *agros Medici diutius tractos non expediverunt*. Casaub.

CELSUM SCHOLIA. 56x

p. 57. l. 5. *Democritus*] Qui περὶ ἀρῆς scripserat, ut quibusdam placet. vid. ad *Laert. Casaub.*

p. 57. l. 6. *Certas notas esse, proposuit*] Scaliger ad *Manilium* l. V. pag. 308. putat *Celsum* *Democriti* librum, περὶ ἀρῆς, quem *Plinius* *Heraclidæ* adscribit, indigitasse: verum refutat illustrissimum virum clar. *Menagius* in *Observationibus* ad *Diogen. Laert. Procem.* pag. 5. Ed. Lond.

p. 57. l. 19. *Responderit*] Respondere *Celso* est σοχάζεσθαι, vel potius commode cedere, εὐοδῆσθαι, & sic passim. *Casaub.*

p. 58. l. 26. *Terram edunt*] Id est, malacia aut pica laborant.

p. 59. l. 7. *Desidendi*] Sic honeste τὸ σχέζειν exprimit. 86, 24. 224, 33. *Casaub.*

p. 59. l. 4. *Et coxis est*] Coxas pro lumbis, ilia pro lumborum partibus mollioribus posuit. *Constant.*

p. 62. l. 20. *Lienis tumet*] Lienis pro lien amat dicere *Celsus*. *Lienes male habent.* 74, 24. & 94, 6. 176, 22. Ita *Cato* de R. R. Cap. 157. *Si lienes turgent.* *Casaub.*


p. 62. l. 31. *In pectus*] Pectus pro septo transverso posuit. *Constant.*

p. 76. l. 3. *Isque morbus mediocris vix sanatur*] Ita *Hippocrates* *Section. II. Aph. 42.* in quem latius inquirat *Reies Campi Elysi jucundar Quæstion. Quæstion. LXXIX.* Vide doctissimum Librum *Iusti Cornuani* de *Morbo Attonito.*

p. 80. l. 1. *Casibus*] Id est, capitis dolore, *Aph. V, 68.* oculorum, *Aph. VI, 31. VII, 46.* dysuria, *Aph. V, 36.* stranguria, *Aph. VII, 48.*

p. 82. l. 30. *Cucurbitular. vero duo genera sunt: aneum & corneum*] Quam frequens cucurbitarum, ut eas vocare amat *Cælius Aurelianus*, apud veteres fuerit usus norunt ii, qui in antiquis scriptoribus sapius sese recreant; testis est *Plutarchus* in conviviis, qui dicit propter usum non parum laudis id remedii genus invenisse. Has vero in quovis corporis loco agglutinabant, defigebant, & accommodabant, ut loquitur *Celsus*, vel cum, vel sine ferro, seu scarificatione, quas leves vocat *Cælius Aurelianus* *Acut. Morb. I. Cap. 11.* idque mediante aqua calida uti refert *Albucasis*, vel igne quas idcirco arentes & siccatas nominavit; idem *Cælius Aurelianus* *Acut. Morb. I. cap. 11.* Materiam qua constabant duplicem vocat *Celsus*. De corneo autem cucurbitularum.

362 V A R I O R. A U C T O R. I N  
 genere vide sis Thom. Bartholinum de unicornu c. XXXII.  
 & pag. 322. & seqq. formam vero describit clar. Smetius  
 Antiquitatum Neomagens. pag. 80. hisce verbis: *Cucur-*  
*bitula sunt aenea aut figlina, aenea tres, figlina septem, forma*  
*omnes rotunda, fundo plano, tumido ventre, & in superioris*  
*orbis acclivis centro os habent rotundum & patens, quod pollicem*  
*crassiusculum admittit. Ligula parva angusto foramine iisdem*  
*pro manubrio est. Cujus è cimeliarchio, ut eo melius forma*  
*cucurbitularum appareat, effigiem hic apponi curavimus.*



p. 91. l. 27. *Lecti fulcimentum* ] Celsus accipit non pro  
 fulcro lecti, sed pro quovis fulcimento quod pedi lecti,  
 sive clinopodio subjicitur. Scaliger ad Manil. lib. 1. pag.  
 395.

p. 93.

p. 93. l. 8. *Arena calida*] De remedio calentium arenarum & arundinum Augustus apud Suetonium c. LXXX. & Gellius XIX, VIII. *Casaub.*

p. 95. l. 22. *Utriculi*] Vocantur ἀσκοὶ sive φασκοὶ πυρματοί. *Const.*

p. 97. l. 20. *Infirmissimus, cibarius panis*] Joan. Cajus Tilebomenius in conjecturis ad Petronii fragment. Trugurian. pag. 92. tollit distinctionem, & legendum putat, *infirmissimus cibarius panis.*

p. 97. l. 28. *Sarculorum valentiores*] Ἀκρόδρυα intelligit *Casaub.*

p. 99. l. 16. *Elota quadam genera frumenti*] Eadem occurrunt infra 103, 16. 131, 7. & alibi passim. an hic cibus commune quid habet cum eo, quem vocamus Galli, *orge mondé?* namque non ex oryza solum, sed ex quovis alio etiam frumenti genere paratur. *Casaub.*

p. 99. l. 18. *Aqua madens panis*] Gall. *potage*, *Casaub.* Hunc unum eundemque esse, quem Galenus (lib. I. c. 5. *de Alimentor. Facul.*) lotum, Plinius vero (XXII. c. 25.) panem aquaticum vocat, arbitratur Mercurialis *Variar. Lektion. lib. VI. cap. 17.* qui videndus est.

p. 100. l. 4. *Aqua levissima pluvialis*] Vide sis Brodæi *Miscell. l. IV. c. 38.*

p. 101. l. 25. *Trunculique*] Suspico verbum *trunculi* corruptum esse hoc loco, & legendum esse *ventriculi*, idque Pselli autoritate, apud quem legitur de ratione vitæ. *Inter ea quæ crudos humores generant hoc modo: Ceterorum animalium partes, ventres, intestina, vulva &c.* Et apud eundem non multo post; inibi, inter ea quæ nutriunt multum, & omnium inquit *volucrum ventres.* Non tamen me fugit esse doctissimum virum, qui priorem lectionem non improbet. Unde idem trunculos opinatur esse edulii genus frustulatim concisis carnibus constans. *Cæsar.*

p. 102. l. 23. *Petioli*] Id est; parvis pedibus, a Cato-  
ne pedicini in L. de R. R. appellati. *Const.*

p. 105. l. 28. *Lactentia*] Leg. *lactaria* & in hac & in sequenti proxime pagina. In historiis læpe *lactarios* invenias & *dulciarios.* *Casaub.*

p. 110. l. 16. *Git.*] Μεγάθυρον. sic & 233, 24. *Casaub.* Ita etiam explicat Marcellus de Medicam. C. XXII. pag. 341.



p. 118. l. 22. *Ego autem*] Notandum hic, isthæc a Celso dici non tanquam *παίδων*, sed potius tanquam Medico artis suæ bene gnaro ac sententiam super illis, quæ in controversiam venire, ferenti. Eandem elocutionem etiam infra videas 143, 24. 176, 1. *Casaub.*

p. 131. l. 8. *Intrita ex aqua calida*] *Ex vino*, infra 153, 13. Et est quidem elegans usus hujus voculæ *ex*, pro *σύν*, vel *έν*, apud *Celsum* & *Plinium*. Noster 344, 19. *emplastrum tetrapharmacum ex aceto subactum*, h. e. *cum*. mox, *terra ex aceto subacta*, h. e. *in*. sic & 361, 3. *Ex aceto terunt*. Vid. *Victor. Var. Lect.* xxxii, iv. *Casaub.*

p. 132. l. 22. *Potio esse debet magis liberalis*] *Liberalis* pro *copiosus* & *multus* vox Celso peculiaris. *Casaub.*

p. 138. l. 25. *Duo pitacia*] Hic *pittacium* non pro *panniculo* sed corio medicamento illito, capiti aut præcordiis applicando positum rectissime observat *Bynæus* de *Calc. Hebræor.* l. i. c. 2. ubi de *pittacio* multa.

143. l. 12. *Altero quoque die*] Idem est ac si *tertio quoque die* diceret. 124, 21. *cibus tertio quoque die commo- distime datur, ut alter febrem minuat, alter viribus subveniat.* *Casaub.*

p. 148. l. 23. *Loqui aliena*] Expressio hæc est ab *Hippocrate* qui *ἀλλοφάσσειν* ait τὴν παραφρονῆντας. *Casaub.*

p. 151. l. 7. *Caput impleatur*] Implere caput, hic pro *fovere*, *rigare*, *ἐμβρέχειν*. sic lib. iv. c. 2. *Constant.*

p. 181. l. 21. *Ut ab egelidis tamen initium fiat*] Ex hoc facile colligitur, falli eos, qui *egelidam* pro *trigido* usurpant, est enim *χλιαρὸς* *Casaub.*

p. 182. l. 27. *Stomachus interior ad ventriculum fertur*] *Stomachus* Celso ipsa *gula*, per quam transeunt alimenta priusquam ad *ventriculum* veniant, qui vulgo *stomachus* appellatur. Medici vocant *œsophagum*. *Casaub.* *Lactant.* de *Opificio Dei* c. xi. *fistulam cibalem* vocat.

p. 182. l. 27. *Alt. stomachum*] *Stomachus* hic pro ipsa *gula* accipitur ut & infra l. iv. c. 5. quamvis aliquando & pro *ventriculi* parte inferiore *stomachi* utatur *Celsus*, ut cum ait: *Stomachus vero intestinorum præcipuum est.* *Constant.*

p. 195. l. 24. *e pullis*] *Alii a pullis* sed quidam libri scripti habent *apalus*: ut noster etiam quidam, satis antiquus & fidelis, qui servatur in *Medicea Bibliotheca.*

Cum

Cum autem videatur alterum horum, id est aut *apalis*, aut *mollibus* scholion esse, verisimilius est Græcum *ἀπαλοῖς*, declarationem fuisse latinæ vocis *mollibus*, quæ sequitur; quis enim unquam crederet Romanum scriptorem, & eum quidem purum atque elegantem in media oratione sua Græcam vocem usurpasse, &c. *Victorius Variar. Lect. l. xxix. c. 3.* Scribonius Largus Composit. Medic. N. CIV. hac voce utitur: *secundum quæ apala ova proderunt.* Ad quem locum multa congescit doct. J. Rhodius, qui apud Celsum *hapalis* restituendum putat. Cæl. Aurelian. Acut. Morb. I, 10. Marcell. de Medic. Cap. XX.

p. 201. l. 6. *Pituitam citat*] Hoc est, *mouet*, 211, 5. vel *trahit* ut 211, 33. loquitur. admodum familiare hoc verbum Celso. 1210, 7. *humorem citare.* 297, 6. *pus citare.* 450, 16. *sanguinem citare.* & alibi plurimis locis. *Casaub. dentem citat*, 383, 8.

p. 202. l. 8. *Aliis vero vinum*] Columella de Re Rustica, lib. xii. cap. 32. commendat ex marrubio; cap. 33. vinum scylliten.

p. 202. l. 12. *Ex gingivis*] Hoc mihi sæpe evenit. *Casaub.* Jacobo Usserio hæc hæmorrhagia erat periodica, teste Arnaldo Bootio Observ. cap. 7.

p. 207. l. 31. *Sumbruinarumque*] *Subcutiliarumque* mihi legendum videtur. Nam cuiusmodi sint *Sumbrina aqua*, nondum apud quenquam reperi scriptorem idoneum & probatum: de *Subcutiliis* vero *Plinius* l. 31. c. 2. quas in *Salinis calidissimas* esse dicit, & *suctu quodam corpora invadere, aptissimas stomacho, nervis, universo corpori.* Idem & de *Cutiliis* l. 2. c. 97. & l. 31. c. 6. quas inibi *bituminatis, aut nitrosis bibendo utiles esse, atque purgationibus* tradit, De *Cutiliis* item *Vitruvius* l. 8. c. 3. ubi scilicet de aquæductibus tractat. *Cæsar.* Adde hic quæ habet *Lilius Gyraldus* Dialogismo X. pag. 424. Tom. 2. Facis Critic.

p. 207. l. 30. *Cutiliarum Sumbruinarumque*] Male quidam *Succutiliarum.* Ald. Manut. de Quæst. per Epist. Q. I. Consule de lacu *Cutiliensi* *Merulam Cosmogr. Part. 11. lib. iv. Cap. xii.*

p. 213. l. 13. *Trunculorum*] *Ventriculorum* vel *tyrunculorum.* *Cæsar.*

p. 215. l. 12. *Venterque intentus est*] Ita *cappadox* apud *Plautum* in *Curcul. II, 1.*

N n 3

Nam

*Nam jam quasi zona liene cinctus ambulo.*

*Geminos in ventre habere videor filios.*

*Nihil metuo, nisi ne medius disrumpat miser.*

p. 215. l. 17. *Exercitatione & labore*] Hoc remedium Palinurus præscribit Cappadoci (Curcul. II, 1.) *ambula, id lieni optimum est.*

p. 224. l. 18. *Frequens deijcendi cupiditas*] Galen. *αποθυμία τῆ ἀποπατεῖν. Casaub.*

p. 235. l. 18. *Nuclei pini*] Omne medium nucleus erat veteribus. Celsus, quem dixi, aliquoties similiter frequentaverat: at hodie *trunculi* reperies corrupte: *Intermuculi* vero sive *nuclei* germanum esse, meliorum aliquando codicum opera monstrasse sperabo. *Pontan. ad. Macrob. Saturn. II, 14.*

p. 235. l. 23. *Vitare autem oportet rutam, &c.*] Duo hic præcipit extrema cavenda Celsus, primum ne nimium exstinguentibus semen utatur medicamentis, inter quæ refertur ruta; dein ne supinus dormiat, qui situs seminis fluxum augere solet. Ettmuller de feminis retentione læsa. *An autem ruta, mentha & alia planta calida venerem adangeant, hebetent, atque extinguere valeant jucundissime inquit Gaspar. a Reies, Quæst. XLIV. Camp. Elyf. Jucund. Quæst. pag. 309.*

p. 241. l. 17. *Herophilus, deductique ab eo viri*] Convenit cum Græca loquendi ratione *καὶ οἱ ἀπ' αὐτῶ. Casaub.*

p. 244. l. 32. *Sæpius fascia circuire debet*] Galli dicimus: *faire plusieurs tours. p. 533. l. 8. Casaub.*

p. 246. l. 31. *Sordes ex gymnasio*] *Γλοῖον* intelligit. *Casaub.*

p. 249. l. 3. *In uncia pondus &c.*] Multi sunt qui de ponderibus & mensuris medicis scripsere, quorum indiculus exstat apud Merklinum in Lindano Renovato. Omnium tamen, si Celsum spectamus, optimus est Joan. Rhodius, cujus dissertationem *de ponderibus & mensuris veterum Medicorum, imprimis Corn. Celsi*, edidit Th. Bartholinus Hafniæ 1672. quam huic nostræ editioni subjungere ipsa vetat crassities. Ad pleniorum vero ponderum notarum in Cello occurrentium notitiam J. Manardi epistolam, quæ est IV. lib. XVII. adjicere consultum jduximus.

J. MANARDUS,

J. PAULO CASTILIONO

S. D.

„ Alexandrum Capelinum, licet antea magna mihi  
 „ familiaritate conjunctum, tuâ etiam causa benignis-  
 „ sime excepi, quantumque pro tempore valui, salutis  
 „ hominis consului: vix enim duobus diebus apud nos  
 „ fuit. Ex eo poteris de mea valetudine intelligere. De  
 „ Celsi vero characteribus quid sentiam, breviter sub-  
 „ scribam. p, pondo intelligo. X vel \* denarium, sep-  
 „ timam videlicet (ut ipsemet seipsum declarat) unciæ  
 „ partem. Per notas quæ sequuntur, denariorum nume-  
 „ rum accipio. Atque ut hæc exemplis reddantur cla-  
 „ riora, ubi in primo malagmate lib. v. legitur, *Æru-*  
 „ *ginis rasæ & thuris singulorum p. xii.* intelligo accipien-  
 „ dos singulorum, æruginis scilicet, & thuris binos de-  
 „ narios. Cæræ vero & squammæ VIII. subdit enim  
 „ XVIIII. sicubi vero in antiquioribus exemplaribus,  
 „ jam diu videlicet excusis, scribuntur duo χ. ut in ma-  
 „ lagmate sequente ad jecur dolens, per primum intelligo  
 „ pondus denarii: per secundum, denariorum numerum,  
 „ ut accipiamus *lachrymæ balsami denarios duos & viginti,*  
 „ *& costi cum reliquis, quæ sequuntur, sexdecim.* Simili  
 „ modo in Andree malagmate ubi scribitur p. xxx. in-  
 „ telligendum pondus viginti denariorum. Idem in simi-  
 „ libus intelligendum, ita tamen, ut sciamus per p. non  
 „ semper simpliciter pondus accipiendum, sed interpre-  
 „ tandum pondo, hoc est, libram: ut in Mosci malag-  
 „ mate, ubi scribitur p. ii. ego duas libras intelligo: nisi  
 „ forte in exemplari nota desit denarii, ut scilicet sit le-  
 „ gendum p. xii. tunc enim duos denarios intelligeremus.  
 „ Ubi vero p. iz. octavam partem libræ: vel si χ desit,  
 „ octavam partem denarii: & pro triente, tertiam libræ  
 „ partem. Legitur & quandoque apud eundem Celsum

„ p. sextantem, ubi ego intelligo sextam libræ partem,  
 „ binas videlicet uncias: sicut & per bessem, octo uncias.  
 „ Hæc habui, alioqui in profitendi munere occupatus:  
 „ quæ de ponderibus Celsi scriberem. Si quid vero adhuc  
 „ in his desideraveris mihi per literas significato. Vale. Ex  
 „ Ferraria, x i i. Kalend. Decemb. M. D. XXXIII.

Ad cætera vero quæ in Celfo occurrunt intelligenda faciunt Sorani Ephesii verba quæ subjungere idcirco volumus Cap. x x i i i. & Præfatio Piinii de Re Medica.

p. 250. l. 7. *Aut cerato*] Leg. *ut cerato*, sic enim sæpe emplastra ceratis emolliuntur ut 517, 24. nec emplastra, sed & aliud, ut *cervicem liquido cerato molliri* dicit, p. 520, 12. *Casaub.*

p. 253 l. 29. *Sub authore Medo*] Forte legendum *Medis*; Plinius enim N. H. cap. iv. lib. xx. Medium quendam producit. Galenus adversus Erasistratæos cap. 2. ( pag. 409. Tom. x. Ed. Chart. ) Medium quoque citat, quo tamen loco legendum *Μυδιάς* putat Menagius ad Diogen. Laertium pag. 129. B. qui, an idem sint, an diversi hæctenus expositum non est. nos nihil certi statuere possumus, expectantes avide Medicorum historiam à viris clarissimis Menagio & Meibomio pollicitam, qui nodum hunc forte sint soluturi.

p. 260. l. 22. *Choacōn emplastrum*] Legendum *tortassis ehiacum*, ut apud *Georgium Vallam de cura oculi*; nisi malis *Coacōn*, quod inter *Hippocratis* opera liber habeatur, qui inscribitur *de Coacis prænotionibus*, unde nomen deductum videri potest. *Cæsar.*

p. 280. l. 19. *Athenionis*] de *Athenione* quodam, sed non Medico ( reor ) habes in vita *Maximini patris & filii* apud *Fulium Capitolinum*. *Cæsar.*

p. 286. l. 26. *pars per naturam*] Eleganter non minus quam honeste genitales partes naturam vocavit. Sic etiam Cicero de Divination. l. ii. c. 70. *Parere quadam matrona cupiens, dubitans, essetne prægnans, visa est inquiete obsignatam habere naturam.* Sæpius Plinius aliique. Hippocrates vero ea significatione usus est verbo φύσις. Hesy chius Εσχάται, πυραι ἐπὶ ἐδάφους ἀνδρακίαι, καὶ αἱ τῶν γυναικῶν φύσις ἐξώσραι τετραγῶνα. Hieron. epist. 61. *Pars corporis nostri secretior φύσις, a nobis natura dicitur.* Usurpaturque hæc vox tam de muliebribus quam virilibus partibus uti in commentario ad *Carm. xxxviii*. *Priap.* videre est.



p. 296. l. 22. *Ex aqua frigida*] Videtur ex hoc loco sibi contradicere auctor, siquidem l. III. c. 9. dixit frigida inimica vulneri, uti etiam docet Hippocrates Aph. v. 20. Quin mox præcipit ipse saniem aqua calida removendam, quoniam calor naturæ prodest. Sed scitissime Celsus aquam frigidam commendat, quia sanguinis timenda in vulneribus fluxio est, transtulitque hunc locum ex Hippocr. libr. de humid. usu T. XI, 27. τὸ δὲ ψυχρὸν πολέμιον καὶ κλειῖνον, πλὴν ὅ καὶ αἰμορραγέειν ἐλπὶς. Celsus pag. 293. *Levis plaga juvatur etiam, si ex aqua frigida expressa sponsa imponitur.* Confirmat hoc experimentum quod refert. Doct. Caspar. Bartholinus *Exercitatione VII. pag. 129. Panarol. Pentec. v. Obs. 27.*

p. 305. l. 22. *In filice*] Vera lectio: *in filicis hastula.* De filice impacta corpori & arundine eadem habet *Marcellus de Medicam. cap. XXXIV. & Plinius XXIV, XI. Casaub.*

p. 309. l. 21. *Psylli*] Bochart. Hieroz. T. 2. l. 4. c. 19. P. 587.

p. 309. l. 21. *Psylli*] Miramur vulgo cum legimus, esse, qui venenatas bestias, & serpentes tuto tractent, & eorum venenum adimant. Desinet mirari qui *Celsi* hæc legerit. Sed & *Dio* quoque *Psyllis* aliud nihil tribuit, quam τὸ ἐκμυξῆν. Hodie, similis gens vagatur per Italiam, quæ a *D. Paulo* originem generis stulte refert. *Casaub. De Psyllis vide Turneb. Advers. xvi. 6. Ettmuller. ad Schroder. p. 184.*

p. 311. l. 3. *Spumet.*] Spumare hic est ζυμῶσθαι, id est fermentari, *Galen. de Atra bile. Constans.*

p. 313. l. 7. *Cum incubant*] Bochart. Hieroz. Tom. I I. l. 3. cap. XI. pag. 415.

p. 319. l. 16. *Cano simile*] Constans hæc fere lectio est. *Ronsseus* in marg. habet *ovo* vel *cavo*. Ego hæctenus, quamvis locum sanum non putem, nihil muto. Vir quidam doctus margini editionis Cæsarianæ hanc transpositionem inscripsit. *Id ulcus inaequale est, inestque multus humor glutinosus, cano similis, odor, &c.*

p. 322. l. 19. *Chironium*] Χειρώνιον ἔλεγε, quidam ita dictum putant, quod *Chirone* Medico indigeat. Idem & τηλεφῶν dicitur à *Telepho*, qui huic vitio obnoxius fuit. *Cesar.*

p. 323. l. 5. *Ex frigore hiberno ulcera*] hoc genus ulceris Græcis χίμετρον dicitur. Hefychius χίμετρον, inquit, τὸ ἐν χιμαῶνι γινόμενον ἔλκεσσι ὑπὸ ψύχουσι. Latinis autem *Pernis* dicitur. *Casab.*

p. 335. l. 2. *Exigunt*] Editio 1497, Aldina 1528. hanc servant lectionem, alii tamen è codicibus malunt *adigunt*, alii *ambunt*, minus, ut puto, recte, neque enim *radices exigere*, aut *adigere*, aut *ambire*, apud antiquos legitur, quapropter substituo vel *agunt*, vel *exferunt*, ita enim Columella l. II. c. 10. de naris *quia non in ventrem latefcunt, sed tenent radicem deorsum agunt*, & V. 6. *ac ne radices altius agunt*, alibi *exferere radicem* dixit.

p. 336. l. 21. Φλυζάκιον] Galenus Commentario IV. in Hippocrat. de Vict. Ration. in morb. acut. ait φλυζάκιον significare φλυκταίνην, unum idemque esse pustularum genus, Celsus tamen distinguere in duo genera videtur.

p. 338. l. 33 *Sicut de pecoribus propofui*] Nullus dubito quin Auctor indigitat libros suos de *Re Rustica* quorum passim meminit Columella. An ad eos referri possit quod dicat lib. IV. c. 7. *Attamen sine his rusticos nostros epota ex aqua trixago satis adjuvare dicitur*, judicent docti.

p. 340. l. 3. *Sub authore Protarcho*] Ita infra 402, 17. *sub authore Dionysio*. *Casab.*

p. 344. l. 8. *Ulcus durum*] Bochart. Hieroz. part. II. l. 6. cap. 6. pag. 827.

p. 348. l. 3. *Votumque est*] Eleganter hoc positum pro eo, quod Græci dicebant ἀγαπήτων ἀνείη. *Casab.*

p. 350. l. 12. *Lana mollis bene carpta*] Cum *lanam carpere* dicatur de muliere *nente ξανῶση*, non videtur hæc interpretatio huic Celsi loco convenire, qui de *lana* potius *carminata* est intelligendus. Equidem Latine dicimus, *lanam carpere*; sed an *carptam lanam* itidem dixerint Veteres accuratori indagatione indiget. *Casab.*

p. 386. l. 29. *Rhus quem Syriacum vocant*] Vide sis de hac herba, Plinium lib. XXIV. cap. XI. Manardi Epistolam IV. lib. I. qua contendit voce Græca *rhus* scribendum esse. Rhodium in Lexico Scriboniano & Bodzum a Stapel in Theophrasti lib. III. cap. XVIII. Histor. Plantar.

p. 403. l. 28. Πτερύγιον Græci appellant] *Reduviam* vel *reduviam* vocant Latini. *Casab.*

p. 411. l. 15. *Fortuna huc illucve discernit*] *Lege decernit.*  
*Casaub.*

p. 422. l. 29. *Χαλαζία*] *Bechart. Hieroz. Part. II. l. 5.*  
*c. 9. pag. 721.*

p. 424. l. 7. *Ρυάδα* *Græci vocant*] *Rhyada* non *Rhypada*,  
 ut hætenus, legendum est, idque partim ratione vocabuli  
 ad rei significationem alludentis, respondentisque, partim  
 quod huic lectioni *Symon Genuensis* adstipulari videtur,  
 ex sententia *Demosthenis* cujusdam, quem crebro ille citat,  
 cujus & hæc verba citat, quibus *rhyada* ille ita descri-  
 bit: *Rhyas*, inquit, est *continuus lachrymæ fluor*. Quam-  
 quam dicat idem author, qualis qualis est, apud *Celsum*  
*rhypada* legi. Quin & huic sententiæ meæ adstipulari vi-  
 detur *Hermolaus Barbarus* in suis *Corollaris*. Quid quod  
 & apud ipsum *Galenum* l. 14. *ῥεραπειωτικῆς* legitur, ubi  
 de oculorum vitis agit, *ρυσίδες*que appellat, de quo hic  
 differit *Celsus*, oculorum vitium. *Cesar.*


p. 455. l. 34. Quæ *ἐλυτροειδής*] *Nicolaus Loënsis* cum  
 quibusdam codicibus *ἑρυθροειδής* legendum esse putat, *Mis-*  
*cellan. l. 9. c. 7.*

p. 473. l. 6. *Infibulare quoque adolescentulo*] *Fibula* hæc  
 simile aliquid habet iis, quæ vocamus *Cadenats*. Mira  
 sunt, quæ super his narrantur de *Monachis Turcarum*.  
*Casaub.*

p. 477. l. 27. *Plaga lunata*] *Vide sis Th. Bartholinum*  
*de Unicornu cap. XXIII. pag. 194.*

p. 483. l. 3. *Hapsus lana mollis*] *Hapsus* est lanæ parti-  
 cula molliter in globulum formata. *Floccum* dicit *Plin. 30.*  
*15.* reperitur prætea hæc vox etiam apud *Caprum de verbis*  
*dubis*, & in *Glossario Isidori*, ubi tamen *hapsum* ἀντι τῆς hap-  
*sus* scribendum esse docetur, ipsaque vox per *vellus lana*  
 explicatur. *Casaub.*

p. 483. l. 3. *Hapsus lana mollis*] *Hapsus* non est *πίλημα*  
 (lanas coactas Latini dicunt & coactilia) inepte enim  
 dixisset *hapsum* lanæ mollis. quod coactum molle non  
 est, sed durum. Est vero *hapsus* (παρά τὸ ἀπλομαί ἄλομαί)  
 quantum lanæ uno runcinarum contactu & factu carmi-  
 natores discriminarunt. Vulgo vocant *paumées* à palma.  
 Ergo lanæ *δράνα* & quantum vola capere possit per hap-  
 sum



Sum intelligo. usus est etiam ea voce lib. IV. Cap. VI. *Constant.*

p. 488. l. 27. *Quod earum naturalia, &c.* [ *Ἀτρήτως* vocari quos Latini *imperforatos* dicunt, unicuique notum est; at amplissimus Gisb. Cuperus in Harpocrate pag. 28, 29. novissimæ editionis, *Harpocratianos*, ejusmodi homines vocatos fuisse eleganter ex Ptolomæo demonstrat, quem locum etiam interpretatur Rutgerius Variar. Lection. lib. III. c. XVIII. quo quid *concreti, confertum virginal, ob-signata natura*, sint, exponit. de Atretis & imperforatis consule Schenkium Observation. l. IV. pag. 529. & seqq. ubi varia exempla recensentur; Patinum Epistol. Gallicar. No. 60. édit. tertiæ.

p. 489. l. 7. *Vel vulsella* ] *vulsella* quæ & *volsella* dicitur, instrumentum fuit veteribus usitatissimum, quo non modo partes tenebant aut emplastra, & officula ex vulneribus extrahebant, sed virgines quin & viri molliores illius ope pilos, tam è barba quam supercilio evellebant; unde *acuta obliquam* apud Juvenal. Sat. II. v. 94. *volsellam* interpretatur Ptolom. Flavius Conjectaneor. c. 67. vide Mercorum ad Tertullian. de Pallio pag. 768. Græcis vocatur in Philoxeni Glossario *Τριχολεβέιον, μαδισήριον*. harum varias figuras in tyronum gratiam adpingi curavimus.

p. 491. l. 3. *Demitti debet uncus* ] *Morru* fœtus extractionem, uti & instrumenta, quibus veteres medici usi sunt, describit Tertullianus; cujus verba libro de anima cap. XXV. hæc sunt. *At quin & in ipso adhuc utero infans trucidatur, necessaria crudelitate, quum in exitu obliquatus denegat partum, matricida, ni moriturus. Itaque & inter arma medicorum & organum est, quo prius patescere secreta coguntur, tortili temperamento, cum annulo cultrato, quo intus membra caduntur anxio arbitrio, cum hebetè unco, quo totum facinus extrahitur violento puerperio. Est etiam aneum spiculum, quo jugulatio ipsa dirigatur, cæco latrocinio, ἐμβροσφακτεν, appellant, de infanticidii officio utique viventis infantis peremptorium.*

p. 503. l. 24. *Scoptula operta* ] *Lego: lata scapularum ossa* 526, 6. 542, 35. 548, 22. Vid. p. 506, 23. & 171, 5. ubi disertè dicit *ὠμοπλάτας* Græcorum Latine dici *ossa scapularum*. quare ista lectio procul dubio mendosa est, cum nunquam alibi hæc vox reperitur, *Casamb.*



374 VARIOR. AUCTOR. IN &c.

p. 515. l. 1. *Hippocrates memoria tradidit* ] Locus est *L. V. Epidem.* Sed eum librum non esse genuinum Hippocratis foetum existimant eruditi. *Casaub.*

p. 515. l. 5. *Levia ingenia, quia nihil habent, nihil sibi detrahunt* ] Vid. *Plutarchus* lib. πῶς αὖ τις αἰσθητοῦ ἐκαστὸν ἀροκόπτου ἐπ' ἀρετῆς. & *Quintil. Inst. Orat. L. M. C. III.* *Casaub.*

p. 533. l. 24. *Alienatur* ] ita infra p. 539, 7. *quanto facilius & alienari & occupari cancro vulnus potest.* *Casaub.*

p. 545. l. 33. *Scorteo pulvino* ] Pulvinum scorteum vocat *Criticus* ἀροσκέφαλον σκύτιον ἢ δερμάτινον, id est, coriaceum. *Constant.*



IN

# I N D E X

## RERUM ET VERBORUM

- A.**
- A** Bdominis membrana interior rupta, eisque Cheirurgia. 454
- Abortit mulier, si gravida fuerit alvus sine modo fusa. 61
- Abstinencia optima. 114
- Abstinencia duo genera. 92
- Abstinencia tempestiva juvat laborantem. *ibid.*
- Abstinencia nimia inutilis. 23
- Abscessuum curatio. 326. 327
- Abscessuum Cheirurgia. 408
- Abscessus sub lingua curatio. 446
- Accessionem graviozem feb. nox leviior sequitur. 124
- Acia. 292
- Acopa. 276
- A κροχορδών. 334. 335
- A κροδύμιον. *ibid.*
- Actia quam. 120
- Actio naturalis. 6
- Acutus morbus quis III. qui cognoscatur. 113
- Adolescentia acutis morbis patet. 43
- Adolescentiam morbi. 47
- Adstringentia. 32. 36. 107
- Adustionis remedia. 314. 315
- ΑγιλαπⓄ sanatio. 426
- Ager de quo securus erat medicus saepe moritur. 57
- Agrī natura noscenda est. 14. 27.
- Aesculapius quare in deorum numerum receptus est. 1
- Aestas juvenibus inimica. 46
- Aestas periculosa est. 42
- Aestas sicca si Aquilones habuit, & autumno imbres austrique sunt, qui morbi subeunt. 45
- Aestate quo cibo utendum. 33
- Aetas media tutissima. 43
- Affectus mutant corpora. 11
- Alarum abscessus raro secandi. 401
- Alba lenia emplastra. 266
- Alexandrinum emplastrum. 264
- Alimentum maximum in pane. 97. 99
- Αλίπαντα emplastra. 260
- Αλωπεκία. 344
- ΑλφⓄ. 341
- Alumen Melissae. 403
- Alvus mala. 52
- Alvus Pestifera qua. 56
- Alvus fusa mulieri gravida abortum causat. 61
- Alvus nigra periculosa. 76
- Alvus juvenibus cita plerumque in senectute contrahitur. 33
- Alvus fusior in juvene melior. *ibid.*
- Alvum qua adstringunt. 32. 36. 37. 107.
- Alvum moventia. 32. 106
- Ambrosia, antidotum. 275
- Ambulatio quibus convenit, qui-

## INDEX

quibus non.	298	tem perducitur.	72
<i>Anthonius Alexandrinus.</i>	406	<i>Aqua inter cutem sequitur sup-</i>	
<i>Anthonius λιθοτόμος.</i>	481	<i>pression. hæmorrhoid.</i>	26
<i>Ανασομῆν.</i>	243	<i>Aqua minime terribilis.</i>	68
<i>Ανασομωσις.</i>	203	<i>Aquilo quos facit morbos.</i>	44
<i>Ανασομωτικά malagmata.</i>	257	<i>Arabs medicus.</i>	254
<i>Anatome necessaria.</i>	20	<i>Αραχνοειδῆς oculi tunica.</i>	432
<i>Αγκίλας.</i>	257	<i>Aranei ictus curatio.</i>	311
<i>Αγκυλοβλεφάρου curatio.</i>	425	<i>Archagathus.</i>	267
<i>Andreas.</i>	241. 252. 254. 554	<i>Arearum duo genera.</i>	344
<i>Andron.</i>	269. 395	<i>Curatio.</i>	345
<i>Andronium medicamentum.</i>	389	<i>Aridæ medicamentorum mistu-</i>	
<i>Angina. 196. curatio. ibid.</i>		<i>ra.</i>	271
<i>Anginâ subito finitâ ad pulmo-</i>		<i>Aristogenes.</i>	257
<i>nes maliam transit.</i>	64	<i>Ariston.</i>	258
<i>Ani vitia.</i>	399	<i>Ars non statim culpanda.</i>	57
<i>Ani vitiorum Cheirurgia.</i>	493	<i>Αρσενικόν auripigmentum.</i>	243
<i>Ani fissis pastillus.</i>	269	<i>Arteria.</i>	281
<i>Ani fistula.</i>	414	<i>Arteria aspera situs.</i>	182. 183
<i>Ανώδυνα.</i>	278	<i>Arteria incisa non coit.</i>	81
<i>Ανῆραι, compositiones.</i>	385.	<i>Artes excitant artificis inge-</i>	
	388. 389. 390. 395	<i>nium.</i>	13
<i>Αντιάδεις.</i>	445	<i>Articulorum dolores.</i>	237
<i>Antidotarium apparatus.</i>	274	<i>Articulorum vulneratorum cu-</i>	
<i>Αφθαι.</i>	386	<i>ratio.</i>	297
<i>Apollonius Mus.</i>	241	<i>ad Articulos malagma.</i>	257.
<i>Apollonii duo.</i>	406		258. 259
<i>Apollophanes.</i>	252	<i>Asclepiades.</i>	143. 149. 150.
<i>Apoplexia.</i>	177		152. 163. 175. 194. 200.
<i>Απυρον sulphur.</i>	254		204. 230. 241.
<i>Aqua consideratio.</i>	100	<i>Asclepiades invenit frictionem</i>	
<i>Aqua frigida prodest capiti.</i>	35	<i>&amp; gestationem.</i>	87
<i>Aqua frigida distillatione,</i>		<i>Asclepiades nihil præcepit</i>	
<i>gravedine, stomacho labo-</i>		<i>quod ab Hippocrate non est</i>	
<i>rantibus prodest.</i>	36. 39	<i>comprehensum.</i>	88
<i>Aqua frigida sanguini suppri-</i>		<i>Aspidum morsus.</i>	310
<i>mendo.</i>	397	<i>Ασθμα.</i>	198
<i>Aqua inter cutem ex acuto</i>		<i>Athenion.</i>	280
<i>morbo orta, raro ad sanita-</i>		<i>Αδερμάματα.</i>	420
		<i>Ατροφία. 167. Curatio.</i>	168
		<i>Atro-</i>	

RERUM & VERBORUM.

*Atrophia testicularum.* 399

*Attalum emplastrum.* 262

*Auditorii meatus compressionis curatio.* 375

*Auditus gravis curatio.* *ibid.*

*Aurium foramina & sinus.* 500

*Auribus fractis medendi modus.* 523

*Aurium doloris curatio.* 370

*Aurium mali odoris curatio.* 371

*Aurium ulceris sordidi curatio.* 372

*Aurium vermes.* 374

*Aurium foratus curatio.* 375

*Aurium foratus curatio.* 376

*Aurium morbi manuum exigentes.* 377

*Auster quos morbos inducat.* 438

*Austri à prima hieme ad ultimum ver si continuarint, quos generent.* 44

*Αυτόπυρον.* 45

*Autoribus antiquis sua reddenda.* 97

*Autumnus periculosissimus est.* 88

*Autumnus succus Aquilonibus perflatus quos morbos inducat.* 42

*Auxilium quid agat.* 46

*Auxilium anceps melius quam nullum.* 77

*Auxilium vehemens succurrit vehementi malo.* 79

*Auxilium etiam morbis decrepescitibus necessarium est.* 84

*89.*

B.

**B** *Balneum quando conveniat.* 93

*Balneum ingressurus imbecillus homo quid vitare debeat.* 94

*Balneum vulnere parum puro res infestissima.* 298

*Balneum obest gangrana.* 304

*Barbarum emplastrum.* 260

*Βασιλικόν emplastrum.* 260

*Bacula valida.* 554

*Boëthius.* 270

*Brachii ossa.* 504

*Brachii perfracti medicina.* 531.

*536*

*Βρογχοκήλη ejusque Cheirurgia.* 447

*Βαζωνοκήλη. 459. Curatio.* 471

C.

**K** *Αχέζια. 167. Curatio.* 169

*Κακόνδεσ. 317. 318*

*Calceamenta humiliora talo luxato.* 556

*Calcis os.* 507

*Calculosi qui dignoscantur.* 61

*Calculorum diagnostica signa.* 480

*Calculi ex vesica sectio.* 475

*ex urethra.* 474

*Calculi majoris in vesica fissio.* 481

*Calculorum in feminis curatio.* *ibid.*

*Calculo expellendo pastillus.* 269

*Calculo evulso qua facienda.* 482

*00 Calc-*

I N D E X

<i>Calefacientia.</i>	105. 110	<i>Carcinomatis leniendis mala-</i>	
<i>Calli curatio.</i>	542	<i>gma.</i>	256
<i>ad Callum in articulis mala-</i>		<i>Cardiacus morbus</i>	156. <i>ejus</i>
<i>gma.</i>	259	<i>curatio.</i>	157
<i>Calor adjuvat qua frigus in-</i>		<i>Caries ossium curatio.</i>	508
<i>festat.</i>	39	<i>Cavo corrupta in pus vertitur</i>	
<i>Calor quid efficiat.</i>	40. 44		325
<i>Calvaria ossa &amp; sutura.</i>	498	<i>Carni putri continenda.</i>	272
<i>Calvaria fracta medela.</i>	514	<i>Carni coercenda emplastrum.</i>	
<i>Cancer quò oriatur.</i>	300. <i>Ejus</i>		265
<i>signa.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Carnem alentia.</i>	247
<i>Cancro oris curatio.</i>	390	<i>Καρπύρις nervi.</i>	502
<i>Cancro in cole curatio.</i>	396	<i>Carni supercrescenti exedenda.</i>	
<i>Cancro exfello è vesica calculo</i>			271. 273
<i>supervenientis signa &amp; cu-</i>		<i>Cartilagine in ossium omnium</i>	
<i>ratio.</i>	485	<i>extremis.</i>	505
<i>Canini dentes.</i>	501	<i>Cartilaginis navium fracta cu-</i>	
<i>Cantharidum assumptarum cu-</i>		<i>ratio.</i>	522. <i>aurium.</i> 523
<i>ratio.</i>	313	<i>Cassius quò febrem sanarit.</i>	18
<i>Capillorum profusivum.</i>	342	<i>Cassius.</i>	223. 281
<i>Caput luxatum immedicabile.</i>		<i>Cataplasmata calefacientia,</i>	
	546	<i>iis, quibus calculi è vesica</i>	
<i>Capitis subitus dolor.</i>	72	<i>exfelli, noxia.</i>	483
<i>Capitis dolores ex vento quò</i>		<i>Catapotiorem recensio.</i>	278
<i>finiantur.</i>	70	<i>Causa veri qua dicitur.</i>	16
<i>Capitis doloris curatio.</i>	188	<i>Causa abdita qua.</i>	4
<i>Capitis dolor ex febre levatur.</i>		<i>Causæ evidentes qua.</i>	5
	138	<i>Κεφαλαία.</i>	186. <i>Ejus causa</i>
<i>Capitis dolores frictio leuat.</i>	89	<i>&amp; curatio.</i>	187
<i>Capitis tubercula.</i>	420	<i>Κεφαλαία.</i>	261
<i>Capiti fracto emplastrum.</i>	261.	<i>Cerastii illius curatio.</i>	311. 312
	263	<i>Κερατῶσίδης oculi tunica.</i>	432
<i>Capiti prodest aqua frigida.</i>		<i>Κεραία.</i>	504
	35. 36	<i>Cerebri ejusve membrana per-</i>	
<i>Capite infirmo laboranti quid</i>		<i>cussa signa.</i>	286
<i>agendum.</i>	34. 35	<i>Κηρίον ulcus.</i>	333. <i>Ejus Æna</i>
<i>Carbunculi curatio.</i>	315. 316	<i>species. ibid. Curatio. ibid.</i>	
<i>Carbunculi in cole nati curatio.</i>		<i>Cervix inversa mortem indi-</i>	
	398	<i>cat.</i>	55
<i>Καρνιῶδῆ tubera.</i>	255	<i>Cervicis morbi.</i>	193
<i>Carcinoma ubi proveniat.</i>	317	<i>Cerussa opota curatio.</i>	314
<i>curatio.</i>	317		Xa-



R E R U M & V E R B O R U M.

Καλαζίων curatio.	422	Et quibus.	85. 86
Κάλακανθον.	242	Κολικακός morbus.	220. Ca-
Κίναςμός.	489. 516	ratio.	ibid.
Chiragra quibus indicatur.	59	Caliam pessimum quod agriam	
Chiragra qua solvitur.	68	fecit.	43
Chironium ulcus quale.	322	Cogitatio infirmo capite labo-	
Chirurgia vetustissima medici-		ranti tuta non est.	35
na pars.	2	Κολικός morbus.	221
Cheirurgia praestantia ac origo.		Colicus dolor quibus sedatur.	
	405		37
Cheirurgi officia.	406	Κολικόν Cassii.	223. 224. 281
Chersydri ictus curatio.	312	Colis inflammati tumor.	393.
Choiacou emplastrum.	260	Ulcera.	394. Cancer.
Χοινίχιον, modiolus.	510	Phagedaena.	397. Carbu-
Cholera. 217. Curatio.	218	culius.	398
Χόρδα. ☉.	221	Collisum corpus qui tractetur.	
Χοριοειδής oculi tunica.	432		254
Chrysippus.	3. 258	Collyrium Acharistum.	352.
Cibi concoctio qui fiat.	6	In Ani fistulis.	415. An-
Cibi varii non facilius coquuntur.	131	draea.	359. Asclepias.
Cibus unde debeat incipere.	23	Βασιλικόν.	365. Casa-
Cibus humidus fatigatis convenit.	26	rianum.	364. Ctenopite.
Cibus aegro quando dandus.		362. Cleonis.	351. Cy-
114. Febricitanti.	119	thium.	352. Διὰ κίρκου
ad. 27. 131. Humidus aptissimus.	130. Ex tenuissima materia.	τ. 360. Διὰ κρόκου.	366.
	131	Διὰ λεβάνου.	357. Euel-
Ciborum varia proprietates.	100	pidis.	352. 360. 361. 362.
Sicatrix quomodo indicatur vulneri.	300. 306	365. Hermionis.	362.
Cicutam si quis bibit, quomodo curati debeat.	313	Hieratis.	364. Μεμυγμένον.
Κίρσοκήλη.	458	360. Nilei.	355.
Clavi oclorum.	431	Philetis.	357. Philonis.
Clavus in pedibus nascitur.	335	351. Phynon.	361. Pyxi-
Curatio.	ibid.	num.	362. Rhinion.
Clephantus.	143	365. Smilion.	360. Spharion.
Clysteres quando conveniant		361. Tephron.	352.
		Theodoti.	ibid. Trygodes.
			ibid.
		Colubra tuto estur.	309
		Comitialis morbus.	172. Ejus
		medela.	173. seqq.
		Comitialis morbus quando	
			sol-

I N D E X

<i>Solvitur.</i>	68	<i>Corpus obesum hebes.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Communia attendi voluit The- mison eaque tria.</i>	15. 17	<i>Corporis semper aliqua imbecil- la pars est.</i>	28
<i>Communia &amp; propria observan- da.</i>	17. 18. 19	<i>Corpora affectibus mutantur.</i>	11
<i>Concoctio quæ fiat non sciunt eruditi, sed conjectura proje- quuntur.</i>	13	<i>Corvus, ferramentum scroto incidendo.</i>	463
<i>Concoctio tarda quæ adjuvetur.</i>	38	<i>Costarum enumeratio.</i>	503
<i>Concoctio omnibus vitiis occur- rit.</i>	39	<i>Costarum fistula.</i>	412
<i>Concubitus rarus corpus exci- tat, frequens solvit.</i>	21.	<i>Costis fractis opitulandi ratio.</i>	528
<i>Quis utilis. ibid. Quando convenit.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Coxarum os.</i>	506
<i>Conditæ inutilia.</i>	23	<i>Coxarum dolor. 235. Pro- gnosis. 75. Curatio.</i>	236
<i>Condylomatis ani curatio.</i>	400. 494	<i>Crato.</i>	394
<i>Consuetudini quod contrariatur noxium est.</i>	27	<i>Cratonis compositio ad aurium malum odorem.</i>	373
<i>Contentio post cibum inutilis.</i>	36	<i>Κρημασῆρες, nervi.</i>	455
<i>Cor musculosum est.</i>	183	<i>Creta figularis.</i>	32
<i>Cordis percussæ signa.</i>	285	<i>Crimen professoris non est artis.</i>	57
<i>Corporis natura noscenda.</i>	27. 28	<i>Κριθῆς curatio.</i>	422
<i>Corpus quænam calefaciant.</i>	31	<i>Cruis ossa.</i>	506
<i>Corpus quænam refrigerent. ib.</i>		<i>Cruis fracturæ sanatio. 531.</i>	537
<i>Corpus quænam humident, aut siccant.</i>	31. 32	<i>Κρυσαλλοειδῆς oculi humor.</i>	432
<i>Corpus exedentia. 245. Adu- rentia.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Cruditatem quænam indicent.</i>	58
<i>Corpus quod impleat.</i>	28	<i>Ctesiphon.</i>	258
<i>Corpus quid extenuet. ibid.</i>		<i>Cubiti ossa.</i>	505
<i>Corpus quæ commode exerçant.</i>	23	<i>Cubiti fracti curatio.</i>	537
<i>Corpus integrum quo denotetur.</i>	22	<i>Cubiti luxati cheirurgia.</i>	550
<i>Corpus quadratum optimum.</i>	43	<i>Cucurbitula aquea &amp; cornea.</i>	82. Earum usus præci- pius. 83. In morbis longis & acutis. <i>ibid.</i>
<i>Corpus gracile infirmum. ibid.</i>		<i>Curtorum in auribus, labiis, ac naribus cheirurgia.</i>	439
		<i>Cutem purgantia.</i>	248
		<i>Κυνικός σπασμός.</i>	189
			<i>Ejus</i>

R E R U M & V E R B O R U M.

<i>Ejus curatio.</i>	190	<i>Digerentia malagmata.</i>	253
Κορυζα.	191	<i>Digitorum ossa.</i>	505
D.		<i>Digitorum ulcera.</i>	403
Δ α ρ τ ο .	456	<i>Digitorum coherentium &amp; cur-</i>	
<i>Dejectio quando conveniat.</i>	31	<i>vatorum curatio.</i>	497
<i>Dejectio quæ bona.</i>	68. 69	<i>Digitorum fractorum curatio.</i>	531. 537
<i>Dejectio periculosa phthificis.</i>	71	<i>Digitorum luxatorum cheirur-</i>	
<i>Dejectio quæ aliis.</i>	73	<i>gia.</i>	552. 557
<i>Dejectio in omnibus morbis mo-</i>		<i>Diocles Carystius. 3.</i>	175. 221.
<i>lita.</i>	84		418. 554
<i>Dejectio quibus medicamentis.</i>		<i>Diogenes.</i>	265
	ibid.	<i>Dionysius.</i>	402
<i>Dejectio infirmat hominem.</i>	ibid.	<i>Dipsadis iclus curatio.</i>	311
<i>Dejectio lippienti prodest.</i>	69	<i>Discutientia.</i>	246
<i>Dejectio supprimitur vomitu.</i>		<i>Distentio nervorum quando ti-</i>	
	ibid.	<i>menda.</i>	62. 64
<i>Dejectionem subitam quid in-</i>		<i>Diuretica conveniunt morsis a</i>	
<i>dicet.</i>	59	<i>serpentibus.</i>	310
<i>Delirium cui prodest.</i>	69	<i>Dolor deorsum tendens sanabi-</i>	
<i>Denarii pondus.</i>	249	<i>lior.</i>	69
<i>Dentium ordo.</i>	501	<i>Dolorem qui non sentiunt iis</i>	
<i>Dentium doloris varia remedia.</i>		<i>mens laborat.</i>	62
	381	<i>ad dolorem omnem malagma.</i>	
<i>Dentium vitiatorum cheirurgia.</i>			257. 258
	443	<i>Dolores quinam mortem indi-</i>	
<i>Denti exeso remedium.</i>	382	<i>cent.</i>	55
<i>Desidia &amp; luxuria adverse va-</i>		<i>Doloribus leniendis catapotia.</i>	
<i>letudinis cause.</i>	2		278
<i>Desperatus non curandus.</i>	283	<i>Durities testicularum.</i>	398
<i>Destillatio. 190. ejus curatio.</i>		<i>Δύσπνοια.</i>	198
	191. 192	<i>Δυσεντερια. 224. Curatio.</i>	
<i>Destillationes quæ vitentur.</i>	36		ibid.
<i>Dexius.</i>	259	E.	
<i>Διάσπρωσις.</i>	203	<b>E</b> <i>Brius qui obmutuit, qui</i>	
<i>Διὰ σαφνίδων emplastrum.</i>		<i>intereat &amp; servetur.</i>	55
	263	<i>Εκτροπίς curatio.</i>	430
<i>Dieta hiemalis, verna, æsti-</i>		<i>Ελαιώδες pus. 288. 289.</i>	
<i>va, &amp; autumnalis.</i>	33. 34		290
<i>Διάφραγμα.</i>	183	<i>Ελαιώδες scopum.</i>	277
<i>Dies Critici.</i>	121	<i>Ελεφαντίασις.</i>	176
<i>Dies sereni saluberrimi.</i>	42		

I N D E X

<b>Emphasticum emplastrum.</b>	266	<b>Exercitatio cibum antecedere</b>	
<b>Ελευθροειδής τυνία.</b>	455	<b>debet.</b>	23
<b>Emollientia.</b>	110	<b>Exercitatio implet corpus.</b>	28
<b>Empirici quinam.</b>	3	<b>Exercitationis finis sudor aut</b>	
<b>Empirici quid statuunt.</b>	3	<b>lassitudo.</b>	23
<b>Emplastrorum differentia.</b>	249	<b>Experientia plurimum ad me-</b>	
<b>Emplastrorum formulae.</b>	260	<b>delam confert.</b>	13
<b>Emplastra, quae catuaria cau-</b>		<b>Experimenta sunt necessaria.</b>	
<b>sa componuntur.</b>	517	<b>§. initia medicinae.</b>	9
<b>Emplastrum Barbarum.</b>	260	<b>Experiri quomodo oporteat.</b>	112
<b>Εμπροσδόν. 143. cura-</b>		<b>ad Extrahendam materiam</b>	
<b>tio.</b>	194	<b>malagma.</b>	250
<b>Εναίμα Emplastrum.</b>	260	<b>Exulceratio stomachi.</b>	205
<b>Εγκανθίδος medicatio.</b>	425	<b>Exusto in sole quid agendum.</b>	27
<b>Εγχεύματα.</b>	277		
<b>Ενεαφάρμακον. emplastrum.</b>		<b>F.</b>	
	272. 484	<b>Faber quidam machina-</b>	
<b>Ευτεροκλήη. 456. curatio.</b>	464	<b>mentorum ad extenden-</b>	
<b>Εφελίς. 345. ejus curatio.</b>	346	<b>dum femur luxatum reper-</b>	
<b>Ephesium emplastrum.</b>	266	<b>tor.</b>	554
<b>Επιγυκτίς.</b>	336	<b>Faciei contra malagma.</b>	256
<b>Epilepsia.</b>	172	<b>Fames.</b>	24
<b>Επιπλοκήη. 456. curatio.</b>		<b>Famem qui ferant facilius, qui</b>	
	467	<b>difficiliter.</b>	19
<b>Epirotas Philippus.</b>	161	<b>Fascia qua &amp; qualis requira-</b>	
<b>Επισπαστικόν malagma.</b>	250	<b>tur. 294. estate, hieme. ibid.</b>	
<b>Επισπαστικά emplastra.</b>	263	<b>Fascia sex ad ossa fracta.</b>	533
<b>Erasistratus. 204. 219. 222.</b>		<b>Fatigatio animi inutilis post</b>	
	240. 241. 394	<b>cibum.</b>	36
<b>Ερπης.</b>	319	<b>Fatigatus quid agendum.</b>	25
<b>Eruditi imbecilles.</b>	21		26
<b>Erysipelas periculum adfert si</b>		<b>Fatigatus inutilis frigida potio.</b>	
<b>circa cervicem aut caput</b>			26
<b>constitit. 301. quomodo cu-</b>		<b>Fatigatus ex ambulatione quid</b>	
<b>randum.</b>	302	<b>agendum.</b>	27
<b>Euelpistus Phlegetis F.</b>	406	<b>Faucium morbi.</b>	196
<b>Evocantia &amp; educantia.</b>	247	<b>Faucium exulceratio.</b>	199
<b>Ευθυκλέης.</b>	257	<b>ad Favum malagma.</b>	255
<b>Εξανθήματα.</b>	336	<b>Febris quid secundum Eras-</b>	
<b>Excitare caput, pro attollere.</b>		<b>stratum.</b>	16
	517	<b>Februm genera.</b>	115
			Fe-

R E R U M & V E R B O R U M.

<i>Febrim quartana simpliciores sunt.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Fœtus imbecillitas qui cognoscatur.</i>	62
<i>Tertianarum duo genera.</i>	116	<i>Fœtus sanitas.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Febrim quotidianarum varia genera.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Fœtus mortui eductio.</i>	489
<i>Febris presentis signa pulsus &amp; calor.</i>	129. <i>Alia.</i>	<i>Fomenta calida qua sint.</i>	95
	130	<i>Fortuna non præstat arte in morbo.</i>	111
<i>Febriculam instantem quid indicet.</i>	59	<i>Fortuna in sanandis morbis potentia.</i>	405
<i>Febris nulla inordinata.</i>	117	<i>Fricatio convenit partibus longe à vulneribus disitis.</i>	298
<i>Febris à cubito in posteriora delapso mota.</i>	550	<i>Fricationis utilitas.</i>	194
<i>Febris ardens horrore sanatur.</i>	70. 71	<i>Fricationem aliis auxiliis prætulit Asclepiades.</i>	87
<i>Febris subito finita revertitur.</i>	60	<i>Fricatio corpus durat, mollit, minuit, implet.</i>	88. <i>Longa obest.</i>
<i>Febris acuta periculosa.</i>	52		89. <i>Quando adhibenda.</i>
<i>Febres male.</i>	51. 52		89. <i>ejus numerus præscribi non potest.</i>
<i>Febris qua mala vulnere.</i>	296		90
<i>Febris pestilentis curatio.</i>	133	<i>Frigus quid in febre.</i>	116
	134	<i>Frigus quibus inimicum.</i>	39
<i>Febris ardentis.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Quid efficiat.</i>	39. 40
<i>Febris sæpe prodest.</i>	70	<i>Frigoris in febribus curatio.</i>	140
<i>Febres longa abscessus, &amp; articularum dolores indicant.</i>	64	<i>Frontis fractura cicatricem difficulter recipiens.</i>	521
<i>Feminarum naturalia clausa qui aperiantur.</i>	488. 489	<i>Fungi in ano vel vulva curatio.</i>	403
<i>Femoris luxati cheirurgia.</i>	553		314
<i>Femorum fracturam curatio.</i>	531. 537	<i>Fungos inutiles si quis assumserit.</i>	314
<i>Feminam ossa.</i>	506	<i>Furunculus 324. ejus curatio.</i>	324. 325
<i>Fibulas adolescentibus applicandi ratio.</i>	473	<i>Furoris signa.</i>	63. 64
<i>Firmus pro sano.</i>	21		G.
<i>Fissularum generum plura.</i>	328.	<b>G</b> <i>Raca litera γ ferramenti ad diducendam carnem comparati modulus.</i>	417
<i>Quomodo dignoscuntur.</i>	329.	<i>Gallinaceus pullus divisus imponitur morsui serpentium.</i>	310
<i>330. Simplicium curatio.</i>	330.		420
<i>callosarum.</i>	331. <i>duplicium seu multiplicium.</i>		420
<i>Fistularum cheirurgia.</i>	412	<i>Γέγγυα, eorumque cheirurgia.</i>	420
<i>Flatus excitantia.</i>	104		420
<i>Feminarum calculi.</i>	481		420



I N D E X

<i>Ἐγγυπαίνα</i> . 301. In quibus partibus fit, & difficile sanatur. 301. Ejus curatio. 303. corrupti corporis est. 304	<i>Hæmorrhoidum suppressionem qua sequantur.</i> 62
<i>Gangrana sectio.</i> 497	<i>Hæmorrhoidum cheirurgia.</i> 494
<i>Gargarizationes.</i> 274	<i>Hæmi retusi.</i> 436
<i>Gemini dentes.</i> 501	<i>Hæsus lana mollis.</i> 483
<i>Geni luxati cheirurgia.</i> 555	<i>Hæsus lana sulphurata.</i> 210
<i>Genuum dolor.</i> 237	<i>Hecatæus.</i> 264
<i>Genua contracta mortem indicant.</i> 54	<i>Hedera bacca dentem findit.</i> 383
<i>Gestatio in lethargo prod. st.</i> 159	<i>Hepatis morbi.</i> 213
<i>Gestationem invenit Asclepiades.</i> 87. Ea quibus convenit morbis. 90. 91. Genera ejus varia. 91	<i>Hepatis vulnerati signa.</i> 286
<i>Gingivarum marcescentium curatio.</i> 443	<i>Ἡπατικὸς morbus.</i> 213. Curatio. 214
<i>Gingivarum tubercula.</i> 387	<i>Heraclides Tarentinus.</i> 145. 280. 426. 554
<i>Ulcera.</i> 388	<i>Heras.</i> 273
<i>Glandis nude contactio.</i> 471	<i>Hernia.</i> 456. Curatio. 460
<i>Glandis contacte apertio.</i> 472	<i>Heron.</i> 448
<i>Glandium plumbearum extractio.</i> 418	<i>Heronæ duo.</i> 406
<i>Glandula in cervicibus.</i> 518	<i>Herophilus.</i> 3. 241. 432
<i>Gorgias.</i> 406. 448	<i>Hiems sicca si septentrionales ventos habeat, ver pluvias exhibeat qui morbi subeant.</i> 45
<i>Græcorum in nominandis absque circuitu partibus obscænis impudentia.</i> 392	<i>Hiems salubris est.</i> 42
<i>Γραφίσκων Διοκλέης.</i> 418	<i>Hiems senibus inimica.</i> 46
<i>Gravedo.</i> 190. Ejus curatio. 191. 192. 193	<i>Hieme quid &amp; quomodo esse conveniat.</i> 33
<i>Gravedines quæ vitentur.</i> 36	<i>Hippocrates.</i> 227. 327. 405. 547. 549. 554. 557
	<i>Hippocrates omnia præ sagivit.</i> 41
	<i>Hippocrates à futuris deceptus.</i> 515
	<i>Hirundinis pullus angina remedium.</i> 197
H.	<i>Ἡμωσλάται.</i> 503
<b>H</b> æmorrhoidis iclus curatio. 311	<i>Horror quid.</i> 116
<i>Ἡμωρροΐδης earumque curatio.</i> 401	<i>Horror à biliosis.</i> 141
	<i>Horroris in febr. curatio.</i> <i>ibid.</i>
	<i>Hæ-</i>

R E R U M & V E R B O R U M .

<i>Humeri ossa.</i>	504	271. <i>Catapodium.</i>	281
<i>Humerorum dolores qui tollantur.</i>	69	<i>Infirmetas omnis morbis obnoxia.</i>	31
<i>Humeri luxati Cheirurgia.</i>	548	<i>Inflammationis nota.</i>	139
<i>Humeri fracti curatio.</i>	531.	<i>Inflammatiō stomachi.</i>	205
	535	<i>Inflammatiō testiculorum.</i>	398
<i>Υαλοειδής.</i>	432	<i>Inflammatiō uvæ.</i>	389
<i>Υδροκέφαλον.</i>	187. 189	<i>ad Inflammationes vulvæ pef-</i>	
<i>Υδροκήλη.</i>	458. <i>Curatio.</i>	<i>sus.</i>	271
<i>Hydrophobiæ curatio.</i>	308	<i>Inflatio stomachi.</i>	205
<i>Hydrops.</i>	160. <i>Ejus species &amp; curatio.</i>	<i>Inguinum abscessus raro secan-</i>	
	160. 161	<i>di.</i>	408
<i>Hydropicis quomodo aqua emittatur.</i>	451	<i>Insania quando expectanda.</i>	62. 63
<i>Hydrops quartanæ supervenit.</i>	161	<i>Intemperantia quæ tutior.</i>	23
<i>Hysocyami poti curatio.</i>	314	<i>Intestinum jejunum.</i>	184
<i>Υπόχυσις.</i>	367	<i>Intestinum cæcum.</i>	ibid.
<i>Hymen imperforatum.</i>	488	<i>Intestinum tenuius.</i>	ibid.
I.		<i>Intestinorum morbi.</i>	217
<i>Ιχωρ saniei species.</i>	288	<i>Intestini plenioris morbus.</i>	223
<i>Malus.</i>	289	<i>Intestini tenuioris morbus.</i>	221
<i>Icterus.</i>	175	<i>Intestini tenuioris morbi mala signa.</i>	74
<i>Ictericis jecur durum fieri malum.</i>	74	<i>Intestinorum levitas.</i>	226
<i>Jecur.</i>	183	<i>Intestinorum levitas quæ facile depellatur.</i>	69
<i>ad Jecur dolens malagma.</i>	251	<i>Intestinorum levitas quæ periculosa.</i>	74
<i>ad Jecur sanandum catapotia.</i>	280	<i>Intestinorum vulneratorum nota.</i>	287
<i>Jecinoris vomica.</i>	67	<i>Intestinorum è ventre vulnerato prolabentium Cheirurgia.</i>	452
<i>Ignavia corpus hebetat.</i>	20	<i>Follas.</i>	277
<i>ad Ignem sacrum.</i>	274. 277	<i>Irenæus.</i>	341
<i>Είδος.</i>	221	<i>Ψυγale os.</i>	500
<i>Imbecillis quæ observanda.</i>	22	<i>Judeus Medicus.</i>	263. 273
<i>Imbres quos morbos causent.</i>	45	<i>Fuguli fracti sanatio.</i>	526
<i>Impetiginis quatuor species.</i>	339	<i>Juvenes hieme optime valent.</i>	46
<i>Inediam qui facile ferant.</i>	32		
<i>Infanti mortuo ejiciendo pessus.</i>			

I N D E X

L.		nibus apta est.	32
<b>Λ</b> Rima in cranio facienda		Lectio clara nocet capite labo-	
modulus.	518	ranti.	35
Labor firmat corpus.	20	Lectio promovet concuſſionem.	38
Labor vitandus ſi inedia fru-			38
tura eſt.	24	Λμνίον⊙.	489
Laborem qui facile ferant.		Lenia quenam.	102
	25	Lenia emplaſtra.	267
Laboris mutatio leuat laſſitudi-		Lenticularum ſpecies.	345
nem.	26	Λστis.	513
Labrorum curtorum Cheirurgia.		Lethargus. 158. Curatio.	159
	439	Λσυχά emplaſtra.	266
Labrorum fiſſorum curatio.		Λσυχν.	341
	447	Leucophlegmatia	curatio.
Lac conuenit phthiſicis.	170.		164
Veneno eſt in capitis dolo-		Lien.	183
ribus, & acutis febris.		Lienes magni quos cauſent	
ibid.		morbos.	62
Lac in mammis, quibus men-		Lienosis mala tormina.	74
ſes deficient.	76	ad Lienem malagma.	251
Lac è mammis profluens ſu-		Lienis morb. 215. Curatio.	
tum imbecillum notat.	62		ibid.
Leuantia.	247	Lienis icſti ſigna.	286
Laganum iis, quibus maxilla		Lingua ulcera.	387
perfracta eſt, comedendum.	526	Lingua reſolutio.	190
Λαγοφθαλμῶν ſanatio.	430	Lingua cum ſubjecta parte	
Lapillus, pulex, & ſ. quomodo		iuncta Cheirurgia.	446
ex aure extrahantur.	378	Λιπαρά emplaſtra.	267
Laſſitudinem leuat laboris mu-		Lippitudo arida.	364
tatio.	26	Lippitudo quibus indicetur.	
Lateralium dolores.	209		60
Lateralis dolor quando exſpe-		Lippitudinis leuioris nota.	
ctandus. 62. Finitur. 67			347
Lateralis doloribus catapotium.		Lippientis diata.	349
	280	Λιποτόμῶν⊙.	481
ad Lateralium dolorem malagma.		Livori faciei malagma.	256
	252	Longus morbus quis.	111.
Latinorum è ſcedioribus verbis		Aceto par. 112.	Quæ
abſtinentia.	392	cognoſcatnr.	113
Lavatio calida pueri & ſe-		Lucubratio quando conuenit.	
			22
			Lavr-

R E R U M & V E R B O R U M.

<i>Lumbrici lati, teretes.</i>	227.	<i>Medicina ab experimentis de-</i>
<i>Curatio.</i>	<i>ibid.</i>	<i>ducta.</i>
<i>Lunata plaga.</i>	524	<i>Medicina debet esse rationalis.</i>
<i>Lycium.</i>	524. 529	
<i>Lysias.</i>	251	<i>Medicina genera differunt pro</i>
		<i>natura loci.</i>
<b>M.</b>		
<b>M</b> <i>Achaon Aesculapii fi-</i>		<i>Medicina perpetua praecepta vix</i>
<i>lius. I. Vulneribus</i>		<i>habet.</i>
<i>auxilium attulit.</i>	2	<i>Medicina prior inventa, dein</i>
<i>Macor insuetus malum deno-</i>		<i>ratio quaesita.</i>
<i>tat.</i>	48	<i>Medicina nihil proficit repu-</i>
<i>Malae immobiles.</i>	501	<i>gnante natura.</i>
<i>Malagmatum differentia.</i>	249	<i>Medicina est ars conjecturalis.</i>
<i>Malagmatum varia formula.</i>		
	250	<i>Medicina quae fides est.</i>
<i>Manuum ossa.</i>	505	<i>Medici primi Philosophi.</i>
<i>Manuum cum pedibus simili-</i>		<i>Medicus expertus optimus.</i>
<i>tudo.</i>	507	<i>Medicus rationalis.</i>
<i>Manuum dolores.</i>	237	<i>Medicus Empiricus.</i>
<i>Manus luxata Cheirurgia.</i>		<i>Medici officinum juxta Ascle-</i>
	551	<i>piadem.</i>
<i>Materia imbecillissima qua-</i>		<i>Medicus non dies sed febris ac-</i>
<i>nam.</i>	97	<i>cessiones numerare debet.</i>
<i>Materia media.</i>	98	
<i>Materia valentissima.</i>	98. 99.	<i>Medicus qui primum exploravit.</i>
	100	
<i>Maxilla partes.</i>	501	<i>Medicus quo loco sedebit.</i>
<i>Maxillares dentes.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Medicus amicus utilior extra-</i>
<i>Maxilla fracta Cheirurgia.</i>		<i>neo.</i>
	525	<i>Medico parum proficiente quan-</i>
<i>Maxilla luxata Cheirur.</i>	545	<i>do ignoscendum.</i>
<i>Medicina sanitatem promittit.</i>		<i>Medicamenta à diis petita.</i>
	1	<i>Medicamenta non omnibus</i>
<i>Medicina ubique est.</i>	<i>ibid.</i>	<i>profunt.</i>
<i>Medicina apud Gracos magis</i>		<i>Medicamentorum usus ab As-</i>
<i>exculta.</i>	<i>ibid.</i>	<i>clepiade sublatus.</i>
<i>Medicina scientia sapientia</i>		<i>Medulla in spina discisse signa.</i>
<i>pars. 2. Quando in III.</i>	111.	
<i>partes divisa.</i>	3	
<i>Medicinam mutavit Ascle-</i>		<i>Medus.</i>
<i>piades.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Meges. 406. 408. 426. 448.</i>
		479. 555
		Mé-

I N D E X

<i>Μέλας.</i>	341	<i>Morborum initia famem sitim-</i>	
<i>Μελίχροα saniei species.</i>	288	<i>que desiderant.</i>	92
<i>Mala.</i>	289	<i>Morbis qui acutus, qui lan-</i>	
<i>Μελιχροίδες. 255. Curatio.</i>	420	<i>gus. III. Quomodo di-</i>	
<i>Membrana calvariam cin-</i>		<i>gnoscitur.</i>	113
<i>gens scalpro non laceranda.</i>	516	<i>Morborum acutorum nota fal-</i>	
<i>Membrane cerebrum succin-</i>		<i>laces sunt.</i>	57
<i>gentis inflammatio quomodo</i>		<i>Morbis Comitialis post an-</i>	
<i>tractanda.</i>	520	<i>num. 25. ortus difficile fi-</i>	
<i>Membrum istum certa ratione</i>		<i>nitur.</i>	73
<i>collocari debet.</i>	298	<i>Morbis intestini tenuioris ex</i>	
<i>Membri resoluti prognosis.</i>	75	<i>urinae difficultate intra 7.</i>	
<i>Menemachus.</i>	382	<i>diem occidit.</i>	74
<i>Μηνιγγοφύλαξ.</i>	512	<i>Mortis instantis signa. 54. 55</i>	
<i>Menophili compositio ad au-</i>		<i>Mortis certa signa negavit</i>	
<i>riam malum odorem.</i>	373	<i>Democritus.</i>	57
<i>Menstrua suppressa capitis do-</i>		<i>Morsus feræ habent virus</i>	
<i>lores acerbos indicant.</i>	59	<i>quoddam.</i>	307
<i>Mentum, maxilla ima pars.</i>		<i>ad Morsus emplastra.</i>	265
	501	<i>Morsus canis rabidi curatio.</i>	
<i>Methodici.</i>	15		307
<i>Metrodorus.</i>	161	<i>Morsus serpentium quomodo cu-</i>	
<i>Micon.</i>	254. 257	<i>rentur.</i>	309
<i>Miscendi ratio.</i>	248	<i>Morsus Aspidis curatio.</i>	310
<i>Mithridates.</i>	276	<i>Moschus.</i>	253
<i>Modioli descriptio.</i>	510	<i>Motus in dolore pestifer.</i>	545
<i>Mollientia.</i>	247	<i>Mulier gravida abortit, si</i>	
<i>Mollientia malagmata.</i>	253	<i>mamma emacnere.</i>	76
<i>Morbi ad deor. iram relati. 2</i>		<i>Mulier gravida acuto morbo</i>	
<i>Morbi novi incidunt. 5. 13</i>		<i>facile consumitur.</i>	55
<i>Morbi remediis curantur. 10. 11</i>		<i>Mulier ex parte vehementibus</i>	
<i>Morborem IV. genera. 111</i>		<i>doloribus pressa in periculo</i>	
<i>Morborum cognitio necessaria.</i>		<i>mortis est.</i>	74
	4. 5.	<i>Musculus lesus pracidendus.</i>	
<i>Morbi incrementis signa. 113</i>			291
<i>Morbi vernaes.</i>	43	<i>Mutatio subitanea noxia. 25</i>	
<i>Morbi æstivi.</i>	ibid.	<i>Μυδρίασις. 368. Ejus cura-</i>	
<i>Morbi autumnales.</i>	44	<i>tio.</i>	ibid.
<i>Morbi hiemales.</i>	45	<i>Μυρμήκιον.</i>	335
		<i>Μυροβόλαγοι.</i>	216. 251

Na-



RERUM & VERBORUM.

N.		Numenius.	259. 271
<b>N</b>	<i>Arium ossa &amp; foramina.</i>	Nymphodorus.	554
	500		
	<i>Nares acuta mortem indicant.</i>		
	54		
	<i>Narium hemorrhagia quid indicet.</i>		
	62		
	<i>Nares exulceratae aqua calida fovenda.</i>		
	378		
	<i>Narium curatiam cheirurgia.</i>		
	439		
	<i>Naso fracto medendi ratio.</i>		
	521		
	<i>Natura agri noscenda.</i>		
	14		
	<i>Natura contemplatio non facit medicum.</i>		
	13		
	<i>Nauseanti ex navigatione quid agendum.</i>		
	27		
	<i>Nervi καρόται.</i>		
	502		
	<i>Nervos praecisos debilitas partis sequitur.</i>		
	297		
	<i>Nervorum dissentio quibus indicetur.</i>		
	58		
	<i>Nervorum dolor. 179. Ejus curatio.</i>		
	180		
	<i>Nervorum tremor. 180. Ejus curatio.</i>		
	ibid.		
	<i>ad Nervos malagma.</i>		
	257		
	<i>Nervis utilia acopa. 276. 277.</i>		
	<i>Nervorum resolutioni aetas tenera prodest.</i>		
	69		
	<i>Nigritiei ossium curatio.</i>		
	509		
	<i>Nigrum Diogenis emplastrum.</i>		
	265		
	<i>Nileus.</i>		
	253. 554		
	<i>Νόδας costa.</i>		
	503		
	<i>Notae in acutis morbis fallaces sunt.</i>		
	57		
	<i>Notitia subtrahere.</i>		
	358		
	<i>Noxarum corporis genera.</i>		
	282		
	<i>Nuces Graecae. 200. 201. 217.</i>		
	276		
		O.	
		<b>O</b>	
		<i>Besi quo morbo intereunt.</i>	
			47
		<i>Ὀβολός.</i>	249
		<i>Obscænarum partium vitia.</i>	
			392
		<i>Ocium.</i>	25
		<i>Oculi natura.</i>	432
		<i>Oculorum foramina.</i>	500
		<i>Oculi variis casibus patent.</i>	
			346
		<i>Oculorum vitia.</i>	421
		<i>Oculi sponte interdum sanescentes.</i>	405
		<i>Oculorum caliginis curatio.</i>	366.
			367
		<i>Oculorum imminutio.</i>	358
		<i>Oculorum scabrorum curatio.</i>	
			365
		<i>Oculorum suffusionis curatio.</i>	
			367
		<i>Oculorum resolutionis curatio.</i>	
			ibid.
		<i>Oculorum imbecillitatis curatio.</i>	
			368
		<i>Oculorum ictorium curatio.</i>	
			369
		<i>Oculi tumoris notæ.</i>	347
		<i>Oculi quibus curantur.</i>	348
		<i>Oculorum varia collyria.</i>	351
			& seqq.
		<i>Oculorum ulcerum curatio.</i>	
			361
		<i>Oculorum inflammatio.</i>	363
		<i>Oculorum pituitæ fluxus cohibendus.</i>	353. 354
		<i>Oculorum carbunculi.</i>	356
		<i>Oculorum pustula.</i>	357
		<i>Oculi.</i>	

I N D E X

<i>Ocalorum pituita</i>	<i>Cheirurgia.</i>	<i>tantes.</i>	427
	435	<i>Panthenus.</i>	253
<i>Oleum bibendum qui venenum</i>	<i>hansit.</i>	<i>ad Pannum malagma.</i>	255
	313	<i>Papularum duo genera.</i>	340
<i>Omentum.</i>	185	<i>Curatio.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Omenti a vulnere corrupti ex-</i>		<i>Παρακολητικόν emplastum.</i>	261
<i>cisio.</i>	453	<i>Παράλυσις.</i>	178
<i>Οφθαλμοί.</i>	345	<i>Παράσυναγχη.</i>	196
<i>Οπισθόστον</i> Ⓞ.	193. <i>Curatio.</i>	<i>Παρωτίδες.</i>	255. 391
	194	<i>ad Parotidas malagma.</i>	255.
<i>Ορθόπνοια.</i>	198		258
<i>Orcularius Clyster.</i>	483. 487	<i>Partes aliter humine mortuo</i>	
<i>Orcularium specillum.</i>	495	<i>apparent, aliter vivo.</i>	11
<i>Os aqua frigida fovendum.</i>	22	<i>Parti laboranti primum succur-</i>	
<i>Quibus.</i>	36	<i>rendum.</i>	28
<i>Oris resolutio alvo cita finitur.</i>	69	<i>Partium extremarum frigus</i>	
	69	<i>quando mortem indicat.</i>	55.
<i>Oris vitia que Chirurgum po-</i>			96
<i>stulant.</i>	443	<i>ex Partu laborantibus catapo-</i>	
<i>Oris Cancer.</i>	390	<i>tium.</i>	281
<i>Oris ulcerum curatio.</i>	385	<i>Παρελίδες.</i>	387
<i>Ossium positus &amp; figura.</i>	498	<i>Pastillorum differentia.</i>	249
<i>Os pectoris.</i>	503	<i>Pastillorum formula.</i>	268
<i>Ossium vitiosorum signa &amp; cu-</i>		<i>Patella, os.</i>	506
<i>ratio.</i>	507. 525. 528	<i>Pecten, os.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Ossium fracturam differentia.</i>	524	<i>Pedes cum digitis &amp; ungibus</i>	
	524	<i>in gravi morbo nigrescunt.</i>	66
<i>Ossium luxatorum Chirurgia.</i>	542	<i>Pedum cum manibus similitudo.</i>	507
<i>Ossibus resolvendis emplastum.</i>	265	<i>Pedum dolores.</i>	237
<i>ad Ossa &amp; nervos malagma.</i>	257	<i>Pedum doloribus malagma.</i>	259
<i>Οσχιδόν, scrotum.</i>	456	<i>Pediculi palpebrarum.</i>	358
<i>Oxana curatio.</i>	379. <i>Cheirurg-</i>	<i>Πεπλημένον ceratum.</i>	250
<i>gia.</i>	442	<i>in Præcipiti periculo multa</i>	
		<i>recite sunt alias omittenda.</i>	150
			150
<b>P</b> <i>Alma luxata Chirurgia.</i>	552	<i>Περσπνευμονία. 21E. Curatio.</i>	212
<i>Palme.</i>	24		212
<i>Palpebrarum pilis oculum irri-</i>		<i>Περστόνας</i> Ⓞ.	186. 417
			Πε-

RERUM & VERBORUM.

Πισσος.	270	Podagra quibus indicatur.	59
Pestilentia occupato quid obser- vandum.	40. 41	Podagra qua solvitur.	68
Petron.	137	ad Podagras calidas malagma.	250
Φαγέδαινα in cole orta.	397	Podalirius Esculapii filius. 1	
Phalangii ictus curatio.	312	Vulneribus auxilium attulit.	2
Φαλία.	345	Polyarchus.	253. 529
Philocrates.	264	Polyidas.	268
Philotas.	261	Polypus narium strangulat ho- minem. 380. Curatio. ibid.	441
Philotimus.	554	ex Pomis medicamenta.	230.
Philoxenus.	405	Ponderum ratio.	231
Φίμωσις eiusque Cheirurgia.	472	Porrigo 343. Ejus curatio.	ibid.
Φλύκταινας ἐχκώδεις.	336	Posca frigida.	208
Φλυζάκιον.	ibid.	Potio frigida sudanti pernicio- sissima.	26
Phrenitis. 148. Ejus plura ge- nera. 149. Cura. 150 seqq.		Potio fatigatis inutilis.	ibid.
Phrenitici in tenebris habiti.		Potio febricitantibus quando danda.	127. 128
149. In luce.	ibid.	Proidentia ani vel vulva cu- ratio.	402
Φθειρίασις.	358	Proprium est aliquid loci, tem- poris.	18
Φθίσις. 167. Curatio.	169	Proprietates rerum quare no- scenda.	96
Phthisicis alvus cita vitanda.		Πρόπτωσησις.	355
171. Vomitus frequens per- niciosus.	ibid.	Pruritus.	255. 554
Phthisis adolescentibus oritur.	71	Prurigo.	75
Φύγεδλῶ, panus oriens.	255.	Psoricum quid sit.	366
325		Psylli audaces potius quam pe- riti.	309
Φύματα. 70. 254. 325. 396		Πρεπούριον.	467
ad Phymata malagma.	254.	Πρεπούρις medicatio.	423
255. 256. 258		Ptolemæus Rex.	275
Pituitam crassiorem qua fa- ciunt.	103	Ptolemæus Cheirurgus.	373
Pituita oculorum Cheirurgia.	435	Pueri vere optime valent.	46
Plaga levis aqua frigida cura- tur.	293	Puerorum morbi.	ibid.
Planta luxata Cheirurgia.	556	Pueri	
Πλευριτικὸς morbus.	209.		
Curatio.	ibid.		

I N D E X

<i>Pueri non curantur ut viri.</i>	134	<i>Quartana facile revertitur. ib.</i>	
<i>Pulmo.</i>	183	<i>Questus ex populo major.</i>	120
<i>Pulmonis morbi.</i>	211	<i>Quies optima.</i>	114
<i>Pulmonis morbi bonum signum.</i>	66	<i>Quiescere post cibum oportet.</i>	37
<i>Pulmonis icli signa.</i>	285	<i>Quotidiana curatio.</i>	143
<i>Pulsus venarum res fallacissima. 129. Quibus concitatur. ibid. Non statim explorandus.</i>	129	R.	
<i>Purgantia stomachum laedunt.</i>	84	<b>R</b> <i>Abiosi canis morsus.</i>	307
<i>Purgationes expulit Asclepiades. 29. 118</i>	29. 118	<i>Ramicis Cheirurgia.</i>	468
<i>Purgationes qua perniciose. 29.</i>	31		471
<i>Pueri natura.</i>	288	<i>Refectio convalescentium à morbo.</i>	240
<i>Pueri signa.</i>	289	<i>Refrigerantia.</i>	105
<i>Pueri fontem suppressum malum est.</i>	72	<i>Regius morbus.</i>	175
<i>Pus concoquentia &amp; moventia.</i>	243	<i>Remedia explorata adhibenda.</i>	8
<i>Purimovendo emplastrum. 262. 263. 264</i>	262. 263. 264	<i>Remediis contrariis sepe agri curantur.</i>	137
<i>Pustularum varia genera</i>	336	<i>Renes.</i>	183
<i>Πυλῶψ.</i>	184	<i>Renum vitia quibus indicantur.</i>	60. 61
<i>Πυρίτης lapis.</i>	255	<i>Renum morbi. 216. Curatio.</i>	217
Q.		<i>Renum percussorum signa.</i>	286
<b>Q</b> <i>uartana aestiva brevis, autumnalis longa. 76</i>	76	<i>Reprimentia.</i>	109
<i>Quartana curatio.</i>	144	<i>Resolventia mal'agmata.</i>	253
<i>Quartana neminum jugulat.</i>	146	<i>Rayadia eorumque curatio.</i>	399
<i>Quartana mutatur in quotidianam. ibid.</i>	ibid.	<i>Ρημοχασμός.</i>	203
<i>Quartana duplicis curatio. ibid.</i>	ibid.	<i>Rigor quando timendus.</i>	62
<i>Quartana vetus raro nisi vere solvitur.</i>	147	<i>Ρίζαγα forceps.</i>	445
		<i>Pvics.</i>	424
		<i>Ρυτίδες emplastrum.</i>	264
			399. 424
		<i>Rhus Syriacus.</i>	386
		<i>Rubrum emplastrum.</i>	266
		<i>Rufum emplastrum.</i>	261
		S.	
		<b>S</b> <i>Acer ignis. 320. Ejus</i>	
		<i>due species. ibid. Cura-</i>	
		<i>tio.</i>	321. 322
		<i>Sagittarum eductio.</i>	417
			San-

RERUM & VERBORUM.

<i>Sanguis bonus &amp; malus qui.</i>	289	<i>Sanitas quando suspecta.</i>	48
<i>Sanguis unde calefcit &amp; refrigerat.</i>	194	<i>Sanus homo quid agere debeat.</i>	20
<i>Sanguinis color attendendus.</i>	82	<i>Σαρκοκλήη.</i>	459. <i>Curatio.</i>
<i>Sanguis crudo non mittendus.</i>	79		470
<i>Sanguis quando mittendus.</i>	79.	<i>Σαρκόφαγος lapis.</i>	239
80. <i>Quando sistendus.</i>	82	<i>Satietas nimia nunquam utilis.</i>	23. <i>ex nimia fame.</i>
<i>Sanguinem vomere pestiferum est.</i>	56		24
<i>Sanguinis sputum.</i>	202	<i>Scabies.</i>	338. <i>Ejus curatio.</i>
<i>Sanguis spumans excretus pulmonis vitium denotat.</i>	61		<i>ibid.</i>
<i>Sanguini evocando pessus.</i>	270	<i>Scala gallinaria.</i>	549
<i>Sanguinis in vesica, evulso calculo, concreti signa &amp; curatio.</i>	483	<i>Scalper excisorius.</i>	511
<i>Sanguis ex vulneribus exiens.</i>	288	<i>Scapularum ossa.</i>	503
<i>Sanguis in ventrem confluxus in pus convertitur.</i>	62	<i>Σχιζόν alumen.</i>	242
<i>Sanguinis profluvium quodnam malum.</i>	76	<i>Σκωρία μολύβδα.</i>	247. 267
<i>Sanguinis profluvium quid indicet.</i>	58	<i>Scroti incisio.</i>	462
<i>Sanguinem supprimentia.</i>	242	<i>Scutula operata.</i>	503
<i>Sanguini supprimentia mala-gma.</i>	256	<i>sectio corporum necessaria.</i>	7
<i>Sanguinis profusio quid curetur.</i>	290	<i>Secunda mensa.</i>	24
<i>Sanguis evulso calculo quomodo sistendus.</i>	482	<i>Secunda, velamentum infantis.</i>	492
<i>Sanguinis ex membrana cerebri profluvio coercendo.</i>	273	<i>Secundinis expellendis catapotium.</i>	281
<i>Sanguis jugulati gladiatoris epilepsia medetur.</i>	174	<i>Securus est aliquis in his quae saepe sine periculo evasit.</i>	49
<i>Sanguisuga si epota sit quid agendum.</i>	314	<i>Seminis profusio.</i>	235
<i>Saniei natura.</i>	288	<i>Senes aestate optime valent.</i>	46
<i>Sanies mala.</i>	289	<i>Senectus longis morbis patet.</i>	43
		<i>Semen morbi.</i>	47
		<i>Senes cancro, theriomate facile corripuntur.</i>	319. <i>Sacro igne.</i>
			321
		<i>Septi transversa percussa nota.</i>	288
		<i>Septi transversa fistula.</i>	412
		<i>Σκωτικά emplastra.</i>	265
		<i>Σκωτικά medicamenta.</i>	467
		<i>Serpentium jejunorum ictus je- juno maxime nocent.</i>	313
		<i>Pp</i>	<i>Ser-</i>



I N D E X

<i>Serpentium morsus quomodo curantur.</i>	309	<i>Sputum sanguinis.</i>	202.	<i>Cura ratio.</i>	203
<i>Serpentium Italicorum ictus curatio.</i>	312. 313	<i>Statura longa decora.</i>			43
<i>Sextantis pondus.</i>	249	<i>Σταφυλώματι</i>	⊙	<i>curatio.</i>	431
<i>Siccitas quos morbos generat.</i>	45	<i>Στατώματα.</i>			420
<i>Signa agrotantis bona.</i>	49	<i>Sternutamentum bonum.</i>			49
<i>Signa mala.</i>	50	<i>Sternutamentum singultum finit.</i>	69.	<i>Difficile parturienti prodest.</i>	69
<i>Signa longa valetudinis.</i>	53	<i>Sternutamentum bonum lethargicis.</i>			158
<i>Singultus sternutamento finitur.</i>	69. 76	<i>ad Sternutamenta excitanda.</i>			274
<i>Singultus frequens hepar inflammationem denotat.</i>	62	<i>Stomachus:</i>	182.		184
<i>Smagadinum emplastrum.</i>	261	<i>Stomachi cum vesica consortium.</i>			486
<i>Somnus qui malus.</i>	51	<i>Stomachum infirmum quae indicent.</i>			38
<i>Somnus utilis phreniticis.</i>	151	<i>Stomachi morbi.</i>	205.	<i>Curatio.</i>	ibid.
<i>Somnifera.</i>	108	<i>Stomacho quae idonea.</i>			103.
<i>Sonitus ventris bonum signum.</i>	50	<i>Quae aliena.</i>			104
<i>Somno arcessendo catapotia.</i>	278. 279. 280	<i>Stomacho laborantibus quae agenda.</i>			38
<i>Sosagoras.</i>	258	<i>Stomachi percussi signa.</i>			287
<i>Sustratus.</i>	406. 413. 448	<i>Struma quae.</i>	323.	<i>Fatigant medicos.</i>	ibid.
<i>Spatha lignea humero reponendo.</i>	543	<i>resurgunt.</i>	ibid.	<i>Nascuntur in cervice, alis, &amp;c.</i>	
<i>Specillum oricularium.</i>	495		324.	<i>earum curatio.</i>	324
<i>Specilli in explorandis calvariae vitiiis usus.</i>	511. 514	<i>ad Strumas malagmata.</i>	254.		255. 258
<i>Spes interdum frustratur.</i>	57	<i>Succi boni quinam.</i>			101
<i>Σφραγidis pastillus.</i>	268	<i>Succi mali quinam.</i>			101
<i>Spina descriptio.</i>	501				102
<i>Spina luxata insanabilis.</i>	547	<i>Sudor duobus modis elicitur.</i>			93
<i>Spina fracta.</i>	531	<i>Sudatio nervorum vitia curat.</i>			ibid.
<i>Spirandi difficultas.</i>	198.	<i>ibid. Quando conducit.</i>	ibid.		
<i>Curatio.</i>	ibid.	<i>Febricitanti qui detergendus.</i>			130
<i>Sputum quodnam malum.</i>	70	<i>Sudor</i>			
<i>Sputum quodnam mortem indicat.</i>	56				

R E R U M & V E R B O R U M.

<i>Sudor frigidus quid indicet.</i>	<i>Tempus matutinum agris remissius est.</i>	51. 53. 56. 285	125. <i>Natura levissimum.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Suffusionis oculorum curatio.</i>	<i>Tempus meridianum agris gravius.</i>	433	<i>ibid.</i>	
<i>Suppurationis signa.</i>	<i>Tempus vespertinum pessimum.</i>	410	<i>ibid.</i>	
<i>Suppurationis indicia.</i>	<i>Τερεσμός.</i>	62	228. <i>Curatio.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Suppuratio variis modis excitatur.</i>	<i>Terebrarium descriptio.</i>	64. 65	510	
<i>Suppurationes tolerabiles.</i>	<i>Terra Eretria,</i>	67	344	
<i>Suppurationes pessime quas intus tendunt.</i>	<i>Tertiana curatio.</i>	71	143	
<i>Suppurationum internarum curatio.</i>	<i>Testiculorum anatome.</i>	181	455	
<i>Sura, os.</i>	<i>Testiculorum inflammatio, durities, tumor, atrophia.</i>	507	398. 399	
<i>Surculus qui tollatur.</i>	<i>Τέτανος.</i>	305	193. <i>Curatio.</i>	194
<i>Surditati biliosa alvus prodest.</i>	<i>Τετρασπασμένα.</i>	70	263	
	<i>Τετραφάρμακον emplastrum.</i>	499	228. 262. 396. 399	
<i>Suturarum capitis numerus &amp; locus incertus.</i>	<i>Tharrias.</i>	499	159. 165	
<i>Sutura Hippocratem decipientes.</i>	<i>Themison.</i>	515	4. 225	
<i>Σύνωσις.</i>	<i>Theoxenus.</i>	344	259	
<i>Συνέγχις.</i>	<i>Θηρίωμα.</i>	196. Ως συνέγχις.	319. <i>Ejus curatio.</i>	319. 320
		<i>ibid.</i>		
T.				
<b>T</b> <i>Abes.</i>	<i>Thoracis dolorib. catapot.</i>	167. <i>Curatio.</i>	169	280
<i>Tabem quæ significant.</i>	<i>Tibia os.</i>	58	507	
<i>Tabes sequitur suppressionem hæmorrhoidum.</i>	<i>Timæus.</i>	62. <i>Nimias destillationes.</i>	274	
	<i>Τιδύμαλλος, lactuca marina.</i>	64	245	
<i>Tabis sputum quomodo esse debeat, febris, alvus.</i>	<i>Τομικοί dentes.</i>	67	501	
<i>Talorum ossa.</i>	<i>Tonsillarum tumulentium curatio</i>	507	383. <i>Exulceratarum.</i>	384
<i>Tali luxati Cheirurgia.</i>	<i>Tonsillarum induratarum Cheirurgia.</i>	556	445	
<i>Telorum ejectio.</i>	<i>Tormina minus periculosa.</i>	415	69	
<i>Temeritas homines sæpe restituit.</i>	<i>Tormina intestinorum.</i>	138	224	
<i>Tempestatum optime æquales.</i>	<i>Tormina profunt lienosis.</i>	42	70	
<i>Temporis in curationibus morborum habenda ratio.</i>	<i>Tormina ab atra bile mortifera.</i>	424	74	
	<i>Torpor quando perniciosus.</i>		75	
	<i>Transitus ex loco salubri in gra-</i>			

I N D E X

<i>gravem tutus non est.</i>	24	<i>facilis.</i>	81.	<i>Febris quando</i>
<i>Troxiscus, pastilli.</i>	249	<i>V. S. requirit.</i>	78	
<i>Tryphon pater.</i>	406	<i>V. S. convenit phreneticis.</i>	150.	
<i>Tubercula capitis.</i>	420	<i>Cachecticis.</i>	169.	<i>Epilepti-</i>
<i>Tubercula gingivarum.</i>	387	<i>cis.</i>	172	
<i>Tubercula ex callo orta diffi-</i>		<i>V. S. Elephantia laborantibus.</i>		
<i>le sanantur articulosi.</i>	72	177.	<i>Attonitis.</i>	177. 178
<i>Tumoram per se ortorum medi-</i>		<i>Venenorum maxima pars fri-</i>		
<i>catio.</i>	407	<i>gore interimit.</i>	310	
<i>Tumoris testicularum curatio.</i>	399	<i>Venenum exsugendum.</i>	309	
	432	<i>Venti qui optimi.</i>	43	
<i>Tunica oculorum.</i>	432	<i>Venter sani qualia reddit.</i>	50	
<i>Tunica abscessus involvens.</i>	408	<i>Ventris fluxus.</i>	229.	<i>Curatio.</i>
	201		ibid.	
<i>Tussis, 200. Curatio.</i>	201	<i>Ventris varices.</i>	455	
<i>Tussis hydropicis malum si-</i>		<i>Ventris vulnera tractandi ra-</i>		
<i>gnum.</i>	72	<i>tio.</i>	452	
<i>Tussis in costarum fractura in-</i>		<i>Ventris fistula.</i>	413	
<i>festantis medicina.</i>	529	<i>Ventriculus.</i>	184	
<i>ad Tussim catapotium.</i>	280	<i>Ventriculi vulnerati notæ.</i>	287	
<i>Tympanitidis curatio.</i>	163.	<i>Venus hicme non perniciosa.</i>	33	
	164		33	
		<i>Venus vere tutissima.</i>	ibid.	
V.		<i>Venus aestate &amp; autumno inn-</i>		
<b>V</b> <i>alentissimum quid.</i>	96	<i>tilis.</i>	34	
<i>Valetudinem adversam</i>		<i>Venus nervorum dolore labo-</i>		
<i>futuram quæ denotent.</i>	48	<i>rantibus inimica.</i>	39	
<i>Valetudinem longam.</i>	53	<i>Venus noxia phthificis.</i>	172	
<i>Vari quomodo tollantur.</i>	346	<i>Epilepticis.</i>	173	
<i>Varices ventris.</i>	455	<i>Ver saluberrimum est.</i>	42	
<i>Varicum curatio.</i>	495	<i>Vere quis cibus conveniat.</i>	33	
<i>Venarum in temporibus adu-</i>		<i>Vere qui morbi oriuntur.</i>	43	
<i>sio pituitæ oculorum sanan-</i>		<i>Vertebrae spina.</i>	501	
<i>da.</i>	407	<i>Vesica.</i>	185	
<i>Vena quæ incidenda.</i>	81	<i>Vesica cum stomacho consortium.</i>	486	
<i>Venæsectio quæ, &amp; quibus con-</i>				
<i>veniat.</i>	77	<i>Vesica vitium quibus indicetur.</i>	61	
<i>Venæsectio quando, quæ &amp;</i>				
<i>quibus conveniat.</i>	78. 79.	<i>Vesicæ vulneratæ signa.</i>	288	
<i>Ubi.</i>	80. 81	<i>Vesicarum in palpebris medi-</i>		
<i>Quo die.</i>	80.	<i>catio.</i>	421	
<i>In febre vehementi jugu-</i>				
<i>lare est.</i>	ibid.	<i>Vexa-</i>		
<i>Imperitiæ dif-</i>				

R E R U M & V E R B O R U M.


<i>Vexatorum curatio.</i>	407	<i>Ulcerum à frigore in pedibus &amp; manibus ortorum curatio.</i>	323
<i>Vincula iis, quibus calculi evulsi è vesica, non necessaria.</i>	483	<i>Ulcerum hydropicorum non facile sanescunt.</i>	160
<i>Vinum quod pueris &amp; senibus conveniat.</i>	32	<i>Umbilicorum prominentiam curatio.</i>	392
<i>Vinum lenè prodest capite infirmo laboranti.</i>	35	<i>Umbilici vitiiati Chelurgia.</i>	448
<i>Vinum alvo citè quoddam.</i>	37	<i>Umbilici &amp; secundarum extrahio.</i>	492
<i>Vinum vulnèri inimicissimum.</i>	295. 299	<i>Unciè pondus.</i>	249
<i>Vinum noxium dentium dolori.</i>	380	<i>Unctio confert corpori.</i>	88
<i>Virginum caculi.</i>	481	<i>Uncus infanti mortuo educendo.</i>	491
<i>Viride emplastrum.</i>	262. 264	<i>Unguium ortus.</i>	506
<i>Viscerum morbi.</i>	211	<i>Ungues pallidi mortem indicant.</i>	55
<i>Viscera vulnerata propriam exigunt curationem.</i>	295	<i>Unguium scabrorum curatio.</i>	404
<i>Vita otiosa inutilis.</i>	25	<i>Unguis oculorum.</i>	423
<i>Vitiliginis species varia.</i>	341	<i>Voci adjuvanda catapotium.</i>	281
<i>Ulcèris vetusti oræ livent.</i>	300	<i>Vomica hepatis.</i>	215
<i>Ulcus vetus quomodo curandum.</i>	301	<i>Vomitùs rejectus ab Asclepiade.</i>	29
<i>Ulcus aridum mortis indicium.</i>	55	<i>Vomitùs quando utilis.</i>	ibid.
<i>Ulcus implentia.</i>	247	<i>Vomitùs quibus inutilis.</i>	ibid.
<i>Ulcèribus crustas inducentia.</i>	246.	<i>Vomitum quid exigit.</i>	ibid.
<i>Easdem resolutentia.</i>	ibid.	<i>Vomitùs quibus utilis.</i>	30
<i>Ulcèribus purgandis &amp; implendis ἐγχεῖσθαι.</i>	277	<i>Vomitùs luxuriæ causa fieri non debet.</i>	ibid.
<i>Ulcèribus sordidis pastillus.</i>	269	<i>Vomitùs non fit quotidianus.</i>	ibid.
<i>ad Ulcèra mala, malagma.</i>	255	<i>Vomitùs remedia.</i>	ibid.
<i>Ulcèra gingivarum.</i>	388	<i>Vomitùs supprimit dejectiones.</i>	69
<i>Ulcèrum oris medicatio.</i>	385	<i>Vomitùs prodest biliosis.</i>	87.
<i>Ulcus circa fauces quibus indicatur.</i>	60	<i>Epilepticis.</i>	ibid.
<i>Ulcèribus faucium purgandis catapotium.</i>	280	<i>Nocet sanis.</i>	ibid.
<i>Ulcèra linguæ.</i>	387		


I N D E X &c.

Vomitus infirmo capite laboran- ti alienus est. 35	Vulnera insanabilia. 283. dif- ficilia. <i>ibid.</i> tutiora. 284
Vomitus biliosus noxius vulne- rato. 296	Vulnera, quibus ossa loco mo- ventur, periculosa. 557
post Vomitum quid agendum. 30	Vulneris nota. 295. 296
Ureteres. 185	Vulneris curatio. <i>ibid.</i>
Urina sani qualis. 50	Vulneris derasi curatio. 305
Urina mala. 52	Vulneris ligatio. 294
Urina bona quanam, vesicae morbo. 66	Vulneris glutinatio. 291. 292
Urina quae Valetudinem lon- gam indicet. 53. quae Mor- tem. 56	Vulnus glutinantia. 242
Urina crassa & alba articulo- rum & viscerum dolores in- dicat. 60	Vulneribus glutinandis pastilli. 268
Urina viridis, viscerum dolo- res & tumorem indicat. 60	Vulnus quomodo purgandum. 298. implendum. 299
Urina purulenta vel sanguino- lenta ulcus renum vel vesicae indicat. <i>ibid.</i>	Vulnus aperientia. 243. pur- gantia. <i>ibid.</i> rodentia. 244
Urina crassa, carunculas, pi- los, bullas, malum odorem, arenam habens renum vitia denotat. 60. 61. liquida suppurationem. 63	Vulnorum inflammationis cu- ratio. 291. 297
Urina alba, rufa quid indicet. 22	collisi Vulneris curatio. 304
Urinam moventia. 108	Vulpinum jecur ac pulmones asthmatis sanando. 199
Urinae difficultati sanandae ca- tapotium. 281	Vulva. 185
Urinae nimiae profusio. 234	Vulvae natura mirabilis. 489
ἔρροιας vesicae. 478	Vulvae morbus. 232. Curatio. <i>ibid.</i>
Uvae inflammatio. 389	Vulvae dolenti catapotium. 279
Uvae inflammatae pastillus. 269	Vulvae concubitum non admit- tentis curatio. 488
Uvae inflammatae excisio. 445	Vulvae procidentia. 402
Vulnerato quid agendum. 295	Vulvae mollienda pessus. 270
	Vulvae percussa signa. 286
	X.
	Ξ Προφθαλμία. 364
	Z.
	Z Eno. 241
	Zopyrus. 275
	Zυζώδες os. 501


F I N I S.






















100

100



