

PLANTE NOUË DIN ROMÂNIA

NOTE POSTUME

DE

Dr. DIMITRIE BRÂNDZĂ,

Fost membru al Academiei Române.

Ședința de la 25 Octombrie 1902.

1) *Trifolium romanicum* sp. nov. Tab. I.

(Sect. Lupinaster.)

Perennis, rhizomate cylindraceo nuduloso parce ramoso radicante; *radicibus hinc inde tuberculoso-incrassatis longe conoideis subarticulato-contractis*. Foliis inferioribus ad stipulas vaginiformes reductis; *superiorum limbo digitatim-5-foliolato*; foliolis oblongo-lanceolatis apice acutis vel obtusis argute denseque inaequi-serrulatis; racemo ad folia superiore axillari pedunculato dimidiato unilaterali subcapitato; pedunculis pubescentibus; floribus albido-ochroleucis; calycibus corolla duplo brevioribus, dentibus lanceolato-subulatis subaequalibus tubo parum longioribus.

Cresce în pășunile subalpine printre tufele de *Vaccinium*, la altitudinea de 1.500 metri, pe muntele Nemira, lângă linia de fruntarie, în apropiere de Slănic în districtul Bacău. Înfloresce în Iunie.

Acastă specie este foarte apropiată de *T. Lupinaster* L., de care diferă mai cu seamă prin rădăcinile sale tuberculose.

În localitatea unde am aflat-o în ziua de 20 Iunie 1890, nu am întâlnit decât vre-o 12 exemplare, ceea ce mă făcî a crede că este o plantă cu totul rară.

T. Lupinaster L. Rosia media et omni Sibiria inque Davaria (Ledeb.)

2) *Saxifraga Huetiana* Boiss. Tab. II.

(Sect. Cymbalaria. Petala flava.)

Boiss. Diagn. Ser. II, p. 72 et Fl. orient. II, p. 812; Brândză Prod. Fl. Rom. p. 150.

Glabra vel parvissime glanduloso-hirtula, foliis reniformibus sinu aperto cordatis vel basi truncatis obtusissime 3-7-lobatis, foliis superiori-

bus trilobis vel oblongis integris, calycis laciniis triangularibus obtusis per anthesia patulis dein subreflexis, petalis calyce triplo longioribus ellipticis basi rotundata vel obtuse biauriculata breviter unguiculatis, capsulae calyce subduplo longioris stylis brevibus divergentibus, seminibus minimis ovatis minute tuberculatis ☉ vel ☺. — Flores flavi.

Cresce pe lângă pâraele din pădurile umbróse în toți munții de la Slănic în districtul Bacău, unde este foarte răspândită, întințându-se de-alungul frontariei până pe teritoriul Transilvaniei. Înfloresce vara.

S. Huetiana indicată în Asia-mică este o plantă nouă pentru Europa, unde ea nu fusese semnalată mai înainte de 1879, când eă am aflat-o în localitățile menționate mai sus (Brândza, l. c., p. 150), unde se întâlnește pretutindeni în mare abundență.

Planta cultivată în grădinile botanice din Paris sub numele de *S. Huetiana*, este *S. Sibthorpii* Boiss.

3) *Paeonia triternata* Pall.

Pall. Nov. Act. Acad. scient. Imper. Petropol. X, p. 312; DC. Prodr. I, p. 65; Ledeb. Fl. Ross. I, p. 73.

P. daurica, Anders. Bot. Mag. tab. 1.441.

P. corallina β . *triternata* Boiss. Fl. orient. I, p. 97.

P. corallina Brândză An. Acad. Rom., XI¹⁶, pag. 298, non Retz.

Capsulis tomentosis a basi recurvatis, folliis 2- (rarissime 3-) ternatis sectis: segmentis orbiculato-ovatis obtusis vel mucronatis subtus glaucis pubescentibus glabrisve.

Cresce în pădurile stâncóse la Vârciorova, pe muntele Ciocanul, unde este foarte rară.

Fórté apropiată de *P. corallina* Retz, și considerată de Boissier (l. c.) ca o varietate a acesteia: «Non videtur a *P. corallina* specificè differre,» de care diferă prin foliótele sale ovato-orbiculate adesea subcordate, obtuse sau de abiă (vix) ascuțite, dedesubt glauce, iar nu eliptico-oblonge dedesubt.

P. triternata nu eră cunoscută în Europa decât puțin în Crimea, pe când în Asia-mică este răspândită.

EXPLICAȚIUNEA ICÓNELOR

TABELA I

Trifolium romanicum Brandza.

Plantă întrégă.

Flóre.

Calice.

Petale.

TABELA II

Saxifraga Huetiana Boiss.

Plantă întrégă.

Flóre veđută din profil.


Flóre veđută din față.

Petal.

Stamină.

Fruet.

Semință.



— XXV. — Mem. Scient.



J. Aporal del. et lith.

Jos. Baquet sc. a Paris

Trifolium romanicum Brandza.